觀塘工業區工業專用港
施工期間環境監測報告

環境監測季報
114 年第 4 季
(定稿)

開發單位：台灣中油股份有限公司
設計單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司
監造單位：台灣世曦工程顧問股份有限公司
承攬廠商：泛亞/皇昌聯合承攬
執行監測單位：環興科技股份有限公司
執行日期：114 年 10 月至 114 年 12 月
提送日期：中華民國 115 年 2 月

觀塘工業區工業專用港
施工期間環境監測報告

環境監測季報
(114 年第 4 季)

泛亞/皇昌聯合承攬	
環興科技股份有限公司	

觀塘工業區工業專用港
施工期間環境監測報告

目　錄

頁　次

目　錄 目-1
圖目錄 目-6
表目錄 目-15
前　言 0-1
0.1 依　據 0-1
0.2 監測執行期間 0-1
0.3 執行監測單位 0-2
第一章　監測內容概述 1-1
1.1 工程進度內容概述 1-1
1.2 監測情形概述 1-2
1.3 監測計畫概述 1-2
1.4 監測位址 1-2
1.5 品保／品管作業措施概要 1-22
1.5.1 現場採樣之品保／品管 1-22
1.5.2 分析工作之品保／品管 1-25
1.5.3 儀器維修校正項目及頻率 1-28
1.5.4 分析項目之檢測方法 1-36
1.5.5 數據處理原則 1-36
1.6 海域生態調查方法 1-37
1.6.1 海域 1-37
1.6.2 河口 1-43

1.7 漁業經濟調查方法 1-44
1.7.1 現場生物採樣 1-44
1.7.2 漁業資源調查 1-44
1.8 礁體懸浮固體監測調查方法 1-45
1.8.1 漂沙監測調查方法 1-45
1.8.2 海域空間濁度變化方法 1-49
1.9 海域地形水深測量方法 1-56
1.9.1 控制點測量 1-56
1.9.2 陸域地形測量 1-58
1.9.3 海域地形測量 1-58
1.9.4 控制點測量調查成果 1-60
1.9.5 觀音溪口斷面先期控制點測量調查成果 1-61
1.10 海域地形地貌測量方法 1-62
1.10.1 高解析度影像地形地貌攝影 1-62
第二章　監測結果數據分析 2-1
2.1 空氣品質 2-1
2.2 噪音振動 2-3
2.3 營建噪音 2-8
2.4 低頻噪音 2-10
2.5 交通流量 2-11
2.6 河口水質和底泥 2-16
2.7 海域水質和底泥 2-27
2.8 海域生態 2-33
2.8.1 浮游植物 2-33
2.8.2 浮游動物 2-42
2.8.3 底棲生物 2-51
2.8.4 魚類(仔稚魚及魚卵) 2-63
2.8.5 總基礎生產力 2-68

2.9 河口生態 2-73
2.9.1 浮游植物 2-73
2.9.2 浮游動物 2-79
2.9.3 底棲生物 2-87
2.9.4 魚類 2-95
2.9.5 總基礎生產力 2-100
2.10 漁業經濟 2-103
2.10.1 刺網現場生物採樣 2-103
2.10.2 漁業資源調查結果 2-109
2.11 礁體懸浮固體監測 2-143
2.11.1 每日漂沙監測 2-143
2.12 辦理海域地形水深監測 2-169
2.12.1 陸域地形測量調查成果 2-170
2.12.2 海域地形測量調查成果 2-171
2.12.3 觀音溪河口河道斷面監測作業 2-179
2.13 辦理海域地形地貌調查 2-190
2.13.1 高解析度影像地形地貌攝影 2-190
第三章 檢討與建議 3-1
3.1 監測結果檢討與因應對策 3-1
3.1.1 異常狀況紀錄及因應對策 3-1
3.1.2 空氣品質歷次監測結果分析 3-3
3.1.3 噪音振動歷次監測結果分析 3-10
3.1.4 營建噪音歷次監測結果分析 3-13
3.1.5 低頻噪音歷次監測結果分析 3-13
3.1.6 交通流量歷次監測結果分析 3-15
3.1.7 河口水質、底泥 3-17
3.1.8 海域水質、底泥 3-32
3.1.9 海域生態 3-59

3.1.10 河口生態 3-142
3.1.11 漁業經濟 3-177
3.1.12 礁體懸浮固體監測 3-182
3.1.12.1 每日漂沙監測 3-182
3.1.12.2 海域空間濁度變化 3-186
3.1.13 辦理海域地形水深測量 3-195
3.1.13.1 海域地形水深測量 3-195
3.1.13.2 觀音溪河口河道斷面監測作業 3-209
3.1.14 辦理海域地形地貌調查 3-230
3.2 建議事項 3-244
參考文獻 參-1

附　錄

附錄一　檢測執行單位之認證資料 附 1-1

附錄二　品保／品管查核記錄 附 2-1

附錄三　海域及河口之水質與底泥分析方法 附 3-1

附錄四　原始數據 附 4-1

附錄五　礁體懸浮固體監測-每日漂沙逐時資料 附 5-1

附錄六　現場調查照片 附 6-1

附錄七　路易氏雙髻鯊(紅肉丫髻鮫)之文獻調查及回顧 附 7-1

附錄八　歷次監測結果資料彙整 附 8-1

附錄九　高解析度地形地貌影像攝影專案報表 附 9-1

附錄十　淨基礎生產力 附 10-1

圖目錄

頁　次

圖 0.3-1　本計畫施工期間環境監測工作組織圖 0-2

圖 1.1-1　開發計畫施工現況圖 1-1

圖 1.4-1　各環境監測項目之監測點位示意圖 1-21

圖 1.8.1-1　光學濁度計率定結果圖 1-47

圖 1.8.1-2　各區 GPS 定位點(上：保護區，下：G2) 1-48

圖 1.8.2-1 (a)　原施工海域空間濃度變化監測規劃剖面位置圖 1-49

圖 1.8.2-1 (b)　本次觀測航線與工業港狀況 1-49

圖 1.8.2-1 (c)　本次施工海域空間濃度變化監測規劃點位圖 1-50

圖 1.8.2-2　船攜 ADCP 走航量測示意圖 1-51

圖 1.8.2-3　岸上中控系統 1-52

圖 1.9.1-1　測量作業流程圖 1-56

圖 1.9.3-1　水深測量流程圖 1-59

圖 1.9.3-2　水深地形調查規劃測線圖 1-60

圖 1.10.1-1　Phantom 4 RTK 無人機（右）與 DRTK2 地面基站 1-62

圖 1.10.1-2　工作執行流程圖 1-63

圖 1.10.1-3　海岸特性劃設分區圖 1-64

圖 1.10.1-4　Pix4Dmapper 處理軟體作業流程圖 1-66

圖 1.10.1-5　ArcGIS 實際操作畫面 1-66

圖 2.6-1　114 年第 4 季河口採樣潮位高低圖 2-19

圖 2.8.1-1　本季海域各測站之浮游植物種類及數量分布圖 2-38

圖 2.8.1-2　本季海域各類浮游植物優勢大類數量百分比 2-39

圖 2.8.1-3　本季海域浮游植物之群集分析圖 2-39

圖 2.8.1-4　本季海域浮游植物 MDS 圖 2-40

圖 2.8.1-5　本季海域各測站浮游植物豐度與葉綠素 a 濃度散布圖 2-40
圖 2.8.1-6　本季海域浮游植物優勢物種 2-41
圖 2.8.2-1　本季海域各類浮游動物優勢大類數量百分比 2-46
圖 2.8.2-2　本季海域各測站浮游動物豐度變化圖 2-47
圖 2.8.2-3　本季海域各測站浮游動物大類數變化圖 2-47
圖 2.8.2-4　本季海域各測站浮游動物豐富度變化圖 2-47
圖 2.8.2-5　本季海域各測站浮游動物均勻度變化圖 2-48
圖 2.8.2-6　本季海域各測站浮游動物歧異度變化圖 2-48
圖 2.8.2-7　本季海域各測站浮游動物優勢度變化圖 2-48
圖 2.8.2-8　本季海域各測站浮游動物群集組成之相似度圖 2-49
圖 2.8.2-9　本季海域各測站浮游動物群集分析圖 2-49
圖 2.8.2-10　各測站浮游動物豐度與浮游植物豐度散布圖 2-50
圖 2.8.2-11　本季海域浮游動物優勢大類 2-50
圖 2.8.3-1　本季海域各測站底棲生物之種類數及個體數比較圖 2-59
圖 2.8.3-2　本季海域底棲生物各動物門之物種數百分比 2-60
圖 2.8.3-3　本季海域底棲生物各動物門之個體數百分比 2-60
圖 2.8.3-4　本季底棲生物之各測站群集分析樹狀圖 2-61
圖 2.8.3-5　本季海域底棲生物之各測站群集 MDS 圖 2-61
圖 2.8.3-6　本季海域底棲生物表優勢物種 2-62
圖 2.8.4-1　本季仔稚魚之群集分析樹狀圖 2-66
圖 2.8.4-2　本季仔稚魚之 MDS 群集分析圖 2-67
圖 2.8.4-3　本季仔稚魚優勢物種 2-67
圖 2.8.5-1　本季大堀溪測站之總基礎生產力分析 2-69
圖 2.8.5-2　本季觀音溪測站之總基礎生產力分析 2-70
圖 2.8.5-3　本季小飯壢溪測站之總基礎生產力分析 2-70

圖 2.8.5-4　本季新屋溪測站之總基礎生產力分析 2-71
圖 2.8.5-5　本季社子溪測站之總基礎生產力分析 2-71
圖 2.8.5-6　本季海域各測站總基礎生產力與葉綠素 a 濃度散布圖 2-72
圖 2.9.1-1　本季河口各測站之浮游植物種類及數量分布圖 2-76
圖 2.9.1-2　本季河口浮游植物優勢種數量百分比 2-76
圖 2.9.1-3　本季河口各測站之浮游植物之群集分析圖 2-77
圖 2.9.1-4　本季河口各測站之浮游植物之 MDS 圖 2-77
圖 2.9.1-5　本季河口各測站浮游植物豐度與葉綠素 a 濃度散布圖 2-78
圖 2.9.1-6　本季河口浮游植物優勢物種 2-78
圖 2.9.2-1　本季河口浮游動物優勢大類數量百分比 2-82
圖 2.9.2-2　本季河口各測站之浮游動物豐富度變化圖 2-83
圖 2.9.2-3　本季河口各測站之浮游動物大類數變化圖 2-83
圖 2.9.2-4　本季河口各測站之浮游動物豐富度變化圖 2-83
圖 2.9.2-5　本季河口各測站之浮游動物均勻度變化圖 2-84
圖 2.9.2-6　本季河口各測站之浮游動物歧異度變化圖 2-84
圖 2.9.2-7　本季河口各測站之浮游動物優勢度變化圖 2-84
圖 2.9.2-8　本季河口各測站之浮游動物群集組成之相似度圖 2-85
圖 2.9.2-9　本季河口各測站之浮游動物群集分析圖 2-85
圖 2.9.2-10　本季河口各測站浮游動物豐度與浮游植物豐度散布圖 2-86
圖 2.9.2-11　本季河口浮游動物優勢大類 2-86
圖 2.9.3-1　本季河口各測站之底棲生物之種類數及個體數 2-92
圖 2.9.3-2　本季河口底棲生物各大類物種數百分比 2-92
圖 2.9.3-3　本季河口各測站之底棲生物各大類個體數百分比 2-93
圖 2.9.3-4　本季河口各測站底棲生物之群集分析樹狀圖 2-93
圖 2.9.3-5　本季河口各測站底棲生物之 MDS 圖 2-94

圖 2.9.3-6　本季河口底棲生物優勢物種 2-94
圖 2.9.4-1　本季河口魚類優勢物種 2-100
圖 2.9.5-2　本季河口各測站總基礎生產力與葉綠素 a 濃度散布圖 2-102
圖 2.10.1-1　本季(10 月 14 日)之刺網採樣實際漁獲情況 2-106
圖 2.10.1-2　本季刺網捕獲魚類(114 年 10 月 14 日) 2-107
圖 2.10.1-3　本季黃帶圓腹鯡之體長-體重分布圖(10 月 14 日) 2-108
圖 2.10.2-1　歷年漁業作業人數 2-111
圖 2.10.2-2　歷年魚苗產量 2-113
圖 2.10.2-3　歷年魚苗產值 2-113
圖 2.10.2-4　歷年動力漁船、筏 2-113
圖 2.10.2-5　歷年漁業漁船數 2-114
圖 2.10.2-6　歷年漁業產量 2-115
圖 2.10.2-7　標本戶問卷調查作業海域位置圖 2-139
圖 2.10.2-8　114 年 9 月桃園地區每單位努力漁獲量(CPUE)分布 2-140
圖 2.10.2-9　114 年 10 月桃園地區每單位努力漁獲量(CPUE)分布 2-140
圖 2.10.2-10　114 年 11 月桃園地區每單位努力漁獲量(CPUE)分布 2-141
圖 2.10.2-11　分區海域範圍 2-141
圖 2.10.2-12　本季分區海域漁獲量堆疊圖 2-142
圖 2.10.2-13　本季分區海域月別 CPUE 2-142
圖 2.11.1-1　漂沙濃度逐時資料時序列圖 2-143
圖 2.12.1-1　114 年 10 月颱風季節後陸域施測點位圖 2-170
圖 2.12.1-2　陸域地形調查現場作業相片 2-171
圖 2.12.2-1　海域地形測量現場作業相片 2-172
圖 2.12.2-2　114 年 10 月颱風季節後海域施測航跡圖 2-173
圖 2.12.2-3　114 年 10 月颱風季節後水深地形等深線圖 2-174

圖 2.12.2-4　114 年 10 月颱風季節後地形水深影像圖 2-174
圖 2.12.2-5　114 年 10 月颱風季節後 CAD 格式地形圖 2-175
圖 2.12.2-6　分析斷面位置圖 2-177
圖 2.12.2-7　114 年 10 月斷面底床高程變化圖 2-178
圖 2.12.3-1　觀音溪河口河道斷面監測現場作業相片(114 年 12 月 1 日).... 2-180
圖 2.12.3-2　觀音溪河口地形施測點位圖(114 年 12 月 1 日)..... 2-181
圖 2.12.3-3　觀音溪河口地形等高線圖(114 年 12 月 1 日)..... 2-181
圖 2.12.3-4　觀音溪河道中心線圖(114 年 12 月 1 日)..... 2-183
圖 2.12.3-5　觀音溪河道中心線底床高程變化圖(114 年 12 月 1 日)..... 2-184
圖 2.12.3-6　觀音溪河口斷面分析位置圖 2-184
圖 2.12.3-7　觀音溪河口斷面底床高程變化圖(SEC01~SEC03)..... 2-185
圖 2.12.3-8　觀音溪河口斷面底床高程變化圖(SEC04~SEC06)..... 2-186
圖 2.12.3-9　觀音溪河口斷面底床高程變化圖(SEC07~SEC09)..... 2-187
圖 2.12.3-10　觀音溪河口斷面底床高程變化圖(SEC010~SEC12)..... 2-188
圖 2.12.3-11　觀音溪河口斷面底床高程變化圖(SEC13~SEC15)..... 2-189
圖 2.13.1-1　114 年秋季(10 月)A1~A4 空拍輸出成果..... 2-192
圖 2.13.1-2　114 年秋季(10 月)A5~A8 空拍輸出成果..... 2-193
圖 2.13.1-3　114 年秋季(10 月)A9~A12 空拍輸出成果..... 2-194
圖 2.13.1-4　114 年秋季(10 月)A1~ A12 空拍資料輸出全部成果..... 2-195
圖 2.13.1-5　114 年冬季(12 月)A1~A4 空拍輸出成果..... 2-196
圖 2.13.1-6　114 年冬季(12 月)A5~A8 空拍輸出成果..... 2-197
圖 2.13.1-7　114 年冬季(12 月)A9~A12 空拍輸出成果..... 2-198
圖 2.13.1-8　114 年冬季(12 月)A1~A12 空拍資料輸出全部成果..... 2-199
圖 3.1.2-1　TSP 監測結果分析圖..... 3-4
圖 3.1.2-2　PM_{10} 監測結果分析圖 3-4

圖 3.1.2-3 $PM_{2.5}$ 監測結果分析圖 3-5
圖 3.1.2-4 SO_2 最大小時平均值監測結果分析圖 3-5
圖 3.1.2-5 SO_2 日平均值監測結果分析圖 3-6
圖 3.1.2-6 NO 最大小時平均值監測結果分析圖 3-6
圖 3.1.2-7 NO_2 最大小時平均值監測結果分析圖 3-7
圖 3.1.2-8 CO 最大小時平均值監測結果分析圖 3-7
圖 3.1.2-9 CO 最大 8 小時平均值監測結果分析圖 3-8
圖 3.1.2-10 THC 監測結果分析圖 3-8
圖 3.1.2-11 雨中 pH 監測結果分析圖 3-9
圖 3.1.2-12 鹽份(氯鹽)監測結果分析圖 3-9
圖 3.1.3-1 歷次噪音監測結果分析圖 3-11
圖 3.1.3-2 歷次振動監測結果分析圖 3-12
圖 3.1.4-1 歷次營建噪音監測結果分析圖 3-13
圖 3.1.5-1 歷次低頻噪音監測結果分析圖 3-14
圖 3.1.6-1 歷次路口交通量監測結果分析圖 3-15
圖 3.1.6-2 歷次路段交通量監測結果分析圖 3-16
圖 3.1.7-1 歷次河口水質監測結果分析圖 3-21
圖 3.1.7-2 歷次河口底泥監測結果分析圖 3-30
圖 3.1.8-1 歷次海域水質監測結果分析圖 3-36
圖 3.1.8-2 歷次海域底泥監測結果分析圖 3-56
圖 3.1.9-1 歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較圖 3-69
圖 3.1.9-2 歷次海域生態-植物性浮游生物平均種類及平均豐度數(cells/L)比 3-84
圖 3.1.9-3 歷季海域生態-動物性浮游生物數量結果比較圖 3-91
圖 3.1.9-4 歷次海域生態-動物性浮游生物平均種類數及平均豐度

(ind./1000m^3)比較圖 3-96
圖 3.1.9-5 歷季海域生態-底棲生物數量結果比較圖 3-103
圖 3.1.9-6 歷次海域生態-底棲生物平均種類數及平均豐度(個體隻數)比較圖 3-108
圖 3.1.9-7 歷季海域生態-仔稚魚物種及豐度結果比較圖 3-114
圖 3.1.9-8 歷次海域生態-仔稚魚平均種類及平均豐度數(ind./1,000 m^3)比較圖 3-119
圖 3.1.9-9 歷季海域生態-總基礎生產力各季比較圖 3-126
圖 3.1.9-10 歷次海域生態-總基礎生產力歷次平均比較圖 3-141
圖 3.1.10-1 歷季河口生態-植物性浮游生物數量結果比較圖 3-147
圖 3.1.10-2 歷次河口生態-植物性浮游生物平均種類數及平均豐度(cells/l)比較圖 3-149
圖 3.1.10-3 歷季河口生態-動物性浮游生物數量結果比較圖 155
圖 3.1.10-4 歷次河口生態-動物性浮游生物平均豐度及平均種類數(ind./1000 m^3)比較圖 156
圖 3.1.10-5 歷季河口生態-底棲生物數量結果比較圖 162
圖 3.1.10-6 歷季河口生態-底棲生物平均種類數及平均豐度(個體隻數)比較圖 163
圖 3.1.10-7 歷季河口生態-魚類數量結果比較圖 170
圖 3.1.10-8 歷次河口生態-魚類平均種類數及平均豐度(尾)比較圖 172
圖 3.1.10-9 歷季河口生態-總基礎生產力結果比較圖 3-175
圖 3.1.10-10 歷次海域生態-總基礎生產力歷次平均比較圖 3-176
圖 3.1.11-1 歷年第 4 季永安和竹圍地區漁獲產量產值 3-181
圖 3.1.11-2 103-113 年鰻魚苗產量 3-181
圖 3.1.12.1-1 鳳凰颱風路徑圖(資料來源：颱風資料庫)..... 3-182
圖 3.1.12.1-2 懸浮固體濃度與新竹浮標波高資料 3-183

圖 3.1.12.1-3　G2 區懸浮固體濃度 114 年第 4 季與歷次逐時監測值比對圖 .3-184
圖 3.1.12.1-4　保護區懸浮固體濃度 114 年第 4 季與歷次逐時監測值比對 ...3-184
圖 3.1.12.2-1　歷年監測之沿岸流速剖面比較 3-189
圖 3.1.12.2-2　歷年監測之懸浮固體濃度剖面比較 3-193
圖 3.1.12.2-3　歷年監測之沿岸方向懸浮固體通量在時間與空間變化 3-194
圖 3.1.13.1-1　斷面 S01 至斷面 S03 底床高程變化圖 3-200
圖 3.1.13.1-2　斷面 S04 至斷面 S06 底床高程變化圖 3-201
圖 3.1.13.1-3　斷面 S07 至斷面 S09 底床高程變化圖 3-202
圖 3.1.13.1-4　113 年 12 月至 114 年 10 月主要等深線比較圖 3-205
圖 3.1.13.1-5　114 年 6 月至 114 年 10 月地形侵淤變化圖 3-205
圖 3.1.13.1-6　114 年 6 月至 114 年 10 月侵淤比較圖 3-206
圖 3.1.13.1-7　113 年 12 月至 114 年 10 月地形侵淤變化圖 3-207
圖 3.1.13.1-8　113 年 12 月至 114 年 10 月侵淤比較圖 3-208
圖 3.1.13.2-1　114 年 12 月與歷年同季觀音溪河道中心線變遷圖 3-210
圖 3.1.13.2-2　114 年 12 月與 114 年 3 月觀音溪河道中心線變遷圖 3-210
圖 3.1.13.2-3　114 年 12 月與歷年同季觀音溪河道中心線底床高程剖面圖 ..3-215
圖 3.1.13.2-4　114 年 12 月與 114 年 3 月觀音溪河道中心線底床高程剖面圖 3-216
圖 3.1.13.2-5　114 年 12 月與歷年同季觀音溪河口斷面底床高程變化圖 (SEC01~SEC03).....3-220
圖 3.1.13.2-6　114 年 12 月與歷年同季觀音溪河口斷面底床高程變化圖 (SEC04~SEC06).....3-221
圖 3.1.13.2-7　114 年 12 月與歷年同季觀音溪河口斷面底床高程變化圖 (SEC07~SEC09).....3-222
圖 3.1.13.2-8　114 年 12 月與歷年同季觀音溪河口斷面底床高程變化圖 (SEC10~SEC12).....3-223

圖 3.1.13.2-9 114 年 12 月與歷年同季觀音溪河口斷面底床高程變化圖(SEC13~SEC15) 3-224
圖 3.1.13.2-10 114 年 3 月與 113 年 12 月觀音溪河口斷面底床高程變化圖(SEC01~SEC03) 3-225
圖 3.1.13.2-11 114 年 3 月與 113 年 12 月觀音溪河口斷面底床高程變化圖(SEC04~SEC06) 3-226
圖 3.1.13.2-12 114 年 3 月與 113 年 12 月觀音溪河口斷面底床高程變化圖(SEC07~SEC09) 3-227
圖 3.1.13.2-13 114 年 3 月與 113 年 12 月觀音溪河口斷面底床高程變化圖(SEC10~SEC12) 3-228
圖 3.1.13.2-14 114 年 3 月與 113 年 12 月觀音溪河口斷面底床高程變化圖(SEC13~SEC15) 3-229
圖 3.1.14-1 區域 A1 歷次空拍資料成果 3-232
圖 3.1.14-2 區域 A2 歷次空拍資料成果 3-233
圖 3.1.14-3 區域 A3 歷次空拍資料成果 3-234
圖 3.1.14-4 區域 A4 歷次空拍資料成果 3-235
圖 3.1.14-5 區域 A5 歷次空拍資料成果 3-236
圖 3.1.14-6 區域 A6 歷次空拍資料成果 3-237
圖 3.1.14-7 區域 A7 歷次空拍資料成果 3-238
圖 3.1.14-8 區域 A8 歷次空拍資料成果 3-239
圖 3.1.14-9 區域 A9 歷次空拍資料成果 3-240
圖 3.1.14-10 區域 A10 歷次空拍資料成果 3-241
圖 3.1.14-11 區域 A11 歷次空拍資料成果 3-242
圖 3.1.14-12 區域 A12 歷次空拍資料成果 3-243

表目錄

頁　次

表 1.1-1　本計畫工程進度分析表 1-2
表 1.2-1　施工期間環境監測結果摘要表 1-3
表 1.3-1　施工期間環境監測計畫內容 1-14
表 1.4-1　海域水質和底泥、河口水質和底泥監測地點 1-20
表 1.5.2-1　空氣品質監測之各項品管要求 1-26
表 1.5.2-2　空氣品質監測之各氣體分析儀器 ZERO 與 SPAN 之管制範圍 1-26
表 1.5.2-3　空氣品質分析之品保目標說明 1-27
表 1.5.2-4　水質分析之品保目標說明 1-29
表 1.5.2-5　底泥檢測數據品保目標 1-30
表 1.5.3-1　空氣品質儀器校正頻率 1-31
表 1.5.3-2　噪音振動儀器校正頻率 1-34
表 1.5.3-3　水質分析儀器設備校正頻率 1-34
表 1.8.1-1　光學濁度計率定公式彙整表 1-47
表 1.8.2-1　各測線端點經緯度 1-50
表 1.8.2-2　表層、中層及底層水體樣本採樣點 1-52
表 1.9.1-1　控制點測量及陸域地形測量儀器規格 1-57
表 1.9.4-1　控制點坐標成果表 1-61
表 1.9.5-1　觀音溪口控制點坐標成果表 1-61
表 1.10.1-1　各分區沿岸兩點經緯度之整理 1-64
表 2.1-1　施工期間空氣品質監測結果分析表 2-2
表 2.2-1　施工期間噪音監測結果分析表 2-4
表 2.2-2　施工期間均能音量監測結果分析表 2-4
表 2.2-3　環境音量標準 2-5
表 2.2-4　日本振動規制法施行規則 2-6
表 2.2-5　施工期間振動監測結果分析表 2-7

表 2.2-6 施工期間均能振動量監測結果分析表 2-7
表 2.3-1 營建噪音監測結果分析表 2-9
表 2.3-2 營建工程噪音管制標準 2-9
表 2.4-1 施工期間低頻噪音監測結果分析表 2-10
表 2.5-1 道路服務水準表 2-11
表 2.5-2 施工期間路段交通量監測結果 2-12
表 2.5-3 施工期間路口交通量監測結果 2-14
表 2.6-1 陸域地面水體保護生活環境相關環境基準 2-20
表 2.6-2 地面水體保護人體健康相關環境基準 2-20
表 2.6-3 RPI 之計算及比對基準 2-21
表 2.6-4 底泥品質指標 2-21
表 2.6-5 本季河口水質監測結果分析表 2-22
表 2.6-6 本季河口水質河川污染指數彙整表 2-24
表 2.6-7 桃園市河口水質監測結果分析表 2-24
表 2.6-8 本季河口底泥監測結果分析表 2-26
表 2.6-9 桃園市政府河口底泥監測結果分析表 2-26
表 2.7-1 海域環境分類及海洋品質標準 2-28
表 2.7-2 本季海域水質監測結果分析表 2-29
表 2.7-3 本季海域底泥增測監測結果分析表 2-32
表 2.8.1-1 本季海域各測站之浮游植物統計表 2-35
表 2.8.1-2 本季海域浮游植物各測站之相似度三角矩陣 2-37
表 2.8.1-3 本季海域各測站之浮游植物與水質因子相關分析 2-38
表 2.8.2-1 本季海域各測站之浮游動物監測結果統計表 2-44
表 2.8.2-2 本季海域各測站之浮游動物相似度矩陣 2-45
表 2.8.2-3 本季海域各測站之浮游動物與水質因子相關分析 2-46
表 2.8.3-1 本季海域各測站之底棲生物之種類與數量 2-53
表 2.8.3-2 本季海域底棲生物各動物門之物種數及個體數 2-58
表 2.8.3-3 本季海域底棲生物之各測站間相似度分析表 2-58

表 2.8.3-4　本季海域底棲生物與水質因子相關分析 2-59
表 2.8.4-1　本季海域各測站仔稚魚之豐度(ind./1000m^3)、平均豐度(Mean ± S.E.)、相對豐度(R.A., %)、各測站之出現率(O.R., %)及歧異度分析表 2-65
表 2.8.4-2　本季海域各測站仔稚魚群集之相似度分析表 2-66
表 2.8.4-3　本季海域各測站之浮游性仔稚魚豐度與水質因子相關分析 2-66
表 2.8.5-1　本季海域各測站之總基礎生產力分析 2-68
表 2.8.5-2　本季海域各測站之總基礎生產力與水質因子相關分析表 2-69
表 2.9.1-1　本季河口各測站之浮游植物監測結果統計表 2-74
表 2.9.1-2　本季河口各測站之浮游植物相似度三角矩陣 2-75
表 2.9.1-3　本季河口各測站之浮游植物與水質因子相關分析 2-75
表 2.9.2-1　本季河口各測站之浮游動物監測結果統計表 2-81
表 2.9.2-2　本季河口各測站之浮游動物相似度矩陣 2-82
表 2.9.2-3　本季河口各測站之浮游動物與水質因子相關分析 2-82
表 2.9.3-1　本季河口各測站之底棲生物名錄 2-90
表 2.9.3-2　本季河口底棲生物各大類之種類數及總個體數 2-91
表 2.9.3-3　本季河口各測站底棲生物之相似度值 2-91
表 2.9.3-4　本季河口各測站底棲生物與水質因子相關分析 2-91
表 2.9.4-1　本季河口各測站之魚類資源調查結果表 2-97
表 2.9.4-2　本季河口各測站之魚類豐度與水質因子相關分析 2-99
表 2.9.5-1　河口總基礎生產力比較表 2-101
表 2.9.5-2　本季河口各測站之總基礎生產力與水質因子相關分析 2-101
表 2.10.1-1　本季刺網總捕獲科別、種類、單位尾數及單位總重量(114 年 09 月 22 日) 2-105
表 2.10.1-2　本季刺網總捕獲科別、種類、單位尾數及單位總重量(114 年 10 月 14 日) 2-105
表 2.10.1-3　本季刺網總捕獲科別、種類、單位尾數及單位總重量(114 年 11 月 20 日) 2-106

表 2.10.2-1 桃園地區歷年漁業專職與兼業從業人數 2-110
表 2.10.2-2 桃園地區魚苗產量產值 2-111
表 2.10.2-3 桃園地區漁船規模與作業型態 2-112
表 2.10.2-4 桃園地區歷年漁業產值產量 2-114
表 2.10.2-5 本季竹圍地區及永安地區漁船筏數 2-116
表 2.10.2-6 本季竹圍地區漁船筏之作業型態 2-117
表 2.10.2-7 本季永安地區漁船筏之作業型態 2-118
表 2.10.2-8 本季竹圍地區魚種供銷量及價格一覽表 2-122
表 2.10.2-9 本季永安地區魚種供銷量及價格一覽表 2-124
表 2.10.2-10 本季標本戶之作業資訊一覽表 2-125
表 2.10.2-11 本季竹圍地區標本戶作業資訊及漁獲一覽表 2-133
表 2.10.2-12 本季永安地區標本戶作業資訊及漁獲一覽表 2-134
表 2.10.2-13 本計畫調查發現之魚種俗名、中文名及學名對照表 2-136
表 2.10.2-14 本季分區海域之作業情況及漁獲資料 2-139
表 2.12-1 114 年 10 月颱風季節後陸域及海域地形測量期程 2-169
表 2.12-1 114 年觀音溪河口河道斷面監測作業期程 2-169
表 2.12.2-1 分析斷面控制點坐標 2-176
表 2.12.2-2 114 年 10 月各分析斷面主要水深斷面里程 2-176
表 2.12.2-3 114 年 10 月斷面坡度表 2-177
表 2.13.1-1 114 年第四季調查時間整理表 2-191
表 2.13.1-2 114 年秋季(10 月)A1~A12 空拍資料解析度 2-195
表 2.13.1-3 114 年冬季(12 月)A1~A12 空拍資料解析度 2-199
表 3.1-1 上季(114 年第 3 季)監測之異常狀況及處理情形 3-1
表 3.1-2 本季(114 年第 4 季)監測之異常狀況及處理情形 3-2
表 3.1.9-1 歷季海域生態-植物性浮游生物物種數結果比較表 3-60
表 3.1.9-2 歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較表 3-62
表 3.1.9-3 歷季海域生態-植物性浮游生物優勢物種比較表 3-67
表 3.1.9-4 歷季海域生態-動物性浮游生物結果比較表 3-86

表 3.1.9-5 歷季海域生態-動物性浮游動物優勢大類比較表 3-89
表 3.1.9-6 歷季海域生態-底棲生物結果比較表 3-98
表 3.1.9-7 歷季海域生態-底棲生物優勢物種比較表 3-100
表 3.1.9-8 歷季海域生態-仔稚魚結果比較表 3-110
表 3.1.9-9 歷季海域生態-仔稚魚優勢物種比較表 3-112
表 3.1.9-10 歷季海域生態-總基礎生產力各季比較表 3-121
表 3.1.10-1 歷季河口生態-植物性浮游生物結果比較表 3-143
表 3.1.10-2 歷季河口生態-植物性浮游生物優勢物種比較表 3-145
表 3.1.10-3 歷季河口生態-動物性浮游生物結果比較表 151
表 3.1.10-4 歷季河口生態-動物性浮游動物優勢大類比較表 153
表 3.1.10-5 歷季河口生態-底棲生物物種數結果比較表 158
表 3.1.10-6 歷季河口底棲生物優勢物種比較表 160
表 3.1.10-7 歷季河口生態-魚類結果比較表 166
表 3.1.10-8 歷季河口生態-魚類生物優勢物種比較表 168
表 3.1.10-9 歷季河口生態-總基礎生產力結果比較表 174
表 3.1.11-1 歷年刺網採樣漁獲統計 3-179
表 3.1.11-2 歷年第 4 季(9～11 月)之刺網捕獲生物之科別、種類及單位漁獲尾數(ind./hr) 180
表 3.1.12.1-1 G2 區各時間區間與各季最大濃度整理表 3-185
表 3.1.12.1-2 保護區各時間區間與各季最大濃度整理表 3-185
表 3.1.13.1-1 114 年 6 月至 114 年 10 月斷面侵淤分析表 3-198
表 3.1.13.1-2 113 年 12 月至 114 年 10 月斷面侵淤分析表 3-198
表 3.1.13.1-3 114 年 6 月至 114 年 10 月等深線侵淤比較表 3-199
表 3.1.13.1-4 113 年 12 月至 114 年 10 月等深線侵淤比較表 3-199
表 3.1.13.2-1 108 年 12 月觀音溪河道中心線高程及坡降 3-212
表 3.1.13.2-2 109 年 12 月觀音溪河道中心線高程及坡降 3-212
表 3.1.13.2-3 110 年 12 月觀音溪河道中心線高程及坡降 3-212
表 3.1.13.2-4 111 年 12 月觀音溪河道中心線高程及坡降 3-213

表 3.1.13.2-5　112 年 12 月觀音溪河道中心線高程及坡降 3-213
表 3.1.13.2-6　113 年 12 月觀音溪河道中心線高程及坡降 3-213
表 3.1.13.2-7　114 年 3 月觀音溪河道中心線高程及坡降 3-213
表 3.1.13.2-8　114 年 12 月觀音溪河道中心線高程及坡降 3-213
表 3.1.14-1　歷次觀察結果總表 3-231

前　言

0.1 依　據

中油公司為配合政府「確保核安、穩健減核、打造綠能低碳環境、逐步邁向非核家園」之新能源政策及未來北部地區電力需求成長產生之電力缺口，評估未來北部民生及工業用天然氣市場將持續成長、中油公司永安及台中兩座接收站卸收能量、管輸能力已接近上限及臺灣地區北中南整體性天然氣穩定供應策略等因素，於北部地區興建第三座LNG接收站有其必要性。

觀塘工業區設置接收站，已於88年通過環境影響評估，該工業區開發計畫之填海造地工程，自90年11月至92年07月止，填海造地已初步完成部份海堤及填築約2.5公頃用地。且桃園市觀塘工業區開發計畫及桃園市觀塘工業區工業專用港開環境差異分析已通過環保署(現環境部)第340次環評大會審查。

本監測作業係依據環保署(現環境部)107年11月30日環署綜字第1070089248號函備查「桃園市觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書藻礁生態系因應對策暨環境影響差異分析報告」定稿本所載之環境監測計畫內容(藻礁生態部分另案辦理)，據以執行。

依據經濟部工業局108年04月10日以工地字第10800333280號函知環保署(現環境部)旨揭工業專用港預定施工日期為108年05月01日。另依據台灣中油股份有限公司108年06月21日油液工發字第10810414630號函說明因配合第一座沉箱完成日期及考量沉箱施放作業之海象條件等因素，工業專用港預定施工日期展延至108年06月25日，並於108年06月25日獲環保署(現環境部) (環署督字第1080045227號函)收悉在案。

後依行政院環境保護署(現環境部)111年03月14日環署綜字第1111034164號通過之「桃園市觀塘工業區工業專用港環境影響說明書環境影響差異分析報告(外推方案)」，執行修正後之環差監測規劃內容。

0.2 監測執行期間

為確實掌握第三座液化天然氣接收站建港及圍堤造地新建工程期間環境現況，工業區復工起執行施工期間環境監測工作，本季監測為114年第4季環境監測，監測期間為114年10月1日至114年12月31日。

0.3 執行監測單位

一、環興科技股份有限公司：計畫綜整/數據分析/報告撰寫。

二、國立中央大學：主要負責礁體懸浮固體監測與海域地形地貌、水深調查。

三、力新科技公司：主要負責亞潮帶及河口浮游植物、浮游動物、底棲生物、基礎生產力與亞潮帶魚類(仔稚魚及魚卵)監測。

四、國立海洋大學：主要負責河口魚類監測。

五、國立海洋大學：主要負責漁業經濟之監測作業。

六、台灣檢驗科技股份有限公司(環境部認可證號第 035 號)：主要負責空氣品質、噪音振動、營建噪音、低頻噪音、交通流量等監測作業。

七、正修科技大學(環境部認可證號第 079 號)：主要負責海域水質和底泥以及河口水質和底泥等監測作業。

本監測計畫之工作組織，詳如**圖0.3-1**所示。



圖 0.3-1 本計畫施工期間環境監測工作組織圖

第一章　監測內容概述

1.1 工程進度內容概述

本計畫包含觀塘工業區及觀塘工業區專用港兩大部分，其中屬於工業港之工項為北防波堤、南防波堤、LNG 卸收碼頭及相關附屬土建設施、港勤碼頭繫靠設施等範圍。工業區主要工項為原有地區護岸改善，儲槽區、氣化區及連通道區造地等範圍，基地區位詳如**圖1.1-1**所示。

儲槽工程部分2座16萬公秉地上式儲槽已完成，實際進度100%。

圍堤造地工程部分，沉箱138座全數完成預製及定位(包含：北防波堤37座、碼頭後線80座、LNG碼頭21座)，工程進度詳**表1.1-1**所示。




圖 1.1-1 開發計畫施工現況圖

表1.1-1 本計畫工程進度分析表

編號	工程項目與名稱	預定進度(%)	實際進度(%)
1	儲槽工程	100%	100%
2	建港及圍堤造地工程	100%	100%
3	棧橋工程	100%	100%
4	氣化設施工程	100%	100%
5	36 吋陸管工程	100%	100%
6	外廓防波堤	60.13%	77.48%
7	棧橋延伸	100%	100%
8	外推製程設備與管線	99.99%	99.99%

氣化設施、站區內建築及各公用系統均已完成。，實際進度 100 %。

36吋陸管目前陸管均已埋設完成，包含第1階段11公里及第2階段2.3公里，實際進度100 %。

外廓防波堤截至114.12.31止，已完成140座沉箱預製、北防波堤97座定位及37座暫存於觀塘，正在進行沉箱預製、卵石拋放、堤面鋼筋模板施作，實際進度77.48 %。

棧橋延伸，已完成33座沉箱預製/定位/堤面，實際進度100 %。

外推製程設備與管線,LNG製程管線、卸收平台及外海取排水管線均已完成;現正進行收尾工作，實際進度99.99 %。

1.2 監測情形概述

有關本季施工期間之環境監測結果，經彙整摘要如**表1.2-1**所示。

1.3 監測計畫概述

有關本季所執行之監測計畫內容，茲整理詳見**表1.3-1**所示。

1.4 監測位址

有關環境監測計畫之監測位址，詳如**圖1.4-1**所示。

表1.2-1 施工期間環境監測結果摘要表

監測類別	監 測 項 目	監測結果摘要	因應對策
空氣品質	TSP、PM_{10}、$PM_{2.5}$、CO 、NO_x (NO 、NO_2)、SO_2、THC、鹽份、雨中pH值、風速、風向、溫度及濕度	本季各測站空氣品質監測結果皆符合標準。	持續監測。
噪音振動	1.噪音：L_{eq}、L_x、L_{max}、$L_{日}$、$L_{晚}$、$L_{夜}$ 2.振動：L_{vx}、L_{veq}、L_{vmax}、$L_{v日}$、$L_{v夜}$	本季各測站噪音振動監測結果皆符合標準。	持續監測。
營建噪音	L_{eq}、L_{max}	兩站皆符合第二類日間營建工程噪音管制標準。	持續監測。
低頻噪音	監測項目：L_{eq} 20～200Hz 平日：$L_{eq,LF日}$、$L_{eq,LF晚}$、$L_{eq,LF夜}$ 假日：$L_{eq,LF日}$、$L_{eq,LF晚}$、$L_{eq,LF夜}$。	1. $L_{eq,LF日}$於本季各測站之測值介於 49.8~53.3 dB(A)，以台 15 與桃 93 路口(非假日)測值為最高。 2. $L_{eq,LF晚}$於本季各測站之測值介於 45.7~48.9 dB(A)，以台 15 與桃 92 路口(非假日)及台 15 與桃 94 路口(非假日)測值為最高。 3. $L_{eq,LF夜}$於本季各測站之測值介於 43.6～48.1 dB(A)，以台 15 與桃 92 路口(非假日)測值為最高。 4. 低頻噪音部分，本季假日低頻 $L_{eq,LF}$ 日與非假日 $L_{eq,LF}$ 夜低於去年同一季(113Q4)測值；與 108 年至 113 年移動平均值比較，假日與非假日低頻皆低於移動平均值。	持續監測。
交通流量	車輛類型、數目及流量	1. 本季路段交通流量非假日車輛數介於 2,741～8,283 輛，以東明國小往西最高；假日車輛數介於 2,193～7,718 輛，各站尖峰時段服務水準為 A，尚未因施工造成路段壅塞之情事。 2. 本季路口交通流量非假日車輛數介於 941～6,940 輛，以台 61 線與台 66 線(台 66 往西)最高；假日車輛數介於 689～5,634 輛，	持續監測。

監測類別	監 測 項 目	監測結果摘要	因應對策
		以台 15 線與台 66 線(台 66 往西)最高，各站尖峰時段服務水準皆為 A，尚未因施工造成路口壅塞之情事。	
河口水質和底泥	1.河口水質：透明度、水溫、鹽度、酸鹼值(pH)、溶氧量(DO)、BOD、油脂、磷酸鹽、硝酸鹽、酚、矽酸鹽、葉綠素、鋅、銅、鉛、鎘、汞、鎳、六價鉻、鐵、懸浮固體(SS)、比導電度、硝酸鹽氮、氨氮、總磷、大腸桿菌群、化學需氧量 註：葉綠素所指之分析項目為葉綠素 a 之濃度	觀音溪、新屋溪及社子溪河口適用丙類陸域地面水體水質標準；小飯壢溪適用戊類陸域地面水體水質標準；大堀溪適用丁類陸域地面水體水質標準。 1. 大堀溪河口: 各檢測測項符合丁類水質標準，BOD_5/COD 比值為 0.09。 2. 觀音溪河口：大腸桿菌群 75,000 CFU/100mL，氨氮 3.40 mg/L，不符合丙類水質標準，BOD_5/COD 比值為 0.08。 3. 小飯壢溪河口:各檢測測項符合戊類水質標準，BOD_5/COD 比值為 0.03。 4. 新屋溪河口: 氨氮 2.14 mg/L，不符合丙類水質標準，BOD_5/COD 比值為 0.02。 5. 社子溪河口：大腸桿菌群 62,000 CFU/100mL，氨氮 3.22 mg/L，不符合丙類水質標準，BOD_5/COD 比值為 0.03。 除上述所敘，各河口測站檢測數據則皆符合地面水體分類及水質標準表 2.6-2 之「保護人體健康相關環境基準」。	本次調查結果顯示主要為大腸桿菌群及氨氮等測項超過所屬標準，其污染項目與生活污水關聯較大，故其水質現況與上游污染源有關聯，後續持續監測。
	2.河口底泥：銅、鋅、鎘、鉻、鎳、鉛、汞、砷	1. 大堀溪河口：銅、鋅及鎳介於底泥品質指標下限值和上限值之間，其餘測項符合底泥品質指標下限值。 2. 觀音溪河口:鎳及砷介於底泥品質指標下限值和上限值之間，其餘測項符合底泥品質指標下限值。 3. 小飯壢溪河口: 鋅介於底泥品質指標下限值和上限值之間，其餘測項符合底泥品質指標下限值。 4. 新屋溪河口: 銅及鎳介於底泥品質指標下限值和上限值之間，其餘測項符合底泥品質指標下限值。	部分河口之底泥鋅、銅、鎳及砷金屬濃度分布於底泥品質指標下限值和上限值之間，推測應為上游工業廢水貢獻而累積於底泥中。經蒐集桃園市政府 107-113 年鄰近河口點位之監測

監測類別	監 測 項 目	監測結果摘要	因應對策
		5. 社子溪河口: 銅介於底泥品質指標下限值和上限值之間，其餘測項符合底泥品質指標下限值。	資料進行比對，底泥重金屬濃度分布趨勢與本計畫大致相符。且歷次底泥監測結果超標項目變化不大，故超標情形應為背景狀況，後續將持續監測。
海域水質和底泥	1.海域水質：透明度、水溫、鹽度、酸鹼值(pH)、溶氧量(DO)、BOD、油脂、磷酸鹽、硝酸鹽、酚、矽酸鹽、葉綠素、鋅、銅、鉛、鎘、汞、鎳、六價鉻、鐵、懸浮固體(SS) 註：葉綠素所指之分析項目為葉綠素a之濃度	1. 大堀溪出海口測線：監測結果皆符合乙類海域海洋環境品質標準之相關測項。 2. 觀音溪出海口測線：監測結果皆符合乙類海域海洋環境品質標準之相關測項。 3. 小飯壢溪出海口測線：監測結果皆符合乙類海域海洋環境品質標準之相關測項。 4. 新屋溪出海口測線：監測結果皆符合乙類海域海洋環境品質標準之相關測項。 5. 社子溪出海口測線：監測結果皆符合乙類海域海洋環境品質標準之相關測項。	持續監測。
	2.海域底泥：銅、鋅、鎘、鉻、鎳、鉛、汞、砷	114年度第4季海域底檢測： 1. 鎘各測站濃度0.43~1.85 mg/Kg，本季各測站皆高於基線濃度0.14 mg/Kg。 2. 鉛濃度範圍介於17.6~32.4 mg/Kg，本季測站僅4C、5A及5B低於基線濃度19.9 mg/Kg，其餘高於基線濃度。 3. 鉻濃度範圍介於18.9~22.9 mg/Kg，本季各測站皆低於基線濃度24.8 mg/Kg。 4. 砷濃度範圍介於15.7~57.2 mg/Kg，本季測站僅5B低於基線濃度16.1 mg/Kg，其餘皆高於基線濃度。 5. 汞各測站濃度皆為ND mg/Kg，各測站皆低於基線濃度0.02 mg/Kg。	目前我國海域底泥品質並無相關適用標準，本計畫採用108Q1~114Q4歷季平均值做為基線，後續將與基線比較持續監測。

<table>
<tr><th>監測類別</th><th>監 測 項 目</th><th>監測結果摘要</th><th>因應對策</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>6. 銅濃度範圍介於 6.15~16.8 mg/Kg，本季各測站皆低於基線濃度 21.4 mg/Kg。
7. 鋅濃度範圍介於 81.3~96.2 mg/Kg，本季各測站皆低於基線濃度 96.7 mg/Kg。
8. 鎳濃度範圍介於 21.2~25.4 mg/Kg，本季測站僅 2B、4C、5A 及 5B 低於基線濃度 22.5 mg/Kg，其餘皆高於監測基線濃度。

綜理來說，本季(114Q4)底泥與前季(114Q3)底泥相比，前季底泥鋅在 1A、1B、2A、2B、3A 及 4A 點與底泥鉻在 1A、1B、2A 及 4A 點位濃度有上升之趨勢，本季濃度已下降至低於基線濃度。而底泥鎘 1A、1B、1C、2A、2C、3A、3B、3C 及 4B 點位與底泥砷 1A、1B、1C、2A、2B 及 3C 點位濃度有上升趨勢，其餘各站之金屬濃度範圍皆相似，無異常升高趨勢。工區內廢水皆委託合格業者處理無異常排放狀況，後續將持續監測。

<table>
<tr><th>編號</th><th>河口測站</th><th>海域測站</th></tr>
<tr><td>1</td><td>大堀溪口</td><td rowspan="5">A ～ C 為沿河口測站測線 10 m,15 m,30 m 之不同水深深度</td></tr>
<tr><td>2</td><td>觀音溪口</td></tr>
<tr><td>3</td><td>小飯壢溪口</td></tr>
<tr><td>4</td><td>新屋溪口</td></tr>
<tr><td>5</td><td>社子溪口</td></tr>
</table>
</td><td></td></tr>
<tr><td>海域生態</td><td>浮游植物</td><td>1. 本季亞潮帶共發現矽藻 32 種、矽質鞭毛藻 3 種、渦鞭毛藻 2 種、及裸藻 1 種，總計發現 38 種以上，豐度介於 8,000 至 101,200 cells/L 之間，豐度在近遠岸的差異不大，以 5C 社子溪表層的豐度最高。
2. 本季浮游植物以矽藻之海鏈藻屬及角毛藻屬較為優勢，分別佔了總豐度的 32%及 23%左右。
3. 約有 2/3 樣品之群集相似度在 60%以下，表層豐度略較中層及底層豐度高。</td><td>持續監測。</td></tr>
</table>

監測類別	監 測 項 目	監測結果摘要	因應對策
		4. 浮游植物豐度與所測的各環境水質因子中之懸浮固體及鎳成正相關，而與葉綠素a沒有顯著相關。 5. 五條測線間，社子溪測線浮游植物豐度顯著較其他測線豐度高。	
	浮游動物	1. 本季觀塘亞潮帶海域浮游動物之平均豐度為 106,038 ± 9,197 ind./1,000m^3，平均發現大類數 18 ± 1 種。 2. 本季浮游動物之前六個主要優勢類群分別為哲水蚤（48.74％）、劍水蚤（15.85％）、藤壺幼生（7.58％）、猛水蚤（6.41％）、蝦類幼生（5.51％）及橈足類幼生（3.13％），此六個主要優勢類群合計佔本季浮游動物總豐度的 87.22％。 3. 相似度分析方面，本季近遠岸測站的區隔並不明顯，顯示近、岸間的種類組成無太大差異，各測站相似度介於 82.28%~93.49%之間。 4. 以 ANOVA 分析各測站豐度，顯示在近、遠岸間及各測線間皆無顯著差異存在。 5. 浮游動物豐度與海水溫度、鹽度及浮游植物豐度皆無顯著相關。	持續監測。
	底棲生物	1. 本季亞潮帶共計有 7 個動物門 131 科 171 屬 190 種 3,410 隻生物個體；平均生物豐度為 2.15 ± 0.37 (隻/m^2)。 2. 本季以軟體動物 87 種為最多，其次為節肢動物 45 種，捕獲最多個體數的種類為北海道櫻蛤(*Nitidotellina valtonis*)514 隻生物個體、珊瑚蜊(*Gregariella coralliophaga*) 483 隻生物個體。 3. 各測站間底棲生物相似度由 1.98%至 57.15%之間。 4. 以 ANOVA 分析各測站豐度，顯示在各測	持續監測。

監測類別	監 測 項 目	監測結果摘要	因應對策
		線間無顯著差異；近、遠岸間無顯著差異。 5. 底棲生物豐度與環境底層水質因子正磷酸鹽為顯著相關。	
	魚類(仔稚魚及魚卵)	1. 本季(10月)於觀塘附近海域亞潮帶15個測站所採集之浮游性仔稚魚計3科3屬3種，各測站平均豐度為305±200 (ind./1,000m^3)。採得魚種以真鯛(*Pagrus major*)為最優勢種(相對豐度為66.76%)。 2. 本季各測站仔稚魚群集組成相似度方面，除去未採得樣本之測站後，以新屋溪口外測站4C及社子溪口外5C測站魚種群集組成相似度最高(92.86%)，其次為社子溪口外之5B及5C測站(82.56%)。 3. 本季海域仔稚魚豐度與水質因子相關性分析結果顯示，仔稚魚豐度與海水表層溫度、酸鹼值及溶氧量值皆呈顯著負相關。	持續監測。
	總基礎生產力	1. 本季海域基礎生產力介於 0.13～12.45 mg C/m^3/h 之間。 2. 本季海域以測線1顯著高於其它測線，不同水深間之基礎生產力無顯著差異。 3. 本季海域總基礎生產力與浮游植物豐度有顯著正相關，而與其他水質因子之透明度及鋅濃度為顯著負相關，與溫度、DO、油脂及鎳為顯著正相關，與水體葉綠素a濃度無顯著相關。	持續監測。
河口生態	浮游植物	1. 本季河口共發現32種，平均豐度為695,120±631,230 cells/L。 2. 優勢種以綠藻之空星藻屬較為豐富，佔了總豐度31%。 3. 3D 小飯壢溪口測站之浮游植物組成與其他測站相似度較低。	持續監測。

監測類別	監 測 項 目	監測結果摘要	因應對策
		4. 與所測的環境及水質因子及葉綠素 a 進行相關性分析，浮游植物豐度與總磷有顯著正相關。	
	浮游動物	1. 本季觀塘河口海域浮游動物之平均豐度為 78,000±7,178ind./1,000m^3，平均發現大類數 12 ± 1 種。 2. 本季浮游動物之前六個主要優勢類群分別為哲水蚤（19.49％）、劍水蚤（18.72％）、蝦類幼生（16.67％）、藤壺幼生（12.31％）、橈足類幼生（8.21％）及蟹類幼生（6.41％），此六個主要優勢類群合計佔本季浮游動物總豐度的 81.81％。 3. 由相似度分析結果顯示，本季河口各測站的浮游動物物種組成相似度介於 78.57％~85.55％之間。 4. 以 ANOVA 統計檢定分析結果顯示，本季各河口浮游動物豐度在測站間無顯著差異存在。 5. 浮游動物豐度與海水溫度、鹽度及浮游植物豐度皆無顯著相關。	持續監測。
	底棲生物	1. 本季河口底棲動物共計 3 門 14 科 14 屬 14 種共 106 個體，數量最多的是雙扇股窗蟹 63 隻生物個體。 2. 小飯壢溪口與新屋溪口間相似度 75.93%為最高；大堀溪口與社子溪口之間 26.70%為最低。 3. 以變異數分析(ANOVA)檢驗 5 個河口測站以方框於潮間帶高中低 3 個位置與蝦籠、魚籠共 5 次採樣所採穫之底棲動物個體數量，而五個河口測站間無顯著相關。 4. 以相關性分析(Spearman correlation)分析底棲動物豐度與 30 項水質監測因子，與 pH	持續監測。

監測類別	監 測 項 目	監測結果摘要	因應對策
		值、導電度、鐵濃度、鹽度等四項數值有顯著相關。	
	魚類	1. 本季(10-12 月)進行河口魚類群聚生態調查，共調查紀錄到共 7 科 7 屬 8 種 50 尾河口魚類。各採測站豐度指標(*SR*)介於 0 至 2.16 間，以新屋溪最高。 2. 本季前三名優勢魚種為：尼羅口孵魚、花身鰕虎和凹鼻鮎。本季採樣調查，未發現任何特有及保育類物種。 3. 大堀溪單位努力量為 7.00 (尾/籠)、觀音溪單位努力量為 0.33 (尾/籠)、小飯壢溪單位努力量為 8.00 (尾/籠)、新屋溪單位努力量為 1.33 (尾/籠)及社子溪單位努力量為 0.00 (尾/籠)。本季五個河口中，小飯壢溪魚獲量最高。 4. 本季各採測站魚類豐度與環境監測水質因子之間鋅接近顯著相關。	持續監測。
	總基礎生產力	1. 本次河口測站總基礎生產力，各河口介於 0.05～0.58 mg C/m^3/h，五個測站數值皆不高。 2. 本季河口基礎生產力與所測之環境水質因子皆無顯著相關，與浮游植物豐度及葉綠素 a 濃度也無顯著相關。	持續監測。
漁業經濟	漁業產值、海域養殖現況、漁民作業型態結構、漁船類別、漁船數、漁場分佈、漁苗產量、經濟魚種之捕獲量及價值。	1. 本季 3 次採樣共捕獲 44 尾魚類，樣本總重共 38.084 公斤，分類出 10 科 13 種。綜合平均本季三次採樣漁獲尾數之結果來看，主要優勢魚種為中國鯧 (*Pampus chinensis*)，佔總捕獲樣本數的 22.73 %，而總捕獲數量為	持續監測。

監測類別	監 測 項 目	監測結果摘要	因應對策
		每小時 1.67 尾。 2. 漁業資源調查： (1)根據漁業統計年報統計，113 年桃園地區漁業從業人數總計約 2,232 人，沿岸漁業人數佔整體漁業從業人數的 94.8%；其次為從事內陸漁撈的埤塘漁業，漁業人數僅佔整體漁業從業人數的 4.58%。養殖方面，桃園地區僅有內陸養殖，並無海面養殖的相關資訊。 (2)產值產量分析顯示，近海漁業部分從 98 年達到高峰後，產量開始出現顯著起伏變化，於 105 年還有 124 噸之生產量，到了 113 年僅剩 4 噸(產值 1,940 千元)；而沿岸漁業之產量雖也有部分顯著變化之年份，但整體平均來看屬於一穩定狀態，多維持於 600 噸上下，113 年產值為 235,091 千元。 (3)桃園地區漁船總艘數為 774 艘，其作業漁船多以動力漁筏(CTR)、動力舢舨(CTS)和未滿 5 噸之漁船(CT0)為主。主要作業漁船在 97 年以前以刺網船為最大宗，爾後刺網船數減少，而一支釣船數緩慢增加，106 年起漁業署補助刺網漁業轉型一支釣或曳繩釣漁業，故漁船數量自 107 年起以一支釣船為最多。 (4)魚苗之種類，僅出現烏魚苗與鰻魚苗兩種，其中烏魚苗產量自 92 年的 9,565 千尾一路下滑到 98 年的 2,300 千尾，隔年開始桃園地區就無捕撈烏魚苗之相關紀錄，鰻魚苗產量則在 95 年達到高峰(3,726 千尾)後，產量開始減少，至 113 年，鰻魚苗產量僅剩 24 千尾。 (5)桃園地區產量前五名依序為：日本真鱸(18,277 公斤)、馬鮫科(16,380 公斤)、其他鯵(6,508 公斤)、其他石斑(5,886 公斤)、黑鯛(5,747 公斤)；產值方面，依序為馬鮫科(965 萬元)、日本真鱸(732 萬元)、其他石	

監測類別	監 測 項 目	監測結果摘要	因應對策
		斑(298 萬元)、鯧魚(278 萬元)、銀鯧(268 萬元)，本季總產量為 8.5 萬公斤，總產值為 3,535 萬元。 (6)標本戶漁船作業位置主要集中於北緯 24 度 56 分～25 度 10 分，東經 120 度 56 分～121 度 18 分範圍內。9 月平均 CPUE 為 1.03 公斤/小時，10 月平均 CPUE 為 1.22 公斤/小時，11 月平均 CPUE 為 2.37 公斤/小時。 3. 本季在調查區域未捕獲任何紅肉丫髻鮫(*Sphyrna lewini*)個體，因此彙整近期新發表與本種相關的文獻共 8 篇，內容包含微量元素分析法探討食用本種的風險、以穩定性同位素或脂肪酸或胃內容物分析探討本種的生態意義、透過水下及空中觀察記錄本種的群聚現象、利用分子生物學方法檢測本種的非法貿易情形、以衛星籤標識放流探討本種於不同大洋的移動。	
礁體懸浮固體監測	每日漂沙監測	1. 本季 G2 區未發生懸浮固體濃度持續 300 小時大於 100 mg/L 的情形，G2 區最長區間為 2 小時(12/25 13:00 至 12/25 14:00)。 2. 本季保護區未發生懸浮固體濃度持續 300 小時大於 100 mg/L 的情形，保護區最長區間為 20 小時(10/23 02:00 至 10/23 22:00。	持續監測。
	海域空間濁度變化監測	114 年 11 月觀測結果顯示港內懸浮固體濃度低，但潮汐對懸浮固體通量仍有主導性，漲退潮期間各區域流速、懸浮固體濃度在各區域有不同變化。全區整體之流速以向東為主且退潮潮流強勁平均流速為 0.19m/s，懸浮固體濃度為 14.7mg/L；港區內流速僅為 0.04m/s，懸浮固體濃度為 6.3mg/L；淺水區平均流速較快可達 0.36m/s，懸浮固體濃度也較高為 26.4mg/L	—
辦理海域	海域地形水深測量	本次颱風季後的海域地形水深測量，在水深斷面比較上各斷面平均侵淤深度或高度最大在	—

監測類別	監 測 項 目	監測結果摘要	因應對策
地形水深測量		0.45 公尺以內，與前兩次測量之高程變化趨勢相近。等深線比較的情形，各斷面在一年內互有侵蝕以及淤積的情形發生。水深侵淤比較，颱風季前後(114/06~114/10 期間)全區域土方變化平均侵蝕深度為 -0.06 公尺；一年(113/12~114/10 期間)全區域土方變化平均侵蝕深度為-0.10 公尺。	
	觀音溪河口河道斷面監測作業	114 年 12 月觀音溪河口調查，河道中心線底床高程從陸側高程+1.09m(便橋外側)到外海高程為+0.67m(中心線里程 320 公尺)，全斷面平均坡降為 1/748，於里程 300 公尺以外河道已不明顯，略呈漫水狀態；全斷面底床高程最高處位於里程 158 公尺處，高程為+1.38m，現場施測當日該處河道仍有溪水通過，里程 300 公尺內皆可明顯辨識河道位置。	—
辦理海域地形地貌調查	高解析度地形地貌攝影	本季完成 2 次高解析度地形地貌攝影。根據歷年調查結果發現，調查區域除了 G1 區(A9)有明顯季節覆沙變動特性外，其餘區域無明顯覆沙季節特性。	持續觀測。

表1.3-1 施工期間環境監測計畫內容

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間
空氣品質	TSP、PM_{10}、$PM_{2.5}$、CO、NO_x (NO、NO_2)、SO_2、THC、鹽份、雨水 pH 值、風速、風向、溫度及濕度	觀音國中、大覺寺、永安國中、清華高中	每季一次	1.TSP：NIEA A102.13A 2.PM_{10}：NIEA A206.11C 3.$PM_{2.5}$：NIEA A205.11C 4.CO：NIEA A421.13C 5.NOx：NIEA A417.12C 6.SO_2：NIEA A416.13C 7.THC：NIEA A740.10C 8.鹽份(氯鹽)：NIEA A451.10C 9.pH：NIEA W424.53A	台檢公司	114/10/13~14
噪音振動	噪音： L_{eq}、L_x、L_{max}、$L_{日}$、$L_{晚}$、$L_{夜}$ 振動： L_{vx}、L_{veq}、L_{vmax}、$L_{v日}$、$L_{v夜}$	台 15 與桃 92 交會路口、台 15 與桃 94 交會路口、台 15 與桃 93 交會路口	每季一次	1.噪音：NIEA P201.96C 2.振動：NIEA P204.90C	台檢公司	114/10/12~13
營建噪音	L_{eq}、L_{max}	於計畫區周界外十五 m 處設置二測站，測站位置將配合施工地點	每季一次	噪音：NIEA P201.96C	台檢公司	114/10/13
低頻噪音	$L_{eq,LF日}$、$L_{eq,LF晚}$、$L_{eq,LF夜}$	台 15 與桃 92 交會路口、台 15 與桃 94 交會路口、台 15 與桃 93 交會路口	每季一次	1.噪音：NIEA P201.96C 2.低頻噪音：NIEA P205.93C	台檢公司	114/10/12~13
交通流量	車輛類型、數目及流量	大潭國小、觀音橋、坑尾活動中心、東明國小、台 61 線及台 66 線交會口、台 66 線及台 15 線交會口	每季一次	人工計數法及數位錄影	台檢公司	114/10/12~13

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間
海域水質和底泥	海域水質：透明度、水溫、鹽度、酸鹼值(pH)、溶氧量(DO)、BOD、油脂、磷酸鹽、硝酸鹽、酚、矽酸鹽、葉綠素、鋅、銅、鉛、鎘、汞、鎳、六價鉻、鐵、懸浮固體(SS) 註：葉綠素所指之分析項目為葉綠素 a 之濃度	於計畫區鄰近海域設置15個測站，並每站分別監測表層、中層及底層之水質	每季一次	1.透明度：NIEA E220 2.水溫：NIEA W217 3.鹽度：NIEA W447 4.氫離子濃度指數(pH)：NIEA W424(OCA W403.50C) 5.溶氧量(DO)：NIEA W455(OCA W401.50C) 6.生化需氧量(BOD)：NIEA W510 7.油脂：NIEA W506(OCA W502.50C) 8.正磷酸鹽：NIEA W443 9.硝酸鹽：NIEA W436 10.酚類：NIEA W524 11.矽酸鹽：NIEA W450 12.葉綠素 a：NIEA E508 13.鋅、銅、鉛、鎘：NIEA W311/W308 14.鎳、鐵：NIEA W311/W308 15.汞：NIEA W330 16.六價鉻：NIEA W320/W343 17.懸浮固體：NIEA W210	正修科大	114/10/13
	海域底泥：銅、鋅、鎘、鉻、鎳、鉛、汞、砷	於計畫區鄰近海域設置 15 個測站	每季一次	1.鉛、鎘、銅、鉻、鋅、鎳：NIEA S321/NIEA M104 2.砷：NIEA S310 3.汞：NIEA M317	正修科大	114/10/13
河口水質和底泥	透明度、水溫、鹽度、酸鹼值(pH)、溶氧量(DO)、BOD、油脂、磷酸鹽、硝酸鹽、酚、矽酸鹽、葉綠素、鋅、銅、鉛、鎘、汞、鎳、六價鉻、鐵、懸浮固體(SS)、比導電度、硝	大堀溪、觀音溪、小飯壢溪、新屋溪及社子溪河川河口	每季一次	1.透明度：NIEA E220 2.水溫：NIEA W217 3.鹽度：NIEA W447 4.氫離子濃度指數(pH)：NIEA W424	正修科大	114/10/15

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間
	酸鹽氮、氨氮、總磷、大腸桿菌群、化學需氧量 註：葉綠素所指之分析項目為葉綠素 a 之濃度			5.溶氧量(DO)：NIEA W455 6.生化需氧量(BOD)：NIEA W510 7.油脂：NIEA W506 8.懸浮固體：NIEA W210 9.導電度：NIEA W203 10.正磷酸鹽：NIEA W443 11.硝酸鹽氮：NIEA W436 12.酚類：NIEA W521 13.矽酸鹽：NIEA W450 14.葉綠素 a：NIEA E508 15.氨氮：NIEA W437 16.總磷：NIEA W442 17.大腸桿菌群：NIEA E202 18.重金屬(鎘、銅、鉻、鎳、鋅、鐵)：NIEA W311 19.重金屬(鉛)：NIEA W313 20.化學需氧量：NIEA W517		
	河口底泥：銅、鋅、鎘、鉻、鎳、鉛、汞、砷	大堀溪、觀音溪、小飯壢溪、新屋溪及社子溪河川河口	每季一次	1.鉛、鎘、銅、鉻、鋅、鎳：NIEA S321/NIEA M104 2.砷：NIEA S310 3.汞：NIEA M317	正修科大	114/10/15
海域生態	1.浮游植物 2.浮游動物 3.底棲生物 4.魚類 5.基礎生產力	大堀溪口、觀音溪口、觀塘工業區、新屋溪口及社子溪口外海，每條樣線又依離岸水深 10 m、15 m 及 30 m 設置採樣點，構成 15 個採樣測點，共 15 個測點。	每季一次	1.「水中浮游植物採樣方法-採水法」(NIEA E505.50C)以採水器進行表、中、底層的採樣。 2.以「海洋浮游動物檢測方法」(NIEA E701.20C)，使用之網具為北太平洋標準網(NorPac net，網口直徑 45 cm，網長 180 cm，	力新科技顧問公司	114/10/13

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間
				網目 330 μm)，網口裝置流量計(HydroBios)以估算流經網口之水量。 3.以「軟底質海域底棲生物採樣通則」(NIEA E103.20C)用 Naturalist's rectangular dredge(網目 5*5mm, 網口寬 45.7cm, 網口高 20.3cm)進行拖網採樣，作業時間為五分鐘。 4.以「海洋浮游動物檢測方法」(NIEA E701.20C)，使用之網具為北太平洋標準網(NorPac net，網口直徑 45 cm，網長 180 cm，網目 330 μm)，網口裝置流量計(HydroBios)以估算流經網口之水量。 5.以「水中溶氧濃度之測定」配合水質調查於設定的 15 個測站同時進行表、中、底層的採樣。		
河口生態	1.浮游植物 2.浮游動物 3.底棲生物 4.魚類 5.基礎生產力	大堀溪口、觀音溪口、小飯壢溪口、新屋溪口及社子溪口，共 5 個測點。	每季一次	1.「水中浮游植物採樣方法-採水法」(NIEA E505.50C)以採水器進行表層水的採樣。 2.以「海洋浮游動物檢測方法」(NIEA E701.20C)，於設定的測站分別取 5 次表層水，每次 20 公升的方式進行採樣，並以 100 μm 網布過濾。 3.以「軟底質海域底棲生物採樣通則」(NIEA E103.20C)用 60	力新科技顧問公司、國立臺灣海洋大學	114/10/14~15 魚類：114/10/15~16

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間
				cm×60 cm 之鐵框隨機拋於採樣區域，挖掘框內 15 公分厚泥沙並篩出其中之生物。此外，再以放置籠具及手拋網方式採樣。 4.以放置籠具及手拋網方式採樣。 5.以「水中溶氧濃度之測定」配合水質調查於設定的 5 個測站同時進行採樣。		
漁業經濟	漁業產值、海域養殖現況、漁民作業型態結構、漁船類別、漁船數、漁場分佈、漁苗產量、經濟魚種之補獲量及價值	計畫區附近半徑 15 公里範圍內	每季一次	1.文獻資料彙整。 2.問卷調查。 3.現場生物採樣。	國立臺灣海洋大學	114/09/22、 114//10/14*、 114/11/20、 註:*為實際出海採樣紀錄，其餘皆為委託漁民採樣
礁體懸浮固體監測	每日漂沙監測	G2 及保護區兩處測站	每日	光學濁度儀	國立中央大學	每日
	海域空間濁度變化監測	在觀塘工業區附近淺水海域	每年兩次	採用 ADCP 漂沙濃度聲學儀器進行聲波探測，確認各層水深之懸浮泥沙濃度與流速。	國立中央大學	114/11/30
辦理海域地形水深測量	海域地形水深測量	北起大堀溪出海北岸，南至永安漁港以南 2 公里，東起海岸線 EL.+2m 處，西至水深-35m 處。	每年兩次(在颱風季前後)	1.平面及高程控制測量：透過已知控制點及測區設置新控制點引測，確認平面及高程之檢測精度符合測量規範。 2.陸域地形測量：採全測站經緯儀或地面光達掃描或 GPS RTK 即時動態衛星定位方式測繪。 3.海域地形測量:以單音束測深儀量測水深，並透過平面定位、水	國立中央大學	114/10/04~114/10/16

監測類別	監測項目	監測地點	監測頻率	監測方法	執行監測單位	執行監測時間
				深量測及潮位修正，建立數值地形模型 (DTM)。		
	觀音溪河口河道斷面監測作業	觀音溪之河口及河道	每年兩次(在颱風季前後)	觀音溪河口地形測量採用RTK及全測站式電子經緯儀進行規劃測線上地形測量工作。	國立中央大學	114/12/01
辦理海域地形地貌調查	高解析度地形地貌攝影	觀塘工業港附近海域之潮間帶	冬春季每月一次(若天候條件不許可則留存紀錄備查)、夏秋季每季一次	使用 RTK 無人機空拍觀音區大堀溪口至桃園市新屋區後湖溪口，約12 公里之潮間帶海岸。並使用影像拼接軟體，繪製輸出高解析度正射影像。	國立中央大學	114/10/06、114/12/08

表1.4-1 海域水質和底泥、河口水質和底泥監測地點

項　別	測站	深度	監　測　座　標
海域水質、底泥及海域生態	大堀溪	水深 10 m(1A)	1A:25° 3.765N, 121° 5.111'E 1B:25° 3.876'N, 121° 4.585'E 1C 25° 4.670'N, 121° 4.322' E
		水深 15 m(1B)	
		水深 30 m(1C)	
	觀音溪	水深 10 m(2A)	2A:25° 3.196'N, 121° 4.192'E 2B:25° 3.268'N, 121° 3.760'E 2C:25° 4.150'N, 121° 3.008' E
		水深 15 m(2B)	
		水深 30 m(2C)	
	小飯壢溪	水深 10 m(3A)	3A:25° 2.435'N, 121° 2.559' E 3B:25° 2.578' N, 121° 2.322' E 3C:25° 3.070' N, 121° 1.903' E
		水深 15 m(3B)	
		水深 30 m(3C)	
	新屋溪	水深 10 m(4A)	4A:25° 0.942' N,121° 1.141'E 4B:25° 1.139' N, 121° 0.894' E 4C:25° 1.829'N ,121° 0.202' E
		水深 15 m(4B)	
		水深 30 m(4C)	
	社子口溪	水深 10 m(5A)	5A:24° 58.657' N, 120° 59.875' E 5B:24° 58.907' N, 120° 59.461' E 5C:24° 59.513' N, 120° 58.593' E
		水深 15 m(5B)	
		水深 30 m(5C)	
河口水質、底泥及河口生態	大堀溪、觀音溪、小飯壢溪、新屋溪及社子溪河口等 5 測站		大堀溪口:25° 3.416'N, 121° 5.970'E 觀音溪口:25° 2.682' N,121° 4.513' E 小飯壢溪口:25° 1.403' N,121° 2.464' E 新屋溪口:25° 0.781' N,1121° 1.892' E 社子溪口:24° 59.152' N,121° 1.109' E



圖 1.4-1 各環境監測項目之監測點位示意圖

1.5 品保／品管作業措施概要

1.5.1 現場採樣之品保／品管

一、空氣品質

(一) 確認監測點。流量校正、測漏。

(二) 各項偵測器校正。

(三) 現場各工作紀錄(校正)表填寫。

(四) 現場特殊狀況記錄。

二、環境噪音振動及營建噪音振動(含低頻噪音)

(一) 依法規選擇適當測定位置及高度(低頻噪音須於室內量測)。

(二) 使用聲音校正器校正，偏差須小於 ± 0.7 dB(A)。

(三) 設定開始及結束的時間或以手動開始或結束。

(四) 測定終了後，再使用聲音校正器校正，偏差須小於 ± 0.7 dB(A)。

(五) 將記錄器內磁片，妥善保存攜回實驗室。

(六) 輸送過程終了時，磁片交接給樣品管理員檢查並登錄。

三、交通流量

車型、流量交通流量調查中，工作小組將依計畫工作進度及所指定地點，派遣具實務經驗的人員執行。調查人員採兩人為一組配合手錶、計數器或攝影器材進行調查，連續 48 小時進行調查(含假日、平日)，車型分為機車、小車(含小客車、小貨車)、大車(含大客車、大貨車)、特種車(貨櫃車、消防車、救護車等)等四種車輛進行調查。

四、海域、河口水質

(一) 海域水質和底泥

計畫路線海域設 15 處測站，其經緯度座標依據實際計畫內容進行確認。以下茲就執行前中後應注意事項及步驟說明如下：

1. 採樣準備事項

由採樣負責人參照各分析項目採樣及保存方法及水質採樣行前檢查表準備相關器材，並依以下步驟做必要之清點及確認，以確保採樣工作之順利進行：

(1)樣品容器清洗步驟：

A.以自來水沖洗。

B.以 10 %硝酸浸泡隔夜。

C.以 RO 水充分洗淨去酸。

D.以去離子水淋洗至少三次以上，特殊要求之容器淋洗至少十次。

E.放入器皿乾燥器烘乾。(T=40 ℃)

(2)確實清點樣品容器(種類及數量)，由本實驗室提供採樣瓶交給採樣員。

(3)依採樣作業－器材與設備清點查核表，檢查採樣器材及現場測定用儀器是否備齊。

(4)備妥欲檢測項目所規定添加之保存試劑。

(5)備妥樣品冷藏箱及冰塊。

(6)備妥採樣作業－出海作業記錄表及海域水質採樣及量測結果記錄表。

2. 採樣之品質管制措施

為確保樣品之代表、完整性及數據品質，採樣人員應確實遵守以下原則：

(1)按採樣標準作業程序進行採樣、測試、記錄數據等工作。

(2)確實執行現場測試儀器之校正維護工作。

(3)遵循各項目檢測方法之規定，對各樣品作正確之保存或前處理工作，並於樣品標籤上註明確認。

(4)確實清點樣品，並於採樣、接收記錄表上註記。

3. 採樣點之選擇及採樣方法

為確保監測計畫執行順遂，茲就計畫中採樣點之選擇及採樣方法分述如下：

本計畫依契約內容規定，採樣點為已知經緯度之特定採樣點位，本計畫採樣執行前、中、後均依下列要點辦理：

A.以衛星定位儀(GPS 系統)確認採樣點座標位置並記錄之。

B.到達採樣點位確認點位深度表層(水面下 1 m 處)、中層(該採樣點深度中間水位)和底層，(底層上 1 m 處)並記錄之。

C.以捲揚機控制深水泵取水深度，待達到欲取樣深度，確保所取水樣具該深度之代表性。

D.分裝海水樣品至指定容器中，並添加所需之保存試劑。

E.現場測定項目(如透明度、水溫、鹽度、酸鹼值(pH)、溶氧(DO)等)施測，並記錄之。

F.參考底泥採樣方法 (NIEA S104.31B)，依現場採樣深度選取底泥採樣器採集 0～15 公分厚之表層海域底泥樣品，置於不鏽鋼或鐵氟龍盤中，測定氧化還原電位並紀錄之。

G.採樣完成後，因應不同樣品保存容器和保存期限要求，於保存期限內送達實驗室，並進行樣品前處理及分析。

(二) 河川(河口)水質和底泥

採樣地點為大堀溪、觀音溪、小飯壢溪、新屋溪及社子溪河川河口，其經緯度座標依據實際計畫內容進行確認。本計畫河口水質和底泥監測流程，以下茲就執行前中後應注意事項及步驟說明如下：

1. 採樣準備事項

由採樣負責人參照各分析項目採樣及保存方法及水質採樣行前檢查表準備相關器材，並依以下步驟做必要之清點及確認，以確保採樣工作之順利進行：

(1)樣品容器清洗步驟：

A.以自來水沖洗。

B.以 10％ 硝酸浸泡隔夜。

C.以 RO 水充分洗淨去酸。

D.以去離子水淋洗至少三次以上，特殊要求之容器淋洗至少十次。

E.放入器皿乾燥器烘乾。(T=40 ℃)

(2)確實清點樣品容器(種類及數量)，由本實驗室提供採樣瓶交給採樣員。

(3)依採樣作業－器材與設備清點查核表，檢查採樣器材及現場測定用儀器是否備齊。

(4)備妥欲檢測項目所規定添加之保存試劑。

(5)備妥樣品冷藏箱及冰塊。

(6)備妥採樣作業－水質採樣及量測結果記錄表。

2. 採樣之品質管制措施

為確保樣品之代表、完整性及數據品質，採樣人員應確實遵守以下原則：

(1)按採樣標準作業程序進行採樣、測試、記錄數據等工作。

(2)確實執行現場測試儀器之校正維護工作。

(3)遵循各項目檢測方法之規定，對各樣品作正確之保存或前處理工作，並於樣品標籤上註明確認。

(4)確實清點樣品，並於採樣、接收記錄表上註記。

3. 採樣點之選擇及採樣方法

為確保監測計畫執行順遂，茲就計畫中採樣點之選擇及採樣方法分述如下：

本計畫依契約內容規定，採樣點為已知經緯度之特定採樣點位，本計畫採樣執行前、中、後均依下列要點辦理：

(1)以衛星定位儀(GPS 系統)確認採樣點座標位置並記錄之。

(2)到達採樣點位確認點位，若非為橋上測站，考量安全因素以單點進行採樣。

(3)若為橋上測站確認採樣測站後以面朝河川下游方向之左、右兩側區分為左、右岸，按比例將河川斷面區分為左岸、中央及右岸。再依照不同河川寬度、河水深度等之採樣原則，採集具代表性之水樣。

(4)河水樣品至指定容器中，並添加所需之保存試劑。

(5)現場測定項目(如水溫、氫離子濃度指數、溶氧量和導電度等)施測，並記錄之。

(6)依據底泥採樣方法 (NIEA S104.31B)，依現場採樣深度選取底泥採樣器或採樣勺採集 0～15 公分厚之表層河川底泥樣品，置於不鏽鋼或鐵氟龍盤中，測定氧化還原電位並紀錄之。

(7)採樣完成後，因應不同樣品保存容器和保存期限要求，於保存期限內送達實驗室，並進行樣品前處理及分析。

1.5.2 分析工作之品保／品管

一、空氣品質分析

(一) 空氣品質監測品管要求：

空氣品質之檢測方法主要以環境部公告方法為主，**表 1.5.2-1** 為檢驗室對於空氣品質檢測分析品管要求。

(二) 空氣品質監測品保目標：

空氣品質之氣狀物監測屬於自動連續監測，為確保分析數據品質保證，必須對於儀器 ZERO、SPAN 及多點校正等相關品保措施，訂定管制範圍分別說明如下：

1. 各氣體分析儀器之偵測極限、ZERO 與 SPAN 之管制範圍如**表 1.5.2-2 所示**。

2. 多點校正：

為確保氣體分析儀之持續準確性與精密度，亦對分析儀器作定期之多點校正(六種不同濃度之標準氣體進行測試)，以維持其分析品質。而其查核之品保目標，線性斜率(m)為 0.85～1.15；相關係數值(r)為≧0.9950。氣體分析儀(SO_2、NO_X、CO)以六種不同濃度之標準氣體進行準確性測試，每一濃度之實測值與標準值的相對誤差應低於 15 %。高速流量器(TSP、PM_{10})則以孔口流量校正器設定五種不同之流量進行準確性測試，每一流量之實測值與標準值的相對誤差應低於 10%。

表1.5.2-1　　空氣品質監測之各項品管要求

檢測項目	品　　管　　要　　求						
	流量校正	測　漏	零點校正	全幅校正	零點漂移	全幅漂移	臭氧流量
TSP	○	○	×	×	×	×	×
PM_{10}	○	○	×	×	×	×	×
$PM_{2.5}$	○	○	×	×	×	×	×
SO_2	○	○	○	○	○	○	×
NO_x	○	○	○	○	○	○	○
CO	○	○	○	○	○	○	×
O_3	○	○	○	○	○	○	○

註：表上所列「○」表示須作此項品管要求，「×」則為無須操作。

表1.5.2-2　　空氣品質監測之各氣體分析儀器ZERO與SPAN之管制範圍

項目 / 分析儀器	ZERO		SPAN
	雜訊	飄移	飄移
二氧化硫自動分析儀	＜±1 ppb	＜±4 ppb	設定值±3.0 %
氮氧化物自動分析儀	＜±5 ppb	＜±20 ppb	＜±20 ppb
一氧化碳自動分析儀	＜±0.2 ppm	＜±0.5 ppm	設定值±2.0 %
臭氧自動分析儀	＜±5 ppb	＜±20 ppb	＜±20 ppb

3. 準確性：

(1)粒狀污染物：粒狀污染物準確性之要求以同批次工作前、後進行隨機流量計校正，與工作月查核採樣條件是否良好，其目的在於判定採樣過程是否有異常之條件改變，以擬補救措施，期使檢測結果更臻準確。

(2)氣狀污染物：準確性(品管樣品分析回收率)：係為〔監測前全幅標準濃度之測值÷全幅標準濃度〕×100 %，而品保目標為 85～115 %。

4. 精密度：

每季定期測試一次，以自動監測設施滿刻度約 20 %之標準氣體，進行測試、記錄標準氣體之濃度及監測設施量測值，精密度之相對誤差不得大於 10 %。

5. 完整性：

(1) 粒狀污染物：

高速流量器之「有效採樣時數(小時)」不得少於「測定時數(24 小時)的三分之二(即 16 小時)」，其說明如下；有效採樣時間(小時)：〔(24 小時－無效採樣時間)÷24 小時〕×100 %　≧　66.7 %

(即為至少 16 小時為有效採樣時間) 。

(2) 氣狀污染物：

空氣品質之氣狀污染物監測作業係以自動監測儀器進行監測，由於現場監測時因供電系統不良或其他因素造成檢測數據異常(此一異常數據由稽核方式處理後予以捨棄)，其可信數據於一小時內測足 45 分鐘時，即為可使用之小時數據，每日 24 個小時數據須超過三分之二為可使用之小時數據(即為 16 個小時)，則該日數據即為可使用之數據，其說明如下：

A.有效小時之數據：

〔(60 分鐘－校正時間－停機時間－稽核捨棄時間)÷ 60 分鐘〕

×100 % ≧75 % (即為至少 45 分鐘為有效數據)。

B.有效日之數據：

〔(24 小時－不完整之小時數) ÷ 24 小時〕

× 100 % ≧ 66.7 % (即為至少 16 小時為有效數據)。

6. 代表性：

依照環境部公佈之「特殊性工業區緩衝地帶及空氣品質監測設施設置標準」中的「空氣品質監測採樣口設施設置原則」規定辦理。

7. 比較性：

所有資料與報告必須使用共同單位，以便與其他部門有相同的報告格式，而且可在一致的基準下作比較。依據環境部公佈之「空氣品質標準」中，有關氣狀污染物濃度使用單位為 ppm，而粒狀污染物使用濃度單位為 μg/m^3。本計畫空氣品質監測方法主要採用環境部國家環境研究院(NIEA)公告之標準方法，並依照環境部公告「環境保護事業機構管理辦法」規定之品質管制/品質保證步驟進行監測工作。

有關空氣品質監測之分析數據品保目標說明如**表 1.5.2-3** 所示。

表1.5.2-3　　空氣品質分析之品保目標說明

指標值 / 項目	精密度 (相對差異百分比)(%)	準確性分析		完整性 (≧%)
		品管樣品(%)	野外空白	
TSP	—	—	＜2MDL	85
PM_{10}	—	—	—	75
$PM_{2.5}$	—	—	<30 μg	75
SO_2	0~10	85~115	—	75
NO_x	0~10	85~115	—	75
CO	0~10	85~115	—	75
O_3	0~10	85~115	—	75

二、噪音、振動分析

噪音、振動由儀器現場加以分析，分析時除架設高度、位置須符合設站原則距地面高 1.2～1.5 m，儀器檢測前、後須進行電子式內部校正及聲音校正器做外部校正，同時分析數值噪音必須逐時記錄其 L_5、L_{10}、L_{50}、L_{90}、L_{95} 等相關分析數值，振動必須逐時記錄其 L_{v5}、L_{v10}、L_{v50}、L_{v90}、L_{v95}，營建工程噪音(全頻及低頻)則以二分鐘採樣時間，求出二分鐘最大值 L_{max} 及 L_{eq} 平均值並於檢測報告中註明營建機具、噪音計編號、類別及起迄時間，並須填寫『噪音振動現場紀錄表』。

三、交通流量

(一) 工作人員確實記錄車輛型式及數量。

(二) 現場紀錄確實填寫及畫下簡圖。

四、海域、河口水質

(一) 水質分析品管要求

水質分析品管頻率及管制範圍說明如下：

1. 檢量線製作：每批次樣品應重新製作檢量線。
2. 空白樣品分析：當每批次分析之樣品數量少於 10 個樣品時，於每批次執行一個空白樣品分析。當樣品數量超過 10 個時，每 10 個樣品須執行一個空白樣品分析。
3. 重複樣品分析：當每批次分析之樣品數量少於 10 個樣品時，於每批次執行一個重複樣品分析(或重複添加樣品分析)。當樣品數量超過 10 個時，每 10 個樣品須執行一個重複樣品分析(或重複添加樣品分析)，並求其差異百分比。
4. 查核樣品分析：當每批次分析之樣品數量少於 10 個樣品時，於每批次執行一個查核樣品分析。當樣品數量超過 10 個時，每 10 個樣品須執行一個查核樣品分析，並求其回收率。
5. 添加樣品分析：當每批次分析之樣品數量少於 10 個樣品時，於每批次執行一個添加樣品分析。當樣品數量超過 10 個時，每 10 個樣品須執行一個添加樣品分析，並求其回收率。

(二) 水質分析品保目標

水質之各項分析均訂定品保目標，其說明如**表 1.5.2-4～5** 所示。

1.5.3 儀器維修校正項目及頻率

一、儀器使用、保管及維護

儀器設備是目前分析實驗中不可缺少的工具，分析結果的精確性往往與儀器設備是否妥善維護、校正及保養有關，因此每一種儀器設備均設有儀器負責人及儀器保管人，儀器保管人職責為日常儀器之保管及清潔，儀器負責人則負責與廠商間之聯繫，並須請廠商作定期維修、保養及校正。

二、校正程序

主要儀器及設備之校正頻率，如**表 1.5.3-1～3** 所列。

表1.5.2-4　　水質分析之品保目標說明(1/2)

序號	檢驗項目	檢驗方法	單位	方法偵測極限(MDL)	重複樣品分析差異百分比(%)	查核樣品分析回收率(%)	添加樣品分析回收率(%)	完整性(≧%)
1	氫離子濃度指數(pH 值)	NIEA W424	—	—	± 0.1 pH	—	—	95
2	水溫	NIEA W217	℃	—	—	—	—	95
3	導電度	NIEA W203	μmho/cm	—	±3%	—	—	95
4	溶氧－電極法	NIEA W455	—	—	± 0.3 mg/L	—	—	95
5	砷	NIEA W434	mg/L	0.0002	0~20	80~120	80~120	95
6	汞	NIEA W330	mg/L	0.0002	0~20	80~120	75~125	95
7	海水中鉛	NIEA W311	mg/L	0.0001	0~20	80~120	80~120	95
8	海水中銅	NIEA W311	mg/L	0.00005	0~20	80~120	80~120	95
9	海水中鋅	NIEA W311	mg/L	0.0002	0~20	80~120	80~120	95
10	海水中鎘	NIEA W311	mg/L	0.00005	0~20	80~120	80~120	95
11	總鉻	NIEA W311	mg/L	0.003	0~20	80~120	80~120	95
12	鎳	NIEA W311	mg/L	0.002	0~20	80~120	80~120	95
13	鐵	NIEA W311	mg/L	0.016	0~20	80~120	80~120	95
14	六價鉻	NIEA W320	mg/L	0.003	0~20	80~120	80~120	95
15	油脂	NIEA W506	mg/L	—	—	—	—	95
16	懸浮固體	NIEA W210	mg/L	—	註1	—	—	95
17	生化需氧量	NIEA W510	mg/L	2	0 ~20	85~ 115	—	95
18	高鹵化學需氧量	NIEA W516	mg/L	5.2	0~15	85~115	—	95
19	化學需氧量	NIEA W517	mg/L	3.4	0~20	85~115	—	95
20	氰化物	NIEA W441	mg/L	0.003	0~10	85~115	85~115	95
21	大腸桿菌群	NIEA E202	CFU/100mL	—	0 ~ 0.4	—	—	95
22	酚類	NIEA W524	mg/L	0.0019	0~15	85~ 115	85~ 115	95
23	酚類	NIEA W521	mg/L	0.0008	0~20	80~120	80~120	95
24	陰離子界面活性劑	NIEA W525	mg/L	0.03	0~20	85~ 115	75~125	95
25	氨氮	NIEA W437	mg/L	0.02	0~15	85~ 115	85~ 115	95
26	總磷	NIEA W442	mg/L	0.007	0~10	85~ 115	85~ 115	95
27	正磷酸鹽	NIEA W443	mg/L	0.006	0~10	85~ 115	85~ 115	95
28	硝酸鹽氮	NIEA W436	mg/L	0.01	0~10	85~ 115	85~ 115	95
29	鉛	NIEA W313	mg/L	0.00009	0~20	80~120	80~120	95
30	銅	NIEA W311	mg/L	0.003	0~20	80~120	80~120	95
31	鋅	NIEA W311	mg/L	0.008	0~20	80~120	80~120	95
32	鎘	NIEA W311	mg/L	0.001	0~20	80~120	80~120	95
33	透明度	NIEA E220	cm	—	—	—	—	95
34	葉綠素 a	NIEA E508	μg/L	0.1	—	—	—	95
35	矽酸鹽	NIEA W450	mg/L		0~20	85~115	80~120	95

表1.5.2-4　　水質分析之品保目標說明(2/2)

序號	檢驗項目	檢驗方法	單位	方法偵測極限(MDL)	重複樣品分析差異百分比(%)	查核樣品分析回收率(%)	添加樣品分析回收率(%)	完整性(≧%)
1	安特靈	NIEA W605	mg/L	0.000002	0~20	70~120	60~130	95
2	靈丹	NIEA W605	mg/L	0.000002	0~20	70~120	60~130	95
3	阿特靈	NIEA W605	mg/L	0.000002	0~20	70~120	60~130	95
4	地特靈	NIEA W605	mg/L	0.000002	0~20	70~120	60~130	95
5	α- 安殺番	NIEA W605	mg/L	0.000002	0~20	70~120	60~130	95
6	β- 安殺番	NIEA W605	mg/L	0.000002	0~20	70~120	60~130	95
7	滴滴涕及其衍生物--4,4'-滴滴涕	NIEA W605	mg/L	0.000002	0~20	70~120	60~130	95
8	滴滴涕及其衍生物--4,4'-滴滴滴	NIEA W605	mg/L	0.000002	0~20	70~120	60~130	95
9	滴滴涕及其衍生物--4,4'-滴滴依	NIEA W605	mg/L	0.000002	0~20	70~120	60~130	95
10	飛佈達及其衍生物-飛佈達	NIEA W605	mg/L	0.000002	0~20	70~120	60~130	95
11	飛佈達及其衍生物-環氧飛佈達	NIEA W605	mg/L	0.000002	0~20	70~120	60~130	95
12	總有機磷劑--一品松	NIEA W610	mg/L	0.000553	0~20	70~120	60~130	95
13	總有機磷劑--巴拉松	NIEA W610	mg/L	0.000613	0~20	70~120	60~130	95
14	總有機磷劑--亞素靈	NIEA W610	mg/L	0.000721	0~20	70~120	60~130	95
15	總有機磷劑--大利松	NIEA W610	mg/L	0.000453	0~20	70~120	60~130	95
16	總有機磷劑--達馬松	NIEA W610	mg/L	0.000374	0~20	70~120	60~130	95
17	總有機磷劑--陶斯松	NIEA W610	mg/L	0.000614	0~20	70~120	60~130	95
18	除草劑--巴拉刈	NIEA W646	mg/L	0.00024	0~30	70~130	60~140	95
19	毒殺芬	NIEA W653	mg/L	0.000060	0~20	75~125	60~140	95
20	除草劑--2,4-地	NIEA W642	mg/L	0.000012	0~20	75~125	75~125	95
21	除草劑--丁基拉草	NIEA W645	mg/L	0.000062	0~20	75~125	75~125	95
22	除草劑--拉草	NIEA W645	mg/L	0.000046	0~20	75~125	75~125	95
23	總氨基甲酸鹽--加保扶	NIEA W603	mg/L	0.00011	0~30	70~130	60~140	95
24	總氨基甲酸鹽--加保扶代謝物	NIEA W603	mg/L	0.00009	0~30	70~130	60~140	95
25	總氨基甲酸鹽--加保扶總量	NIEA W603	mg/L	0.0001	0~30	70~130	60~140	95
26	總氨基甲酸鹽--納乃得	NIEA W603	mg/L	0.0001	0~30	50~150	50~160	95
27	總氨基甲酸鹽--滅必蝨	NIEA W603	mg/L	0.0001	0~30	50~150	50~160	95

表1.5.2-5　　底泥檢測數據品保目標

序號	檢驗項目	檢驗方法	單位	方法偵測極限(MDL)	重複樣品分析差異百分比(%)	查核樣品分析回收率(%)	添加樣品分析回收率(%)	完整性(≧%)
1	汞	NIEA M317	mg/kg	0.040	0~20	80~120	75~125	95
2	砷	NIEA S310	mg/kg	0.343	0~20	70~130	75~125	95
3	鎳	NIEA M104	mg/kg	0.86	0~20	80~120	75~125	95
4	鉛	NIEA M104	mg/kg	0.86	0~20	80~120	75~125	95
5	鋅	NIEA M104	mg/kg	4.69	0~20	80~120	75~125	95
6	鎘	NIEA M104	mg/kg	0.1	0~20	80~120	75~125	95
7	鉻	NIEA M104	mg/kg	2.21	0~20	80~120	75~125	95
8	銅	NIEA M104	mg/kg	0.77	0~20	80~120	75~125	95

表1.5.3-1　　空氣品質儀器校正頻率(1/3)

儀器名稱	廠牌 型號	測試項目	頻率	一般程度或注意事項	記錄情形	容許誤差
懸浮微粒採樣器($PM_{2.5}$)	BGI PQ200	功能檢查： (1)時間校對 (2)大氣壓力 (3)環境溫度 (4)濾紙溫度	使用前後	(1)採樣前檢查採樣器顯示時間 (2)工作大氣壓力計置於採樣器同高處處比對 (3)工作溫度計置於採樣器環境溫度計旁比對 (4)工作溫度計置於採樣器濾紙匣位置中心下游 1 公分處比對	內校紀錄	(1)±1 分鐘 (2)±10 mmHg (3)±2 ℃ (4)±1 ℃
		校正：流量	採樣器經運送過程後	利用活塞式紅外線流量校正器 以採樣器操作流量 16.7 L/min ± 10 %的流量範圍內， 選擇 3 個點流量校正點進行流量校正(多點校正)	內校紀錄	多點校正後，需執行流量查核
			每工作日			
			單點流量查核結果差值超過 -0.668~ 0.668 (L/min)範圍			
			調整採樣器流量量測系統			
			採樣器經機電維護			
		查核：流量	執行多點流量校正後	利用活塞式紅外線流量校正器 以採樣器操作流量 16.7 L/min，執行流量查核(單點檢查)	內校紀錄	採樣器面板讀值與標準流量計讀值的差值須介於-0.668~0.668 (L/min)之間
			每次採樣結束後			
		比對：計時器	每年	與國家標準時間進行比對	內校紀錄	一個月誤差不超過 1 分鐘
		維護：保養	採樣前	檢查篩分器	使用紀錄	—
			每執行五個樣品的採樣後	清理篩分器		
			每 2 週	清潔進氣口		
			六個月	清理遮雨罩下空氣擋板		
				清潔進氣口空氣濾網		

註：每次監測前以皂泡流量計進行校正。

表1.5.3-1　　空氣品質儀器校正頻率(2/3)

儀器名稱	廠牌 型號	測試項目	頻率	一般程度或注意事項	記錄情形	容許誤差
動態氣體稀釋器(空氣品質監測車)	Tanabyte Multi-gas/ SA2-322-G-732	校正：流量	每年	與可追溯至國家標準實驗室之參考標準件進行比對	內校記錄	$R^2 > 0.995$ 點流量偏差±2%
		校正：流量(NIEA A740 使用)	六個月	與可追溯至國家標準實驗室之參考標準件進行比對	內校紀錄	$R^2 > 0.995$ 點流量偏差±2%
		臭氧產生器光度計比對：準確度	每年	與可追溯至國家標準實驗室之參考標準件進行比對	內校記錄	線性誤差≦3%
零值空氣產生器(NIEA A421 使用)	MCZ Zero Gas System/Model : NGA 19S	比對：準確度	每年	以 CO 自動分析儀確認 CO 濃度	內校記錄	< 0.1 ppm
零值空氣產生器(NIEA A740 使用)	MCZ Zero Gas System/Model : NGA 19S	比對：準確度	六個月	以 THC 自動分析儀確認 THC 濃度	內校記錄	< 0.1 ppm (以甲烷濃度計)
PM_{10} 自動分析儀(β-ray)	Metone BAM1020	檢查：流量	每工作日	記錄採樣流樣	記錄	± 10 %
		檢查：射源強度		記錄 β-ray 射源強度	記錄	原廠規範
		校正：流量	每三個月	以標準流量計進行流量校正	內校記錄	± 10 %
		檢查：射源強度		以原廠參考薄膜進行檢查 β-ray 射源強度確認	內校記錄	原廠規範
		校正：流量	儀器新設置、故障修復後	以標準流量計進行流量校正	內校記錄	± 10%
		檢查：射源強度		以原廠參考薄膜進行檢查 β-ray 射源強度確認	內校記錄	原廠規範
		比對：準確度	對測站/測值有疑義時	以 PM_{10} 高量採樣法作數據數值比對測試	內校記錄	線性回歸： 斜率＝1 ± 0.1； 截距 0 ± 5 μg/m³；R^2≧ 0.97

註：每次監測前以皂泡流量計進行校正。

表1.5.3-1　　空氣品質儀器校正頻率(3/3)

儀器名稱	廠牌型號	測試項目	頻率	一般程度或注意事項	記錄情形	容許誤差
NO_x、SO_2、CO、O_3、THC 自動分析儀(空氣品質監測車)	HORABA 360 HORABA 370	檢查：準確度	使用前後	零點、全幅(以測定範圍最大濃度之80%測定範圍)及中濃度(全幅 50%濃度)檢查 中濃度檢查： 使用前(僅 THC 需執行) 使用後(NO_x、SO_2、CO、O_3、THC 需執行)	內校記錄	NO、O_3 零點± 20 ppb 全幅± 20 ppb 中濃度± 20 ppb SO_2 零點±4 ppb 全幅±3% 中濃度±3% CO 零點± 0.5 ppm 全幅± 0.8 ppm 中濃度± 0.8 ppm THC 零點± 0.4 ppm 全幅± 0.8 ppm 中濃度± 0.8 ppm NOx、SO_2、CO、O_3、THC 修正值應在儀器規範範圍內
		校正：準確度	新裝設的儀器 儀器主要設備經維護後 使用前後準確度不符合規範 每六個月	以 全幅濃度之 0%、20%、40%、60%、80%、100%等六種不同濃度之校正氣體進行多點校正	內校記錄	$R^2 > 0.995$
		清潔保養	每兩週	保持內部及散熱風扇濾網清潔，並注意各接頭是否鬆脫	—	—
		維護:濾紙更換			—	—
NO_x 自動分析儀	HORABA 360 HORABA 370	檢查：NO_2 轉化率	每年	進行 NO_2 轉化率測試	內校記錄	轉化率>96%
THC 自動分析儀	HORABA 360 HORABA 370	檢查：NMHC 去除率	六個月	以丙烷標準氣體進行 NMHC 去除率測試	內校記錄	NMHC 全幅 ± 1.2 ppm
		檢查：反應時間	六個月	通入氣體後，儀器讀值到達最高穩定之90%處所需時間	內校記錄	小於 2 min

註：每次監測前以皂泡流量計進行校正。

表1.5.3-2　　噪音振動儀器校正頻率

儀器名稱	廠牌型號	校正方法	校正頻率
噪音計	RION NL31/NL32/NL52/NA28	每次使用前由使用者校正 每二年送合格校正機構執行校正 (可追溯到國家標準)	1.每次使用前後校正 2.每二年送外校(低頻每年 1 次)
振動	RION-VM53/VM55	每次使用前由使用者校正 每二年送合格校正機構執行校正 (可追溯到國家標準)	1.每次使用前後校正 2.每二年送外校
聲音 校正器	RION-NC74 AWA -AWA6222A	每年送合格校正機構執行校正 (可追溯到國家標準)	1.每次使用前後校正 2.每年送外校
振動 校正器	RION-VM33/VP303	每年送合格校正機構執行校正 (可追溯到國家標準)	1.每次使用前後校正 2.每年送外校
風速、風向 自動測定儀	APRS	每二年送合格校正機構執行校正 (中央氣象署儀器檢校中心)	每二年

表1.5.3-3　　水質分析儀器設備校正頻率(1/2)

儀器 設備名稱	廠牌型號	校正或 維護別	週期	校正或維護 項目	標準或參 考物件	校正維護步驟 與相關規定
參考砝碼	—	外部校正	六年	質量	—	—
工作砝碼	—	內部校正	三年	質量	參考砝碼	—
參考溫度計	PRECISION	1.外部校正	十年	完整的校正	—	—
		2.內部校正	六個月	冰點	—	冰點檢查
工作溫度計	Mettler SG2	內部校正	六個月	多點溫度 校正	參考溫度計	用參考溫度計做溫度檢查(包含冰點及選擇足夠的檢查點以涵蓋使用範圍)
				1.冰點	參考溫度計	使用參考溫度計做冰點
				2.單點溫度	參考溫度計	或使用範圍內之單點檢查
工作熱電偶	HOLA TM-905	內部校正	一年	多點溫度檢查	參考溫度計	使用參考溫度計做多點溫度檢查
冰　箱	HIPOINT	檢查維護	每日	溫度	專用溫度計	使用專用且經校正之溫度計，監視使用空間的溫度並記錄之
乾燥烘箱	HIPOINT _OV-100	檢查維護	每月	溫度	熱電偶	以適當的檢測器(Sensor)監視溫度並記錄
電子天平	Mettler _TLE204E	1.外部校正	三年	重複性與線性量測	—	—
		2.內部校正	每次稱重前	零點檢查	—	—
pH 計	Mettler SG2	內部校正	使用前	pH 值(線性)	標準緩衝溶液	以涵蓋待測樣品 pH 值之兩種標準緩衝溶液進行校正
導電度計	Mettler SG3	內部校正	使用前	單點檢查	—	—

表1.5.3-3　　水質分析儀器設備校正頻率(2/2)

儀器設備名稱	廠牌型號	校正或維護別	週期	校正或維護項目	標準或參考物件	校正維護步驟與相關規定
培養箱	Frost Free_U20F	檢查維護	使用期間	溫度	高低溫溫度計	使用專用且經校正之溫度計，監視培養箱內部的溫度並記錄之，溫度須維持在±1℃或在方法中可允許之範圍
分光光度計	Agilent _8453	外部校正	1.使用前	檢量線製備	參考標準品	—
			2.每年	波長準確度、吸光度、線性(Linearity)、迷光(Stray light)、樣品吸光槽配對(Matching of cells)之校正	重鉻酸鉀與標準濾光片	—
原子吸收光譜儀	PerkinElmer _AA700 PerkinElmer _AA200 PerkinElmer _AA500	內部校正	1.使用前	1.檢量線製備	參考標準品	—
				2.靈敏度	—	以參考標準品監測儀器性能，對較常用之燈管(含HCL 與 EDL)做靈敏度檢查
			2.半年	1.靈敏度	—	靈敏度檢查
感應耦合電漿原子發射光譜儀	PerkinElmer _Optima 2000DV PerkinElmer _Optima 8000	外部校正	當日	1.檢量線製備 2.波長校正 3.電漿狀況最佳化	參考標準品	依各該廠牌建議之 Tuning solution 調校
過濾設備(微生物濾膜法)	ROCKER MultiVac 601-MB	內部校正	初次使用前及每一年	標示體積	經校正之量筒	校正過濾漏斗之容量刻度，誤差不得超過 2.5%
無菌操作檯	HIPOINT	檢查維護	每月	落菌量測試	—	以營養瓊脂培養基於無菌操作檯內暴露 30 分鐘，然後置於 35℃培養箱培養 24 小時，如菌落數在 5 個以上須更換 HEPA 濾網

1.5.4 分析項目之檢測方法

本計畫將執行空氣品質、噪音、振動、交通流量、水質、底泥的取樣及檢測分析，因此，正確的分析數據乃是環境檢驗工作的重要目標。空氣品質監測一般是藉由自動儀器直接分析樣品，所以操作人員必須經過嚴謹的訓練，才能在現場正確有效的操作儀器，使儀器性能處於最佳狀態，方能獲得可信賴的數據，所有分析方法均須符合環境部公告之規定。水質分析也是依環境部公告相關的標準檢測分析方法進行樣品處理及分析，尚無公告方法之檢測項目則參照Standard Methods for the Examinations of Water and Wastewater或CNS方法。有關本監測計畫之分析方法，如**表1.3-1**所列。

1.5.5 數據處理原則

一、數據紀錄、填寫原則

本計畫進行相關檢測分析時，檢測人員必須隨時將檢測數據正確的記錄於數據紀錄表中，包含計畫編號、計畫名稱、分析日期、檢量線製作濃度、方法編號、儀器名稱、樣品編號、樣品分取處理量、稀釋倍數、檢測數據、品管樣品結果計算、品管數量、使用人時及黏貼頁碼等。同時應將品管結果繪製於品質管制圖表中。數據填寫以原子筆或鋼筆為原則，不可使用鉛筆；記錄錯誤時，必須直接畫一橫線，同時簽名，以示刪除，不可使用修正液或橡皮擦拭去。

檢測人員完成檢測分析之後，須將數據紀錄表及品質管制圖表填寫完全，簽名後連同儀器記錄之列印數據交給數據查核員，經查核驗算後，數據紀錄表影印縮小黏貼於工作日誌上，黏貼於工作日誌上的表格須加蓋騎縫印。數據紀錄表原稿及儀器記錄之列印數據原稿，則依檢測項目分類存檔。數據紀錄表、品質管制圖表及工作日誌皆屬保密紀錄，列入責任交接，其所有權屬實驗室所有，檢測人員非經許可，不得私自攜出。

二、數據處理原則

檢測人員於配製藥品、執行分析、數據記錄、及計算結果的過程中，所得之數字皆有其意義存在，實驗室採行國際單位系統表示檢驗結果。通常對龐大數字，冠以字首，例如：10^{6}(M)、10^{3}(k)、10^{-1}(d)、10^{-2}(c)、10^{-3}(m)、10^{-6}(μ)，以簡化數字。環境分析水質樣品，常以 ppm(10^{-6}，parts per million)或 ppb(10^{-9}，parts per billion)表示；固體樣品以 ppm 表示 mg/kg、以 ppb 表示 μg/Kg；同時，習慣上若樣品濃度為 0.05 mg/L，可表示為 50 μg/L；若濃度大於 10,000 mg/L，則可表示為大於 1%。

有效位數及小數位數修整原則，依環檢所(現國家環境研究院)99.03.05 環檢一字第 0990000919 號公告內容要求辦理，即四捨六入五成雙來處理小數位數之方式。

三、數據查核規定

(一) 所有數據(含樣品濃度、品管數據及管制圖表)均由專人驗算、核對，查核無誤後，驗算人員須於數據紀錄表中簽名。

(二) 計畫執行期間的相關表格，須由實驗室主任確認查核。

(三) 工作日誌(Notebook)及試藥配製本由實驗室品保主管及實驗室主任每月審核一次，其審核之目的在於檢查該工作日誌及試藥配製本之填寫是否正確、數據是否合理以及日常例行之品管是否遵循規定。

(四) 品質管制圖表(Control Chart)由實驗室品保主管及實驗室主任每季審核一次，其審核之目的在於檢查各檢測項目之管制圖表製作情形及管制圖表反應之趨勢是否正常、數據是否合理以及日常例行之品管是否遵循規定。

(五) 實驗室主任定期查閱工作日誌以及所有檔案的回顧與查核。

1.6 海域生態調查方法

1.6.1 海域

一、浮游植物

在亞潮帶海域設定的 15 個測站(1A～5A 水深 10 m，採樣水深:表層樣本水面 0 m 之水層、中層樣本 5 m 之水層、底層樣本 9 m 之水層，1B～5B 水深 15 m，採樣水深:表層樣本水面 0 m 之水層、中層樣本 7 m 之水層、底層樣本 14 m 之水層，1C～5C 水深 30 m，採樣水深:表層樣本水面 0 m 之水層、中層樣本 15 m 之水層、底層樣本 29 m 之水層)，進行一年四季的調查工作。採樣方式係參考環境檢驗所公告之方法「水中浮游植物採樣方法-採水法」(NIEA E505.50C)配合水質調查於設定的 15 個測站同時進行表、中、底層的採樣。所採得的海水加入 50 毫升之中性福馬林固定保存，以便進一步鑑定及計數浮游植物之種類組成。浮游植物之鑑定及計數是以中性福馬林保存之浮游植物樣品，先攪拌均勻後，視量取 100 ml 至 500 ml 之水樣，放至沈澱管座上靜置 24 小時俾便充分沉澱，再以倒立光學顯微鏡(Nikon, model A300) 觀察及計數浮游植物之種類數量。並嘗試計算種歧異性指數及進行群集分析。

二、浮游動物

在亞潮帶海域設定的 15 個測站(1A～5A，1B～5B，1C～5C)，進行一年四季的調查工作。採樣方式係參考環境檢驗所公告之方法「海洋浮游動物檢測方法」(NIEA E701.20C)，配合水質進行採樣。採樣方式是在所設定的 15 個測站進行近表層之水平拖網。使用之網具為北太平洋標準網(NorPac net，網口直徑 45 cm，網長 180 cm，網目 330 μm)，網口裝置流量計(HydroBios)以估算流經網口之水量。採得之浮游動物樣品均在船上以 5～10％中性福馬林固定保存。浮游動物之鑑定

及計數是以中性福馬林保存之浮游動物樣品置於解剖顯微鏡下計數 34 主要組成大類(Major groups)的數量。生物量之測定：主要測定浮游動物之排水容積生物量(Displacement volume, ml/1,000 m^3)。

三、底棲生物

在亞潮帶海域設定的 15 個測站(1A～5A，1B～5B，1C～5C)，進行一年四季的調查工作。海域底棲生物採樣方式係參考環境檢驗所公告之方法「軟底質海域底棲生物採樣通則」(NIEA E103.20C)，配合水質調查以 Naturalist's rectangular dredge(網目 5×5 mm，網口寬 45.7 cm，網口高 20.3 cm)對設定之 15 個測站進行採樣，每站拖網作業時間為五分鐘。採樣面積為：矩形底棲生物採樣器寬 0.457(m)* 作業時間 300(s)*船速 1.5(Kn)*0.5144(m/s) = 105.79(m^2)。捕獲之全部樣品以冰藏法攜回實驗室，進行分類鑑種及記錄工作，並分析生物相之組成與分析。

四、魚類(仔稚魚及魚卵)

在亞潮帶海域設定的 15 個測站(1A～5A，1B～5B，1C～5C)，進行一年四季的調查工作。仔稚魚及魚卵採樣方式係參考環境檢驗所公告之方法「海洋浮游動物檢測方法」(NIEA E701.20C)，配合水質進行採樣。採樣方式是在所設定的 15 個測站進行近表層之水平拖網。使用之網具為北太平洋標準網(NorPac net，網口直徑 45 cm，網長 180 cm，網目 330 μm)，網口裝置流量計(HydroBios)以估算流經網口之水量。採得之仔稚魚及魚卵樣品均在船上以 5～10 %中性福馬林固定保存。仔稚魚之鑑定及計數是以中性福馬林保存之樣品置於解剖顯微鏡下計算數量。

五、基礎生產力

基礎生產力(primary productivity)是指從大氣中或水中的二氧化碳等無機分子合成有機化合物的一個總和量，數值越高代表合成能力就越強。主要是通過光合作用的過程，利用光作為能量來源，這是生態系統最基本的能量固定，消費者和分解者都直接或間接地依賴基礎生產力為生，因此沒有基礎生產力就不會有消費者和分解者，也不會有生態系統。負責基礎生產的生物被稱為生產者，構成食物鏈的基礎。水生生態區，主要為藻類，尤其是廣大的開放大洋區海域。

基礎生產力分為兩種：淨基礎生產力 (Net primary productivity)與總基礎生產力(Gross primary productivity)；前者含有生產過程損失，如細胞呼吸作用(Respiration)，在計算中必須減去；而後者不含有。所以，淨基礎生產量 ＝ (總基礎生產量 － 光合作用期間因呼吸作用所消耗量)。

行政院環境保護署(現環境部)之海洋生態評估技術規範 (中華民國 96 年 8 月)，附件二 生態調查、分析所列海洋生態調查除應收集與開發地點、可能影響範圍相關的生態文獻外，應有實地調查或採樣，其調查、分析項目、測站配置與測站數、調查時間與頻率、採樣點深度配置等，其中二、海洋生態調查項目需包

含(三)基礎生產力調查，列為環境影響評估及相關措施實施之根據。

背景簡述：光/暗瓶是一種測定水中溶氧濃度測量基礎生產力(初級生產力)的方法。作法是將海水樣品的瓶子在光照及暗(無光照)條件下，培養一段時間後，測定培養前及培養後之水中溶氧量之差異，進行計算單位時間單位體積之氧氣產生量，並轉換為單位時間單位體積之碳固定量，作為該海域基礎生產力 (初級生產力) 的方法。

在亞潮帶海域設定的 15 個測站(1A～5A，1B～5B，1C～5C)，進行一年四季的調查工作。基礎生產力採樣方式係以「水中溶氧濃度之測定」配合水質調查於設定的 15 個測站同時進行表、中、底層的採樣。實驗藥品及試劑配製共分三大類，分別為氯化錳溶液($MnCl_2$，3M)(Reagent A)、氫氧化鈉 (NaOH，32 %) ＋ 碘化鈉 (NaI，60 %)混合溶液(Reagent B)及硫酸溶液(H_2SO_4，5.04 N) (Reagent C)。每個採樣點採各 7 瓶水樣(1 瓶為原始水樣；3 瓶為照光瓶；3 瓶為包鋁泊紙的黑暗瓶)，後分別採標準曲線測定及藻體培養與溶氧固定後，帶回研究室後加入 Reagent C，以呈色法進行 Abs456 nm 之測定，測定後進行溶氧濃度之計算，進而量化基礎生產力。

(一) 實驗藥品及試劑配製：

1. Reagent A：氯化錳溶液 ($MnCl_2$，3M)

   →取 41.27 g 的 $MnCl_2 \cdot 4H_2O$ 加水溶解定量至 50 mL

2. Reagent B：氫氧化鈉 (NaOH，32 %)＋碘化鈉 (NaI，60 %) 混合溶液

   →取 16 g NaOH 置於配製瓶後加 15 mL 蒸餾水溶解之並蓋上蓋子後用手用力搖盪至全溶 (小心發熱反應)

   →取 30 g NaI 置於配製瓶後加 25 mL 蒸餾水溶解之並蓋上蓋子後用手用力搖盪至幾乎溶解

   →將已溶解的 NaOH 溶液倒入 NaI 溶液配置瓶中混和，加蒸餾水定量至 50 mL，蓋上蓋子後用手用力搖盪至 NaI 全溶，即為 solution B

3. Reagent C：硫酸溶液 (H_2SO_4，5.04 N)

   →取 14 mL 濃硫酸，加入 30 mL 蒸餾水定量至 50 mL

(二) 標準曲線測定：0.099 g KIO_3 加水至 100 mL 蒸餾水，濃度為 5 mM，避光以防止沉澱，若有沉澱及重新配置。

1. O_2 測定原理係以形成吸光值為 456 nm 的 I_3^- (黃棕色) 進行，

   由於水樣溶氧反應式如下：

   $MnCl_2 + 2\ NaOH \rightarrow 2\ NaCl + Mn(OH)_2$

   $Mn(OH)_2 + 1/2\ O_2 \rightarrow MnO(OH)_2$ (沉澱)

   $MnO(OH)_2 + H_2SO_4 \rightarrow 3\ H_2O + Mn(SO_4)_2$

   $Mn(SO_4)_2 + 2\ I^- \longrightarrow MnSO_4 + SO_4^{2-} + I_2$

$I_2 + I^- \rightarrow I_3^-$ (黃棕色)

所以標準曲線係以不同 IO_3^-濃度形成 I_2+，I_2再與 Reagent A、Reagent B 及 Reagent C 反應生成之 I^-+形成黃棕色 I_3^- (1/3 IO_3^-+5/3 I^-+2 $H^+ \rightarrow I_2 + H_2O$)。

I_3 標準曲線如下以 KIO_3 進行，求出 $O_2 = a\ A_{456} + b$

O_2 nmol	KIO_3 nmol	ddH_2O μL	KIO_3 μL	Reagent C mL	Reagent B mL	Reagent A mL
0.00	0.00	1200.00	0.00	10.00	10.00	10.00
8.34	50.00	1190.00	10.00	10.00	10.00	10.00
16.66	100.00	1180.00	20.00	10.00	10.00	10.00
25.00	150.00	1170.00	30.00	10.00	10.00	10.00
33.34	200.00	1160.00	40.00	10.00	10.00	10.00
66.66	400.00	1120.00	80.00	10.00	10.00	10.00

(三) 水樣培養與溶氧固定

1. 將水樣置於 15 mL 透明容器，每個採樣點水樣各 7 個容器 (1 容器為原始水樣；3 容器為照光組；3 容器為包鋁泊紙的黑暗組)，蓋上蓋子 (注意無空氣在內)。
2. 經 1 h 於當地水溫進行當時光強下培養後，立即取出水樣 1.2 mL 於事先加 Reagent A 及 Reagent B 之 1.5 mL 微離心管。

每一地點水樣測定程序如下

	水樣 (mL)	Reagent A (mL)	Reagent B (mL)	帶回研究室後加入 Reagent C	
I-1	1.2	10	10	10	水樣培養前需固定完成
BL-1	1.2	10	10	10	水樣培養後進行
BD-1	1.2	10	10	10	水樣培養後進行
SL-1	1.2	10	10	10	水樣培養後進行
SL-2	1.2	10	10	10	水樣培養後進行
SL-3	1.2	10	10	10	水樣培養後進行
SD-1	1.2	10	10	10	水樣培養後進行
SD-2	1.2	10	10	10	水樣培養後進行
SD-3	1.2	10	10	10	水樣培養後進行

ps1: 此一測定必須同時測光強度及水溫。

(四) 呈色過程

沉澱水樣 (1.22 mL)
↓
加入 10 mL Reagent C 搖晃至沉澱物消失，呈黃棕色
↓
分光光度計測定 456 nm 吸光值

(五) 單位時間固碳量基礎生產力之計算

O_2 (mmol/L/h) ＝ 1000000 × (a×A_{456}+b)/1.22 mL/1 h

C (mg/ m^3 /h) = (O_2 (mol/L/h) × 12)/1.20

註解 1：1.2 之 C 與 O_2 轉換來 PQ (O_2/C) 當量換算文獻依據 O_2 莫耳數不會相等 CO_2 莫耳數 (C 莫耳數)，根據 Ryther JH (1956) The measurement of primary production. Limnology and Oceanography 1: 72-84 及 Meyercordt J, Gerbersdorf S, Meyer-Reil LA (1999) Significance of pelagic and benthic primary production in two shallow coastal lagoons of different degrees of eutrophication in the southern Baltic Sea. Aquatic Microbogical Ecology 20: 273–284 指出. PQ (O_2/C) 介於 1.09-1.48，平均為 1.20。

註解 2：測定過程之溫度及日照強度須以 HOBO 或 LI-COR 儀器測定並隨基礎生產力附上紀錄。

六、分析方法

(一) 歧異度分析(多樣性指數計算)：

種的歧異度可以表示種的自然集合群集組成。表示種歧異度(Species Diversity)之指數分別以優勢度指數(Dominance Index, *C*)、均勻度指數(Evenness Index , *J'*)、Shannon 種歧異度指數(Shannon Diversity Index, *H'*)及種數的豐度指數 (Species Richness Index, *SR*)表示。各種指數之意義表示如下：

a. 種類的豐度指數，*SR* (Species Richness index)：

$$SR = \frac{(S-1)}{\log N}$$

S：所出現之種數

N：所有種類之個體數

SR 愈大則群集內生物種數愈多。

b. 均勻度指數，*J'* (Evenness index)：

$$J' = \frac{H'}{H_{\max}}$$

$$H_{\max} = \log S$$

S：所出現之種數

*J'*值愈大，則個體數在種間分配愈均勻。

c. Shannon 歧異度指數，*H'* (Shannon diversity index)：

$$H' = -\sum_{i=1}^{S}\left(\frac{n_i}{N}\right)\log\left(\frac{n_i}{N}\right)$$

s： 所出現之種數

ni：為第 i 種生物之個體數

N：所有種類之個體數

該指數可綜合反映一群集內生物種類之豐度程度及個體數在種間之豐度分配是否均勻。

d. 優勢度指數,C (Dominance index)：

$$C' = \sum_{i=1}^{S}\left(\frac{n_i}{N}\right)^2$$

s： 所出現之種數

ni：為第 i 種生物之個體數

N：所有種類之個體數

(二) 相似度分析：

利用 2006 年 6.1.5 版本 PRIMER 套裝軟體進行季節及測站間物種、豐度的相似度(similarity)分析及群集組成分析，更利用 Bray–Curtis Similarity 群集分析樹狀圖和 MDS 圖，探討其中的群集結構關係。

1.6.2 河口

一、浮游植物

在河口設定的 5 個測站(大堀溪口、觀音溪口、小飯壢溪口、新屋溪口及社子溪口)，進行一年四季調查。採樣方式係參考環境檢驗所公告「水中浮游植物採樣方法-採水法」(NIEA E505.50C)。河口浮游植物之實驗方式與海域浮游植物相同。

二、浮游動物

在河口設定的 5 個測站(大堀溪口、觀音溪口、小飯壢溪口、新屋溪口及社子溪口)，進行一年四季的調查工作。採樣方式係參考環境檢驗所公告「海洋浮游動物檢測方法」(NIEA E701.20C)，於設定的河口測站 1 取 1 表層水 100 公升並以 100μm 網布過濾。採得浮游動物樣品，於採樣當場以 5％中性福馬林固定保存。河口浮游動物之實驗方式與海域浮游動物相同。

三、底棲生物

在河口設定的 5 個測站(大堀溪口、觀音溪口、小飯壢溪口、新屋溪口及社子溪口)，進行一年四季的調查工作。採樣方式係參考環境檢驗所公告之「軟底質海域底棲生物採樣通則」(NIEA E103.20C)，以 50 cm×50 cm 之鐵框隨機拋於採樣區域，挖掘框內 15 公分厚泥沙並篩出其中之生物。此外，再以放置籠具及手拋網方式採樣。所採得的標本能於當場鑑定之生物於鑑定後即放回，其他的則以冰藏法攜回實驗室，進行分類鑑種及記錄工作，並分析底棲生物相之組成與分布。

四、魚類

在河口設定的 5 個測站(大堀溪口、觀音溪口、小飯壢溪口、新屋溪口及社子溪口等)，進行一年四季的調查工作。採樣方式以「手投網網捕法」與「魚籠誘捕法」為主。

(一) 網捕法(手投網)：

手投網網捕法為在湖沼或溪流岸邊的採捕方式，以徒手投擲手投網入潭中採集，以採集獲得不同水體的淡水魚類及甲殼類樣本。建議本「手投網網捕法」應選用 3 分或 5 分網目為宜，12 尺至 15 尺較為適中。至少要有效投擲 10 網次，來估算單位河段內的魚類出現總量或單位努力魚類捕獲量(individuals/10 catches)。現場缺點為使用過後，網具經常遇到障礙物或垃圾，投網之耗損機率度大，常要網具保養與重新修補網具，甚至更換新網具等。另外，也可採用放置刺網的方式，但若非不得已，盡可能少用刺網，以期能減少本土魚類採集受傷及死亡機會。

(二) 誘捕法(魚籠)：

在魚籠中，放入誘捕之餌料，以吸引中小型魚類進入籠具中作採集，以觀測更加完整的湖泊、野塘或是其他的緩流與靜水域之淡水魚類相。誘捕魚

類餌料為秋刀魚,以及黑鯛誘餌等 (粉加水揉成塊狀),一籠放置一小塊即可。

建議本「魚籠誘捕法」應至少投放達到 2 小時以上，飼料應於投放誘餌期間，都仍可以保留 1/2 以上為原則，採獲魚類群集總組成，可以單位次數之捕獲量(individuals/per catch)來呈現。本方法缺點是對太大型的魚類個體，較不易以此方法作採集。

五、基礎生產力

在河口設定的 5 個測站(大堀溪口、觀音溪口、小飯壢溪口、新屋溪口及社子溪口)，進行一年四季的調查工作。採樣方式係以「水中溶氧濃度之測定」配合水質調查於設定的 5 個測站同時進行採樣。實驗方式同海域基礎生產力。

六、檢測及分析方法

同海域生態。

1.7 漁業經濟調查方法

1.7.1 現場生物採樣

為探究觀塘工業區專用鄰近水域之漁獲種類組成及經濟魚種之捕獲量，委請桃園永安漁港之刺網漁船(網目大小2.5*2.5吋，網長約1海浬，網深10 m)至附近水域進行現場海上採集作業，並於每次採集時詳述記載作業日期及時間(起網及下網)、作業經緯度、網具下放深度等資訊。每次揚網時間為下完網後兩小時內，其作業時程以每季進行一次作業，每季採樣之間隔時程最少45天以上。採集所得之所有漁獲物先以冰藏或冰凍方式進行保存，爾後再帶回實驗室以進行物種鑑定及計數，並進行各物種之基礎生物學(包含體長體重之量測)及拍照等紀錄，藉以了解此區域的各季漁獲種類組成變動與捕獲量差異。

另亦於漁港隨機進行其他漁業之漁獲樣本蒐集，同種漁業以每年度採集一次為佳。所得樣本亦會進行物種鑑定、計數、基礎生物學及拍照等紀錄，以輔助說明漁業資源調查結果及比較不同於業別之漁獲種類、體長大小等。

1.7.2 漁業資源調查

本工業專用港所在之觀音區內並無其他漁港設施，其鄰近漁港為北邊之竹圍漁港(大園區)及南邊之永安漁港(新屋區)。由桃園區漁會及中壢區漁會之漁業資料顯示，本海域的核准漁業種類主要包含延繩釣漁業、一支釣漁業、流刺網漁業及魚苗採捕漁業，故本計畫透過問卷填寫及口頭訪問等方式來蒐集本工業區鄰近海域之上述四種漁業之

漁船作業情況及漁獲量等資料，以利掌握其漁民作業型態結構、漁船類別、漁船數、各漁業之漁場分布及經濟魚種之價值等資訊。另亦由桃園區漁會及中壢區漁會提供之漁業統計資料、漁業署公告之漁業年報等資訊來分析漁業產量、魚苗產量及經濟魚種之價值等結果。另海域養殖現況則透過口頭訪問方式進行調查。

本計畫自108年度起至今，已累積尋訪27戶(本季13戶)的漁船標本戶來進行漁業問卷填寫，各標本戶以實際出海作業時間、按日填寫調查表，並於每月固定派人前往各標本戶家中收回調查表。調查表之資訊包含漁船大小(噸數)、作業漁法別、作業經緯度、作業日期及時間、漁獲物種類、漁獲重量及價格等。調查所得之資料依作業漁法別或主要經濟漁獲種類區分，並按月或按季加以統計分析，除了計算CPUE之外，亦分析各漁法別、季節別之漁場作業位置及漁獲種類等資訊。

此外，在台灣西部沿海常可捕獲到紅肉丫髻鮫之懷孕母鯊及幼魚，而該魚種在1996年被國際自然保護聯盟(IUCN)評為近危物種，近年來更因數量下降而修正為瀕危等級。故此，本計畫配合刺網之生物採樣結果，若恰巧捕獲紅肉丫髻鮫個體，將針對此物種之體長、體重、生殖、年齡、胃內容物等生物學特性進行分析，以利與臺灣週邊其他水域進行生物學或生態上的探討；另因紅肉丫髻鮫常為漁民海上作業漁獲物之丟棄物種，易使其資源量估算產生誤差。故在本計畫之漁業資源問卷中，亦會將此物種列入調查，包含捕獲(或丟棄)之尾數(或重量)，以利資料完整分析。

1.8 礁體懸浮固體監測調查方法

1.8.1 漂沙監測調查方法

懸浮漂沙的調查乃使用美國 Campbell Scientific Inc.（CSI）公司生產之光學濁度計（Optical Backscatter Sensor, OBS & Side-Scatter Turbidity Sensor, ClariVUE™10）所示。OBS 光學濁度計全長約 14.1 cm，直徑約 2.5 cm，儀器前端有一量測窗，進行量測時會發射一近紅外光，藉由接收流體中懸浮微粒反射光訊號強度來量測流體濁度大小。儀器所發出之近紅外光波長為 850 ± 5 nm，取樣頻率最大可設定為 10 Hz。ClariVUE™10 光學濁度計全長約 16.6 cm，直徑約 3 cm，儀器前端有一量測窗，進行量測時會發射一近紅外光，藉由接收流體中懸浮微粒反射光訊號強度來量測流體濁度大小。儀器測量範圍為 0 至 4000 FNU，可測量粒徑大小為 0.1 至 0.5 微米。

光學濁度計需利用現場取得的懸浮漂沙進行率定，可以在取得現場的海水樣本後，依照環境部所公告之水中總溶解固體及懸浮固體檢測方法(NIEA W210.58A)來求取濃

度，其方法概要為將攪拌均勻之水樣以一已知重量之玻璃纖維濾片過濾，濾片移入 103～105℃烘箱中乾燥至恆重，其所增加之重量即為懸浮固體重。其詳細步驟及計算公式如下所示：

1. 玻璃纖維濾片之準備：將濾片皺面朝上鋪於過濾裝置上，打開抽氣裝置，連續各以 20 mL 試劑水沖洗 3 次，繼續抽氣至除去所有之水分。將濾片取下置於圓盤上，移入烘箱中以 103～105℃烘乾 1 小時，再將之取出移入乾燥器中冷卻，待其恆重後加以稱重。重複上述烘乾、冷卻、乾燥、稱重之步驟，直至前後兩次之重量差在 0.5 mg 範圍內。將含濾片之圓盤保存於乾燥器內備用。
2. 濾片及樣品量之選擇：樣品量以能獲得 2.5 至 200 mg 間之固體重，如固體含量太低則可增加樣品體積至 1L 為止。若過濾時間超過 10 分鐘以上，則可加大濾片之尺寸或減少樣品之體積。
3. 樣品分析：將已稱重之濾片裝於過濾裝置上，以少量的試劑水將濾片定位。樣品移取過程中須以磁石攪勻，以移液管或量筒量取定量之水樣通過過濾裝置。分別以至少 20mL 試劑水沖洗濾片 3 次，待洗液流盡後繼續抽氣約 3 分鐘。將濾片取下移入圓盤中，放入烘箱以 103～105℃烘乾至少 1 小時後，將之移入乾燥器中冷卻後稱重。重複前述烘乾、冷卻、乾燥及稱重步驟，直至前後兩次之重量差在 0.5 mg 範圍內。

$$\text{懸浮固體（mg/L）} = \frac{(\text{懸浮固體及濾片重（g）} - \text{濾片重（g）}) \times 1000}{\text{樣品體積（L）}}$$

本計畫使用的光學濁度計及聲學濁度觀測皆經過一定的程序進行率定，率定過程的真實懸浮濃度乃利用抽水取樣烘乾秤重，並在驗證過混攪均勻的水槽中進行率定，濁度計的率定結果範列如**圖1.8.1-1**，率定結果如**表1.8.1-1**所示。本團隊已驗證利用長期的資料驗證Ly and Huang (2022)，光學濁度計若正確且良好的率定，可以和現場採水取樣法相當吻合，使光學濁度計資料具有一定程度的代表性。




圖 1.8.1-1　　光學濁度計率定結果圖

表1.8.1-1　　光學濁度計率定公式彙整表

SSC= A X + B　　單位: SSC: (mg / L), X: mV				
儀器編號(位置)	SN1117 (G2)		SN1079 (保護區)	
係數	A	B	A	B
	3656.5	0.36002	4936.9	-3.3055

現場調查時間及點位：本季已於114年10月1日起開始進行每日漂沙監測，114年10月1日起至114年12月31日共計92日之每日漂沙監測值為光學濁度儀量測值。各區點位GPS定位點為G2(25°2.202' N, 121°2.935' E)，保護區(25°1.16' N, 121°1.946' E)如**圖1.8.1-2**所示。



圖 1.8.1-2　　各區 GPS 定位點(上：保護區，下：G2)

1.8.2 海域空間濁度變化方法

一、 調查範圍

調查範圍為觀塘工業區週邊淺水海域。空間上規劃 10 條以上沿著海岸與垂直海岸的測線，如圖 1.8.2-1(a)所示，因應工業港位置及安全因素，規劃路線會配合現場實際情形進行調整，如圖 1.8.2-1(b、c)所示，沿測線進行連續探測(各測線端點經緯度如表 1.8.2-1)，相較原航線，觀測範圍朝西北方向(向外海)增加約 200 公尺。





圖 1.8.2-1 (a)　原施工海域空間濃度變化監測規劃剖面位置圖



註：紅線為本次觀測航線，衛星攝影為 2025/10 拍攝

圖 1.8.2-1 (b)　本次觀測航線與工業港狀況




圖 1.8.2-1 (c)　本次施工海域空間濃度變化監測規劃點位圖

表1.8.2-1　　各測線端點經緯度

點名	經度	緯度	備註	點名	經度	緯度	備註
P01	121.055710°	25.049890°	近岸點	P15	121.039747°	25.037966°	近岸點
P02	121.058875°	25.047206°	近岸點	P16	121.031478°	25.046597°	離岸點
P03	121.061258°	25.048750°	近岸點	P17	121.034181°	25.048249°	離岸點
P04	121.042725°	25.063520°	離岸點	P18	121.042014°	25.039714°	近岸點
P05	121.017697°	25.040821°	離岸點	P19	121.044447°	25.041445°	近岸點
P06	121.028228°	25.029059°	近岸點	P20	121.036449°	25.050219°	離岸點
P07	121.030489°	25.030820°	近岸點	P21	121.038923°	25.051867°	離岸點
P08	121.022582°	25.039568°	離岸點	P22	121.046671°	25.043340°	近岸點
P09	121.024956°	25.041358°	離岸點	P23	121.049109°	25.045115°	近岸點
P10	121.032776°	25.032269°	近岸點	P24	121.041035°	25.053550°	離岸點
P11	121.035153°	25.034400°	近岸點	P25	121.043545°	25.055441°	離岸點
P12	121.027179°	25.043058°	離岸點	P26	121.051568°	25.046858°	近岸點
P13	121.029453°	25.044710°	離岸點	P27	121.053941°	25.048851°	近岸點
P14	121.037408°	25.036147°	近岸點	P28	121.045946°	25.057028°	離岸點

二、作業方法

(一)將聲學儀器(Teledyne RD Instruments ADCP 600kHz)架設於調查船上，於船隻航行過程中連續向水下發射聲波探測不同水層的回聲強度與流速，如圖 1.8.2-2。回聲強度可反演水體中懸浮固體濃度，連續 12 小時的量測可估計整體漂砂移運通量。

(二)每條測線設置採樣點(表 1.8.2-2)，採取表層、中層及底層水體樣本進行分析及比對，由國立中央大學團隊進行採樣後交由元智大學環科中心進行水樣分析(SS)。

(三)進行調查時，同時紀錄包含日期時間、潮位、測站座標、實測水深等記錄資料，並以 ASCII 格式或 Office Excel 格式予以儲存。

(四)設置岸上中控系統即時監控船舶作業，即時掌握海上船隻位置與作業狀況，確保船隻在既定測線範圍內觀測(圖 1.8.2-2)。




圖 1.8.2-2　　船攜 ADCP 走航量測示意圖

表1.8.2-2　　表層、中層及底層水體樣本採樣點

點名	經度	緯度	備註	點名	經度	緯度	備註
DT01	121.024339°	25.033326°	P05P06 中點	DT08	121.04032°	25.045525°	P19P20 中點
DT02	121.026677°	25.035121°	P08P07 中點	DT09	121.0426°	25.047265°	P21P22 中點
DT03	121.02891°	25.036855°	P09P10 中點	DT10	121.04488°	25.048995°	P23P24 中點
DT04	121.031195°	25.038595°	P11P12 中點	DT11	121.04716°	25.050735°	P25P26 中點
DT05	121.033475°	25.040325°	P13P14 中點	DT12	121.049445°	25.052465°	P27P28 中點
DT06	121.035755°	25.04206°	P15P16 中點	DT13	121.05401°	25.055935°	P03P04 中點
DT07	121.03804°	25.043795°	P17P18 中點				




圖 1.8.2-3　　岸上中控系統

三、資料分析方法

大氣中，傳播訊息與溝通的方式包含電磁波與聲波。前者提供直接的電訊影像與目視溝通方式，但在水中卻受到極大的限制，主要的原因乃是因為電磁波能量容易被水吸收與散射，所能穿透的深度最大不及百公尺，尤其在混濁的環境下穿透深度更不及數公尺。以可見光譜為例，一般海水中水深 1m 處能量約為原來的 45%，在 10m 水深約剩 15%，在 100m 水深則僅剩 1% (劉金源，2001)。

本觀測所使用的儀器 ADCP 為主動聲納系統(Active Sonar system)，主要藉由聲波在海水中的傳遞，經反射(Reflection)與散射(Scattering)將部分聲能傳回水下傳聲器達到目標辨識(Identification)。劉(2001)列出聲波方程式基本假設：(1)聲波經過介質時只對介質造成微小的干擾。(2)流體的運動因聲波而產生。(3)未受聲波干擾前，流體密度為均勻且穩定(Uniform in Space and Steady in Time)。

聲學系統觀測懸浮沉積物濃度的原理主要應用聲音反射系統理論(Acoustic Backscatter Systems，ABS)，利用電壓轉換回歸推算懸浮沉積物濃度公式。Thorne (2001)引用 ABS 理論將水下傳聲器接收到的聲波壓力表示如下：

$$P = \frac{a_s f P_i}{2r} e^{i(\omega t - r(k - i\alpha_w))} \quad (1\text{-}1)$$

Pi 為入射壓力，r 為水下傳聲器與懸浮物間的距離，f 是懸浮物顆粒與波數的函數，ω 為角頻率，k 為波數，αw 為聲波被海水吸收的衰減係數，as 為懸浮物顆粒等效半徑。方程式 1-1 可知聲壓受到與聲源的距離、懸浮固體粒徑、與介質吸收衰減因素影響。入射壓力 Pi 以方程式 1-2 表示：

$$P_i = \frac{P_0 r_0}{r} D e^{i(\omega t - r(k - i\alpha_w))} \quad (1\text{-}2)$$

其中，P0 為壓力參考值，r0 為聲源距離參考值，一般使用為 1m，D 為水下傳聲器的方向函數。將方程式 1-2 帶入方程式 1-1 中可以得到聲壓如方程式 1-3 所示。

$$P = \frac{a_s f P_0 r_0 D^2 e^{i(\omega t - 2r(k - i\alpha_w))}}{2r^2} \quad (1\text{-}3)$$

考慮單位懸浮物顆粒體積，其方均根壓可表示為方程式 1-4

$$\Delta P_{rms} = N\langle PP^* \rangle \delta_v \quad (1\text{-}4)$$

其中，P*為 P 之共軛複數，N 為單位體積之粒子數。最後考慮水下傳聲器形狀，將方程式 1-4 轉換如方程式 1-5：

$$P_{rms} = P_0 r_0 \langle f \rangle \left\{ \frac{3M}{16\pi \langle a_s \rangle \rho_s} \right\}^{1/2} \left\{ \int_{r-\tau c/4}^{r+\tau c/4} \int_0^{\pi/2} \int_0^{2\pi} \frac{e^{-4\alpha r}}{r^2} D^4(\theta) \sin\theta \, d\emptyset \, d\theta \, dr \right\}^{1/2} \quad (1\text{-}5)$$

其中 M 為懸浮沉積物濃度，$M = (4/3)\pi \langle a_s^3 \rangle \rho_s N$，$\rho_s$為懸浮物密度，其中$\alpha = \alpha w + \alpha s$，αs是聲波穿透懸浮物的衰減係數，τc為聲波波長，τ為

週期，c是水中聲速。方程式 1-5 中積分式可表示如方程式 1-6 至方程式 1-8 所示：

$$\int_0^{2\pi} d\emptyset = 2\pi \tag{1-6}$$

$$\int_{R-\tau c/4}^{r+\tau c/4} \frac{1}{r^2} dr = \frac{\tau c}{2r^2} \quad 當 \quad \tau c \ll r \tag{1-7}$$

$$\int_0^{\pi/2} D^4(\theta) \sin\theta d\theta = \left\{\frac{0.96}{ka_t}\right\}^2 \quad 當 \quad ka_t \geq 10 \tag{1-8}$$

其中$D(\theta) = 2J_1(ka_t \sin\theta)/(ka_t \sin\theta)a_t$，J1 是 first order Bessel function；at 是接收器半徑。再將方程式 1-8 轉以電壓表示如方程式 1-9。

$$V_{rms} = \frac{k_s k_t}{\Psi r} M^{1/2} e^{2r\alpha} \tag{1-9}$$

其中顆粒特性參數$k_s = \frac{\langle f \rangle}{\sqrt{\langle a_s \rangle \rho_s}}$，系統參數$k_t = RT_v P_0 r_0 \left\{\frac{3\tau c}{16}\right\}^{1/2} \frac{0.96}{ka_t}$，ψ 是聲波壓力的傳遞函數，R 為水下傳聲器接收敏感度，Tv 是電壓轉換函數。而其中αs可以表示如下：

$$\frac{1}{r}\int_0^r \xi(r) M(r) dr \tag{1-10}$$

ξ為衰減常數，可表示為$\xi = \frac{3}{4\langle a_s \rangle \rho_s}\langle \chi \rangle$，χ為散射斷面。在假設αs為 0 下，可以將方程式 1-9 轉換為方程式 1-11。

$$M = \left\{\frac{V_{rms}\Psi r}{k_s k_t}\right\}^2 e^{4r\alpha_w} \tag{1-11}$$

最後將雙邊取對數得方程式 1-12。

$$10\log(M) = 20\log\left(\frac{V_{rms}\Psi r}{k_s k_t}\right) + 40\log(r\alpha_w) \tag{1-12}$$

Poerbandono (2004) 提出相同形式之方程式，如方程式 1-13。

$$10\log(M) = A \cdot EI + B \tag{1-13}$$

其中$EI = I \cdot Kc + 20\log(r) + 2r\alpha$。

Deines (1999) 另提出方程式 1-14。

$$EI = C + 10\log_{10}((Tx + 273.16) \cdot r^2) - L_{DBM} - P_{DBW} + 2r\alpha + Kc \cdot (E - Er) \tag{1-14}$$

其中 EI 為後散射強度，Tx 為水溫，r 為回聲信號離水聽器的距離，LDBM 為 10log10 (transmit pulse length)，PDBW 為 10log10 (transmit power)，Kc 為 received signal strength indicator scale factor，E 為 echo strength (counts)，Er 為 recevied noise (counts)。LDBM、PDBW、Er 為定值故可將這些參數併入常數項，可將方程式 1-14 轉換為：

$$10\log(M) = C_k + 10\log(r^2) + 2r\alpha + Kc \cdot E \tag{1-15}$$

根據 Chien et. al (2011) 利用聲學儀器推估懸浮沈積物濃度之研究，方程式 1-13 利用回聲強度推估懸浮固體濃度依不同頻率之聲學儀器可表示為如方程式 1-16 及方程式 1-17 所示，其中方程式 1-16 代表利用 RDI ADCP

600kHz 所獲得之結果，方程式 1-17 則是利用 RDI ADCP 1200kHz 所獲得之結果

$$10\log_{10}(\mathrm{OBS}_{600}) = 0.8837 \times \mathrm{ABS}_{600} - 53.2 \quad (1\text{-}16)$$

$$10\log_{10}(\mathrm{OBS}_{1200}) = 0.9790 \times \mathrm{ABS}_{1200} - 52.5 \quad (1\text{-}17)$$

方程式 1-16~方程式 1-17 中 OBS 為光學儀器所測得的濁度值，單位為 NTU。ABS 為聲學儀器所測得的回聲強度值，單位為 dB。而光學濁度與採水樣本懸浮沉積物濃度的關係式分別如方程式 1-18 及方程式 1-19 所示：

$$\mathrm{SSC} = 4.01 \times \mathrm{OBS}_{600}{}^{0.9662} \quad (1\text{-}18)$$

$$\mathrm{SSC} = 3.166 \times \mathrm{OBS}_{1200}{}^{0.8729} \quad (1\text{-}19)$$

其中 SSC 為現場採樣的濃度值，單位為 mg/L。OBS 為光學儀器所測得的濁度值，單位為 NTU。因此透過方程式 1-16 及方程式 1-19 即可由聲學回聲強度進行推估懸浮固體濃度，其結果可與現場採集的水樣分析之濃度進行比對，以進行參數之率定。

四、預期成果

本團隊於船隻航行過程中以水下發射聲波探測不同水層的回聲強度與漲退潮期間的流速流向。回聲強度可反演水體中懸浮固體濃度，在連續 12 小時的量測，用以檢視工業港海域泥砂懸浮濃度的三維立體分佈，以及漲退潮期間整體流速對於泥砂搬運在單位時間內之移動範圍，進而估計整體懸浮固體濃度通量。

1.9 海域地形水深測量方法

1.9.1 控制點測量

地形測量作業前，需先進行已知控制點清查、已知控制點檢測、施工控制點設置、平面及高程控制測量等工作，待控制測量工作完成後再依序進行各項測量工作，工作流程如**圖1.9.1-1**所示，本計畫平面控制及高程控制分別採用內政部公告之臺灣大地基準之一九九七坐標系統2010年成果及104年臺灣一等水準網水準測量成果，檢測已知平面控制點及高程控制點，檢測符合精度要求後方可採用。




圖 1.9.1-1　　測量作業流程圖

經檢測後，並於測區設置新控制點，平面坐標是採用GNSS衛星定位測量方式進行，高程測量則以電子式水準儀配合條碼尺進行作業獲取坐標高程成果。控制點測量及陸域地形測量使用儀器規格如**表1.9.1-1**所示。

表1.9.1-1　　控制點測量及陸域地形測量儀器規格

工作項目	儀器型式/規格	儀器相片
平面控制測量 (含陸域地形測量及已知點檢測)	瑞士 Leica GPS 衛星定位儀 GS09 (含 RTK 定位功能) RTK 快速靜態(相位)/靜態模式: 水平 5 mm＋0.5 ppm(rms) 垂直 10 mm + 0.5 ppm(rms) RTK 定位精度:公分級 水平 10 mm＋1 ppm(rms) 垂直 20 mm＋1 ppm(rms) 更新速率:5Hz	
	全測站式電子經緯儀 Leica TCR1201+ 測角精度 1 秒 測距精度 2 mm＋2 ppm	
高程控制測量 (含已知點檢測)	瑞士 Leica DNA03 精密自動水準儀 符合一、二等水準測量精度規範 每公里往返觀測標準中誤差: 搭配鋼鋼尺:0.3 mm 搭配條碼尺:1.0 mm 視距量測誤差:1 cm/20 m(500 ppm) 直讀至小數點後第 5 位 自動紀錄	

1. 平面系統：

採用國家坐標系統，即 1997 臺灣大地基準 (TWD97)。TWD97 坐標系統之參考橢球體採用 1980 年國際大地測量學與地球物理學協會 (International Union of Geodesy and geophysics 簡稱為 IUGG) 公布之參考橢球體 (GRS80)，其橢球參數如下：

長半徑：a=6378137 m；扁率：f=1/298.257222101。

2. 高程系統：

採用內政部公告 2001 臺灣高程基準 (TaiWan Vertical Datum 2001，簡稱 TWVD 2001)，並引用 104 年臺灣一等水準網水準測量成果。

3. 投影坐標系統：

採用經差 2 度分帶之橫麥卡托坐標系統 (TM2)，中央子午線尺度比為 0.9999，中央子午線與赤道之交點為坐標原點，橫坐標西移 250,000 公尺，中央子午線為東經 121 度。

4. 控制點引測：

平面控制經現場勘查選用內政部水準點公佈等同三等控制等級之水準點平面坐標為引測依據，並擇現場共檢測內政部公告已知控制點 HP12、HP29、H079、HO14 及 S001 五點。高程基點由內政部一等一級水準點 D023-D024、D024-D025、D025-D026、D027-D029 分段檢測後，引測至測區。平面及高程已知控制點均須檢測無誤後方得引用。平面控制點檢測及控制點引測採 GPS 靜態觀測方式，平面定位距離精度小於 1/10,000，方位角較差小於 20”；高程測量採直接水準測量方式，高程檢測精度不得超過 7 mm√K (K 為水準測量路線長度公里數)。

1.9.2 陸域地形測量

陸域地形測量需依1/5,000地形圖規範施測，每年需於颱風季節前後配合海域地形測量施測兩次。測線間距約200公尺，測線上測點間距約10公尺，施測範圍由EL. -1m至EL. +2m，或至堤防、道路、防風林等明顯地類界止，需包含海岸地形及海岸防護設施。

本計畫陸域地形測量採全測站經緯儀或GPS RTK即時動態衛星定位方式測繪，並採斷面測線方式進行，斷面位置為海域規劃斷面之延伸(每200 m一條測線)，測點間距離不得大於20公尺、本次實測點位間平均距離約為10公尺，高程精度則優於±2公分。但如遇地形複雜起伏多變或結構物時，則增加測點以資顯示真實地形，而不同高度地形面處設有其高程測點，並包括測量其範圍內作業上可測得之地物的位置及高程，如結構物、道路、排水路、地類界及水門等。


1.9.3 海域地形測量

地形水深量測係經由現場平面定位及實際水深量測，掌握測區附近海域地形水深現狀，現場實測之N、E、D (平面X、平面Y、水深Z) 藉由數值化方式展現三度空間海域地形起伏變化情形，並據以建立數值地形模型 (DTM)。實際工作項目為海域水深測量，主要以單音束測深儀量測水深，其中主要分為平面定位、水深量測及潮位修正等三大部分。水深測量作業流程及資料處理流程詳**圖1.9.3-1**。

1. 平面定位系統使用美國 Trimble Navigation 公司生產之 SPS 361 衛星定位儀，搭配天線為 GA 530 (L1/L2 GPS, MSK Beacon, SBAS and OminiSTAR)，可接收校正訊號包含 MSK Beacon、SBAS (水平定位精度<1m)、DGPS，亦可透過內政部國土測繪中心建構之 e-GNSS 即時動態定位系統進行網路連線以解算公分等級之定位成果。利用導航軟體作測線規劃及導航，導航時之船位需與測線之誤差低於 20% (測線左右 40 公尺內)，測線達成率 100%。
2. 水深量測使用英國 OHMEX 公司生產之 SonarMite 數位化回聲探測儀，此項設備可輸出水深的數位化訊號，經由 RS-232C 界面，將水深資料傳送至電腦中。其測深範圍為 0.28～75m (軟體限制)，音鼓使用頻率為 200KHz、束寬為 5～10 度，其量測誤差為 2.5 公分 (RMS - Root Mean Square)。於每日水深量測作業前後，需進

行現場檢核板校正，以確認測深儀之精度。

3. 潮位修正部份：水深測量進行期間，於永安漁港港域內設置水位計採每 6 分鐘記錄一次資料，以連續紀錄方式進行，期間並配合人工驗潮以校核儀器紀錄，以作為潮位修正之依據。
4. 海域地形測量範圍，自灘線往海測至水深約-35m 處。水深測線採與現有海岸線垂直之佈置方式，主測線間距以 200 公尺為準，並間隔每 1,000 公尺作做一橫向檢測，共規劃 5 條檢核線，點位密度規範為沿測線上每 10 m 至少一點。
5. 測線規劃：地形調查之測線規劃如**圖 1.9.3-2**，測線總長度約 481.3 公里，於測線上測點間距小於 5 公尺。垂直海岸線方向間隔 200 公尺設置 1 條主測線(TA)，實際共設置 73 條，主測線總長約 313.3 公里；於大潭電廠進水口南防波堤至觀音溪口南方 600 公尺間加密測線間距至 100 公尺，往海測至水深約-30m 處，共加密 19 條 (TB36-TB54)，加密測線總長約 57.4 公里；平行海岸線間距約 500 m 設置 1 條檢測線，共設置 7 條 (TC01A-TC24A,…..,TC01G~TC30G)，檢測線總長約 110.6 公里。
6. 監測頻率：陸域地形測量及海域地形測量，每年需於颱風季節前後測量 2 次。



作業流程圖　　資料處理流程圖

圖 1.9.3-1　　水深測量流程圖




圖 1.9.3-2　　水深地形調查規劃測線圖

1.9.4 控制點測量調查成果

本計畫已於113年5月重新檢測內政部公告已知三等衛星控制點HP22、一等一級水準點 (平面相當於三等衛星控制點) D024及前期設置之海岸空置點GB01、HW09、NO03、NO04、DT01、DT03，共計八測點。

平面控制點檢測及控制點引測採GPS靜態觀測方式，控制點坐標反算值相較差值，最大角度較差為3.0秒，最差邊長差比數1/112,468，均優於角度較差不超過20秒，邊長(經必要改正後) 差比數不得大於1/10,000之規範。高程測量採直接水準測量方式，高程檢測最差精度5.90mm√K (K為水準測量路線長度公里數)，均合乎7mm√K規範要求。

控制點坐標成果表如**表1.9.4-1**所示，控制點橫坐標及縱坐標引測之平面中誤差均小於0.010m (平面最弱點NO03)。

表1.9.4-1　　控制點坐標成果表

點名	縱坐標	縱坐標中誤差	橫坐標	橫坐標中誤差	高程(TWVD2001)	備註
D024	2768534.549	0.0000	258705.934	0.0000	30.427	已知水準點
GB01	2768362.970	0.0034	254139.820	0.0043	5.556	前期控制點
NO03	2766938.477	0.0034	252979.389	0.0048	6.284	前期控制點
NO04	2764450.029	0.0028	251673.930	0.0039	3.160	前期控制點
DT01	2772475.259	0.0000	259658.969	0.0000	5.375	前期控制點
DT03	2770896.470	0.0023	257581.735	0.0032	5.186	前期控制點

註：本計畫113年5月施測成果。

1.9.5 觀音溪口斷面先期控制點測量調查成果

本計畫平面控制及高程控制分別採用內政部公告之臺灣大地基準之一九九七坐標系統2010年成果及104年臺灣一等水準網水準測量成果，並於108年3月完成控制點檢測工作，測區現場共設置TS01、T21及R01三點控制點，作為現場測量控制依據。

陸域地形測量採用RTK方式或以全測站式經緯儀配合三次元數值法施測進行規劃測線上之地形、地貌測量工作。現場測量係以RTK進行控制點檢測，檢核無誤後，使用RTK進行沙灘地形測量，堤防部分使用全測站經緯儀測量進行地形測量。

表1.9.5-1　　觀音溪口控制點坐標成果表

點名	縱坐標(m)	橫坐標(m)	高程(m)	備註
T21	2770913.247	257593.670	5.283	計畫設置控制點
TS01	2770791.558	257561.091	4.969	計畫設置控制點
R01	2770834.588	257542.678	5.320	觀音溪右岸斷面樁

1.10 海域地形地貌測量方法

1.10.1 高解析度影像地形地貌攝影

一、執行設備

本調查計畫使用專業用空拍機進行調查，如 Evo 2 Professional、Phantom 4 RTK、Phantom 4、Mavic 等專業空拍機。Phantom 4 RTK 內建全球衛星定位系統(GPS)並搭配即時動態定位(RTK)，提供公分等級精準定位。此機型屬於工業級高階四軸旋翼機，常用於工程高精準測繪工作，在搭配地面控制系統或航點規劃下，能在指定區域自動化拍攝地面結構物。DRTK2 地面基站為四頻衛星定位系統，可以接收 GPS、BEIDOU、GLONASS 和 GALILEO 的衛星訊號，並能傳送衛星矯正訊號給 Phantom 4 RTK。

Phantom 4 RTK 有兩種 RTK 定位模式，一為網路自定義矯正訊號，在此模式下，移動站使用網路上測繪公司提供的衛星矯正訊號移除定位誤差，以達到公分等級定位，該模式又稱為虛擬基站(RTK-VBS)。二為自行架設基站傳送矯正訊號，使用時必須有兩個衛星接收天線，其中一個作為固定基站傳送矯正訊號給移動站，此方法又稱為傳統 RTK。如圖 1.10.1-1 所示，右下為 Phantom 4 RTK，左側天線為 DRTK2 地面基站。



圖 1.10.1-1　　Phantom 4 RTK 無人機（右）與 DRTK2 地面基站

二、工作流程與影像拼接方法

工作流程如**圖 1.10.1-2** 所示。因應環差會議之結論，空拍調查頻率調整為冬季及春季每月執行一次(若天候條件不許可則留存紀錄備查)，夏季及秋季每季執行一次，一年共執行八次。為方便之後討論，將以季節的方式進行討論，季節劃分標準依據陸域生態的標準定義出四個季節，春季為 3~5 月；夏季為 6 ~ 8 月；秋季為 9 ~ 11 月；冬季為 12 ~ 2 月。




圖 1.10.1-2　　工作執行流程圖

(一)、分區方法

為了調查藻礁分佈，首先以海岸特性劃設分區，並以平均低潮位線為離岸邊界，總共區分為 A1 至 A12，分別為南永續區、南緩衝區 1、南緩衝區 2、核心區、北緩衝區、北永續區、大潭工業區 G3、大潭工業區 G2、大潭工業區 G1、觀塘工業區北堤至觀音溪口、觀音溪口至大堀溪口 1、觀音溪口至大堀溪口 2，其分區範圍及經緯度資料如**圖 1.10.1-3** 及**表 1.10.1-1** 所示。




圖 1.10.1-3　　海岸特性劃設分區圖

表1.10.1-1　　各分區沿岸兩點經緯度之整理

海岸特性	編號	緯度(南)	經度(南)	緯度(北)	經度(北)
南永續區 1	A1	24°59'26.52" N	121°00'55.99" E	24°59'49.37" N	121°01'10.58" E
南永續區 2	A2	24°59'49.37" N	121°01'10.58" E	25°00'12.57" N	121°01'23.11" E
南緩衝區	A3	25°00'12.57" N	121°01'23.11" E	25°00'35.20" N	121°01'42.66" E
核心區	A4	25°00'35.20" N	121°01'42.66" E	25°01'01.06" N	121°01'54.78" E
北緩衝區	A5	25°01'01.06" N	121°01'54.78" E	25°01'15.26" N	121°02'07.42" E
北永續區	A6	25°01'15.26" N	121°02'07.42" E	25°01'32.34" N	121°02'20.49" E
大潭工業區 G3	A7	25°01'44.55" N	121°02'30.41" E	25°02'02.85" N	121°02'49.42" E
大潭工業區 G2	A8	25°02'06.67" N	121°02'52.09" E	25°02'24.66" N	121°03'16.72" E
大潭工業區 G1	A9	25°02'28.10" N	121°03'23.14" E	25°02'34.77" N	121°03'40.16" E
觀塘工業區北堤至觀音溪出海口	A10	25°02'38.83" N	121°03'52.69" E	25°02'49.72" N	121°04'28.48" E
觀音溪出海口至大堀溪出海口	A11	25°02'49.72" N	121°04'28.48" E	25°03'12.33" N	121°05'08.65" E
觀音溪出海口至大堀溪出海口	A12	25°03'12.33" N	121°05'08.65" E	25°03'38.35" N	121°05'45.34" E

(二)、現場工作流程

現場空拍日期依據中央氣象署公佈的大潮位標準施作。到達空拍機起飛點後，拍照並記錄現場施作情況。接著放置地面參考點，並用手持 GPS 定位記錄並拍照。視情況手動飛行或自動導航操作無人機，空拍目標分區範圍。空拍機雖然具有方便性以及精確性，但現場空拍業務分配一個人飛行，另一個人負責施作安全，確保一切安全無虞。

(三)、影像拼接

取得空拍影像後，使用 UAV 專業影像後製處理軟體 Pix4Dmapper 拼接產製正射影像。處理流程如下：軟體讀取原始影像的 EXIF 資料、獲取 GPS 資料、獲取相機參數、初始化運算、特徵匹配、密集化點雲、正攝影糾正、編修鑲嵌線、產製正射影像、產製精度報表，軟體作業流程如**圖 1.10.1-4** 所示。過程中不需人工介入，軟體自動計算空中三角測量，並來回推內、外方位參數。

(四)、資料呈現方法

獲得正攝影像後，將圖資匯入地理資訊系統 ArcGIS，座標系統為 WGS84 zone51N。並在正攝影像上疊圖分區範圍邊界與分區名稱，輸出各分區的空拍結果，如**圖 1.10.1-5**。



圖 1.10.1-4　　Pix4Dmapper 處理軟體作業流程圖




圖 1.10.1-5　　ArcGIS 實際操作畫面

第二章　監測結果數據分析

2.1 空氣品質

本季空氣品質監測工作於114年10月13日～114年10月14日執行，針對清華高中、大覺寺、觀音國中與永安國中等四處進行連續24小時空氣品質監測工作。109年第三季前，各項空氣品質監測結果係以民國101年05月14日最新公告之「空氣品質標準」作為比較依據。

109年第四季起，空氣品質監測結果係以民國109年09月18日最新公告之「空氣品質標準」作為比較依據。113年第四季起，空氣品質監測結果係以民國113年09月30日最新公告之「空氣品質標準」作為比較依據。

本季監測背景溫度介於27.8～30.2 ℃、平均風速介於0.4～1.2 m/s、相對溼度介於64.0～79.0 %與累積雨量為0 mm。各監測點位天氣狀況：清華高中、大覺寺、觀音國中於114年10月13日天氣為晴天；永安國中於114年10月14日天氣為晴天。空氣品質監測成果彙整於**表2.1-1**，逐時監測結果詳見**附錄四**，詳述如下：

一、 二氧化硫（SO_2）：本季各測站之最大小時平均值介於 0.0020～0.0060 ppm，低於空氣品質標準〔 0.065 ppm〕；日平均值介於 0.0010～0.0050 ppm。

二、 二氧化氮（NO_2）：本季各測站最大小時平均值介於 0.0120～0.0220 ppm，低於空氣品質標準〔 0.100 ppm〕。

三、 一氧化碳（CO）：本季各測站之最大小時平均值介於 0.20～0.50 ppm，低於空氣品質標準〔 31 ppm〕；八小時平均值介於 0.20～0.40 ppm，低於空氣品質標準〔 9 ppm〕。

四、 懸浮微粒（PM_{10}）：本季各測站之日平均值介於 18～31 μg/m^3，低於空氣品質標準〔 75 μg/m3〕。

五、 懸浮微粒（$PM_{2.5}$）：本季各測站之 24 小時測值介於 11～23 μg/m^3，低於空氣品質標準〔 30 μg/m3〕。

表2.1-1 施工期間空氣品質監測結果分析表

空氣品質			施工期間 114 年第 4 季			
		日期：	114.10.13	114.10.13	114.10.13	114.10.14
項目	單位	監測點 / 標準	清華高中	大覺寺	觀音國中	永安國中
天氣	-	-	晴天	晴天	晴天	晴天
TSP	$\mu g/m^3$	-	51	51	36	35
PM_{10}	$\mu g/m^3$	75	31	31	22	18
$PM_{2.5}$	$\mu g/m^3$	30	23	22	18	11
SO_2	最大小時平均值	ppm	0.065	0.0040	0.0040	0.0060	0.0020
	日平均值	ppm	-	0.0020	0.0020	0.0050	0.0010
NO	最大小時平均值	ppm	-	0.0040	0.0040	0.0030	0.0060
NO_2	最大小時平均值	ppm	0.1	0.0220	0.0190	0.0210	0.0120
CO	最大小時平均值	ppm	31	0.40	0.50	0.40	0.20
	最大 8 小時平均值	ppm	9	0.30	0.30	0.40	0.20
THC		ppm	-	2.1	2.5	2.2	2.1
氯鹽(鹽份)		$\mu g/m^3$	-	1.34	1.30	1.41	1.24
雨中 pH		-	-	6.7	6.9	7.3	6.7
最頻風向		方位	-	NNE	SSE	N	ESE
風速		m/s	-	0.6	1.2	0.5	0.4
溫度		℃	-	29.3	27.8	29.0	30.2
濕度		%	-	73.0	79.0	77.0	64.0

註：1. 監測點位位處沿海地區，鹽份多為海鹽或氯化氫，故鹽份皆以氯鹽為主。

2.2 噪音振動

一、噪音

本季噪音於 114 年 10 月 12 日～114 年 10 月 13 日由北至南針對台 15 與桃 92 路口、台 15 與桃 94 路口及台 15 與桃 93 路口進行運輸路線敏感點監測工作，各項噪音監測結果係以民國 99 年 01 月 21 日(99)環署空字第 0990006225D 號發布之「道路邊地區環境音量標準」作為比較依據。另依據桃園市政府 113 年 1 月 2 日府環噪字第 1120360835 號公告「噪音管制區分類範圍」附表一第 31 項，桃園市定義道路用地應視為「第四類」噪音管制區，故本案台 15 與桃 92 路口、台 15 與桃 94 路口與台 15 與桃 93 路口適用第四類管制區內緊鄰八公尺以上之道路標準值〔$L_{日}$為 76 dB(A)、$L_{晚}$為 75 dB(A)、$L_{夜}$為 72 dB(A)〕。

有關監測地點、現場狀況及相關監測紀錄請參照**附錄二**品保/品管查核紀錄及**附錄四**原始數據，經彙整各時段均能音量監測成果，詳見**表 2.2-1 至表 2.2-2** 所示，並與環境音量標準(如**表 2.2-3**)比較，茲分述如下。

(一) $L_{日}$：本季各測站之測值介於 61.4～67.6dB(A)，以台 15 與桃 94 路口(非假日)測值為最高，各站皆符合第三類管制區道路交通噪音環境音量標準 76dB(A)內。

(二) $L_{晚}$：本季各測站之測值介於 59.5～63.6dB(A)，以台 15 與桃 94 路口(非假日)測值為最高，各站皆符合第三類管制區道路交通噪音環境音量標準 75dB(A)內。

(三) $L_{夜}$：本季各測站之測值介於 58.0～60.2dB(A)，以台 15 與桃 92 路口(非假日)測值為最高，各站皆符合第三類管制區道路交通噪音環境音量標準 72dB(A)內。

(四) L_{max}：本季各測站之測值介於 87.9～100.4dB(A)，以台 15 與桃 93 路口(非假日)測值為最高。

(五) L_x：本季各測站 L_5 之最大測值介於 68.9～77.0dB(A)，L_{10} 之最大測值介於 67.6～73.7dB(A)，L_{50} 之最大測值介於 55.0～63.5dB(A)，L_{90} 之最大測值介於 45.7～59.6dB(A)，L_{90} 之最大測值介於 45.3～59.3dB(A)。

表2.2-1 施工期間噪音監測結果分析表

噪音振動		施工期間 114 年第 4 季							
		執行日期：	114.10.12 (假日)~114.10.13 (非假日)						
項目	單位	監測點 / 標準	台 15 與桃 92 路口		台 15 與桃 94 路口		台 15 與桃 93 路口		
			114.10.12 假日	114.10.13 非假日	114.10.12 假日	114.10.13 非假日	114.10.12 假日	114.10.13 非假日	
天氣	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
$L_{日}$	dB(A)	76	61.4	65.6	64.7	67.6	67.1	66.9	
$L_{晚}$	dB(A)	75	59.5	61.7	62.7	63.6	62.0	61.0	
$L_{夜}$	dB(A)	72	58.0	60.2	60.0	60.0	60.1	59.0	
L_{max}	dB(A)	-	87.9	92.4	90.9	98.2	94.5	100.4	

表2.2-2 施工期間均能音量監測結果分析表

噪音振動	施工期間 114 年第 4 季						
	114.10.12 (假日)~114.10.13 (非假日)						
項目	監測點 / 單位	台 15 與桃 92 路口		台 15 與桃 94 路口		台 15 與桃 93 路口	
		114.10.12 假日	114.10.13 非假日	114.10.12 假日	114.10.13 非假日	114.10.12 假日	114.10.13 非假日
天氣	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
L_5	dB(A)	68.9	73.0	73.9	77.0	75.1	73.6
L_{10}	dB(A)	67.6	71.3	69.3	73.7	71.6	69.6
L_{50}	dB(A)	58.2	63.5	55.0	60.3	59.1	57.8
L_{90}	dB(A)	51.7	59.6	45.7	47.6	52.4	50.2
L_{95}	dB(A)	49.7	59.3	45.3	47.0	50.8	48.7

表2.2-3 環境音量標準

單位：dB(A)

管制區 \ 時段/音量		均能音量(L_{eq})		
		日間	晚間	夜間
一般地區噪音	第一類噪音管制區	55	50	45
	第二類噪音管制區	60	55	50
	第三類噪音管制區	65	60	55
	第四類噪音管制區	75	70	65
道路交通噪音	第一類或第二類管制區內緊鄰未滿八米之道路	71	69	63
	第一類或第二類管制區內緊鄰八米以上之道路	74	70	67
	第三類或第四類管制區內緊鄰未滿八米之道路	74	73	69
	第三類或第四類管制區內緊鄰八米以上之道路	76	75	72

註：

1.第一類管制區：指環境極需安寧之地區。第二類管制區：指供住宅使用為主而需安寧之地區。第三類管制區：指供工業、商業及住宅使用需維護其住宅安寧之地區。第四類管制區：指供工業使用為主而需防止嚴重噪音影響附近住宅安寧之地區。

2.時段區分：

日間：第一、二類噪音管制區指上午六時至晚上八時；第三、四類噪音管制區指上午七時至晚上八時。

晚間：第一、二類噪音管制區指晚上八時至晚上十時；第三、四類噪音管制區指晚上八時至晚上十一時。

夜間：第一、二類噪音管制區指晚上十時至翌日上午六時；第三、四類噪音管制區指晚上十一時至翌日上午七時。

二、振動

本季振動於 114 年 10 月 12 日～114 年 10 月 13 日由北至南針對台 15 與桃 92 路口、台 15 與桃 94 路口及台 15 與桃 93 路口進行運輸路線敏感點監測工作，各項振動監測結果係以日本環境廳總務課編：環境六法，昭和 58 年版之「日本東京公害振動規則」作為比較依據，並適用第二種區域標準值〔$Lv_{10\,日}$為 70 dB、$Lv_{10\,夜}$為 65 dB〕，該區域相對我國噪音管制區第三類管制區。逐時監測成果詳見**附錄四**所示，日本振動規制法施行規則之道路限值參考**表 2.2-4**，監測成果則彙整於**表 2.2-5** 至**表 2.2-6**。

(一)$Lv_{10\,日}$：本季各測站之測值皆為 30.0 dB，各站測值相同皆符合第二種區域日本東京公害振動規則 70 dB 內。

(二)$Lv_{10\,夜}$：本季各測站之測值皆為 30.0 dB，各站測值相同皆符合第二種區域日本東京公害振動規則 65 dB 內。

(三)$L_{v\,max}$：本季各測站之測值介於 39.2～50.8dB，以台 15 與桃 94 路口(非假日)測值為最高。

(四)L_{vx}：本季各測站 Lv_5 之測值介於 30.0～32.5 dB，Lv_{10} 之測值皆為 30.0dB，Lv_{50} 之測值皆為 30.0 dB，Lv_{90} 之測值皆為 30.0 dB，Lv_{95} 之測值皆為 30.0 dB。

表2.2-4 日本振動規制法施行規則

時間 / 區域	日間標準值 (Lv_{10})	夜間標準值 (Lv_{10})
第一種區域	65 分貝	60 分貝
第二種區域	70 分貝	65 分貝

資料來源：日本執行振動規則。

註:

1. 以垂直振動為限，0 dB參考位準為$10^{-5}m/sec^2$。
2. 所謂第一種區域，約相當於我國噪音管制區之第一類及第二類管制區；第二種區域，約相當於我國噪音管制區之第三類及第四類管制區。
3. 所謂日間是從上午五時、六時、七時或八時開始到下午七時、八時、九時或十時為止。所謂夜間是從下午七時、八時、九時或十時開始到翌日上午五時、六時、七時或八時為止。

表2.2-5 施工期間振動監測結果分析表

振動		施工期間 114 年第 4 季							
		執行日期：	114.10.12 (假日)~114.10.13 (非假日)						
項目	單位	監測點 / 標準	台 15 與桃 92 路口		台 15 與桃 94 路口		台 15 與桃 93 路口		
			114.10.12 假日	114.10.13 非假日	114.10.12 假日	114.10.13 非假日	114.10.12 假日	114.10.13 非假日	
天氣	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴	
$L_{V10\,日}$	dB	70	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
$L_{V10\,晚}$	dB	65	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	
L_{Vmax}	dB	-	39.2	42.8	43.3	50.8	43.8	44.5	

註：標準係參考「第二種區域日本東京公害振動規則」。

表2.2-6 施工期間均能振動量監測結果分析表

噪音振動	施工期間 114 年第 4 季						
	114.10.12 (假日)~114.10.13 (非假日)						
項目	監測點 / 單位	台 15 與桃 92 路口		台 15 與桃 94 路口		台 15 與桃 93 路口	
		114.10.12 假日	114.10.13 非假日	114.10.12 假日	114.10.13 非假日	114.10.12 假日	114.10.13 非假日
天氣	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
L_{v5}	dB	30.0	30.0	30.0	32.5	30.0	30.0
L_{v10}	dB	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
L_{v50}	dB	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
L_{v90}	dB	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0
L_{v95}	dB	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0	30.0

2.3 營建噪音

本季營建噪音於114年10月13日針對工業港工區周界外15公尺取兩點進行監測工作，監測時間為11:49～13:15，背景最大風速介於0.4～0.6 m/sec，各監測點位天氣狀況皆為晴天。各項營建噪音監測結果係以民國102年8月5日行政院環境保護署(現環境部)環署空字第1020065143號修正發布「營建工程噪音管制標準」作為比較依據，並適用第二類日間標準值(L_{eq}為67 dB(A)、L_{max}為100 dB(A))，監測結果(含背景噪音)及監測位置詳見**附錄四**；分析結果詳如**表2.3-1**所示，經彙整本季營建工程噪音監測結果與**表2.3-2**之營建工程噪音管制標準(以下簡稱管制標準)比較。

一、L_{eq}：本季工業港工區周界 1 測值為 63.9 dB(A)、工業港工區周界 2 測值為 64.3 dB(A)，以工業港工區周界 2 測值為較高。兩站皆符合第二類日間營建工程噪音管制標準 67dB(A)內。

二、L_{max}：本季工業港工區周界 1 測值為 83.2 dB(A)、工業港工區周界 2 測值為 84.9 dB(A),以工業港工區周界 2 測值為較高。兩站皆符合第二類日間營建工程噪音管制標準 100 dB(A)內。

表2.3-1 營建噪音監測結果分析表

營建噪音		施工期間 114 年第 4 季				
		執行日期：	114.10.13			
項目	單位	監測點 / 標準	工業港工區周界 1	工業港工區周界 1 (背景音量)	工業港工區周界 2	工業港工區周界 2 (背景音量)
天氣	-	-	晴	晴	晴	晴
L_{eq}	dB(A)	67	63.9	56.5	64.3	58.4
L_{max}	dB(A)	100	83.2	58.8	84.9	58.9

表2.3-2 營建工程噪音管制標準

單位：dB(A)

頻率		20 Hz 至 20k Hz		
管制區 / 時段		日間	晚間	夜間
均能音量 (L_{eq})	第一類	67	47	47
	第二類	67	57	47
	第三類	72	67	62
	第四類	80	70	65
最大音量 (L_{max})	第一、二類	100	80	70
	第三、四類	100	85	75

註：1.時段區分
日間：第一、二、三、四類指上午七時至晚上七時。
晚間：第一、二類指晚上七時至晚上十時。第三、四類指晚上七時至晚上十一時。
夜間：第一、二類指晚上十時至翌日上午七時。第三、四類指晚上十一時至翌日上午七時。
2.管制區分類：桃園市環保局依噪音管制法第7條規定公告。
3.「噪音管制標準」，中華民國102年8月5日行政院環境保護署(現環境部)環署空字第1020065143號修正發布，103年2月5日起實施。

2.4 低頻噪音

本季低頻噪音於114年10月12日～114年10月13日由北至南針對台15與桃92路口、台15與桃94路口及台15與桃93路口進行運輸路線敏感點監測工作，有關監測地點、現場狀況及相關監測紀錄請參照**附錄二**品保/品管查核紀錄及**附錄四**原始數據，經彙整各時段監測成果，詳見**表2.4-1所**示。

一、$L_{eq,LF\ 日}$於本季各測站之測值介於 49.8~53.3 dB(A)，以台 15 與桃 93 路口(非假日)測值為最高。

二、$L_{eq,LF\ 晚}$於本季各測站之測值介於 45.7~48.9 dB(A)，以台 15 與桃 92 路口(非假日)及台 15 與桃 94 路口(非假日)測值為最高。

三、$L_{eq,LF\ 夜}$於本季各測站之測值介於 43.6～48.1 dB(A)，以台 15 與桃 92 路口(非假日)測值為最高。

表2.4-1 施工期間低頻噪音監測結果分析表

低頻噪音		施工期間 114 年第 4 季						
		執行日期：	114.10.12 (假日)~114.10.13 (非假日)					
項目	單位	監測點 / 標準	台 15 與桃 92 路口		台 15 與桃 94 路口		台 15 與桃 93 路口	
			114.10.12 假日	114.10.13 非假日	114.10.12 假日	114.10.13 非假日	114.10.12 假日	114.10.13 非假日
天氣	-	-	晴	晴	晴	晴	晴	晴
$L_{eq,LF\ 日}$	dB(A)	-	51.0	53.3	49.8	52.5	51.6	52.0
$L_{eq,LF\ 晚}$	dB(A)	-	48.0	48.9	48.1	48.9	46.0	45.7
$L_{eq,LF\ 夜}$	dB(A)	-	47.0	48.1	45.3	44.7	43.9	43.6

2.5 交通流量

本季交通流量監測工作於114年10月12日～114年10月13日假日、非假日連續48小時監測，針對大潭國小、坑尾活動中心、東明國小、觀音橋、台15線/台66線及台61線/台66線等四處路段與兩處路口進行交通流量監測工作，各項交通流量監測結果係以「2011年台灣地區公路容量手冊」作為比較依據，V/C值係指道路交通量與道路容量之比值，道路服務水準判斷依據詳**表2.5-1**。

施工期間路段交通量監測結果詳**表2.5-2**：

本季路段交通流量非假日(全日)車輛數介於2,741～8,283輛，以東明國小往西最高；假日(全日)車輛數介於2,193～7,718輛，以東明國小往西最高，各站尖峰時段服務水準為A，尚未因施工造成路段壅塞之情事。

施工期間路口交通量監測結果詳**表2.5-3**：

本季路口交通流量非假日(全日)車輛數介於941～6,940輛，以台61線與台66線(台66往西)最高；假日(全日)車輛數介於689～5,634輛，以台15線與台66線(台66往西)最高，各站尖峰時段服務水準皆為A，尚未因施工造成路口壅塞之情事。

表2.5-1 道路服務水準表

服務水準	V/C 值		
	多車道路段 (非阻斷性車流路段)	雙車道路段	
		禁止超車區段 0%	禁止超車區段 100%
A	0.00～0.37	0.00～0.15	0.00～0.03
B	0.38～0.62	0.16～0.26	0.04～0.13
C	0.63～0.79	0.27～0.42	0.14～0.28
D	0.80～0.91	0.43～0.62	0.29～0.43
E	0.92～1.00	0.63～0.97	0.44～0.90
F	> 1.00	-	-
調查路段	大潭國小、坑尾活動中心、東明國小、台 15 線與台 66 線路口、台 61 線與台 66 線路口	觀音橋	-
備註	一般 A 級代表有充分行車自由之狀況，F 級代表不穩定之壅塞車流狀況。 A 自由車流，B 穩定車流(少許延滯)，C 穩定車流(延滯可接受)，D 近乎不穩定車流(延滯可容忍)，E 不穩定車流(延滯不可容忍)，F 強迫車流(已阻塞)。		

表2.5-2 施工期間路段交通量監測結果(1/2)

監測點	日期	監測點	時間		機踏車(輛)	小型車(輛)	大型車(輛)	特種車(輛)	車輛總數	尖峰流量(PCU／hr)	服務水準
大潭國小	非假日 114.10.13	北	上午尖峰時段	07:00~08:00	106	292	11	6	415	377	A
			下午尖峰時段	17:00~18:00	88	285	13	5	391	361	A
			全日		868	2,853	199	108	4,028	—	—
		南	上午尖峰時段	07:00~08:00	142	288	15	5	450	394	A
			下午尖峰時段	17:00~18:00	131	259	11	1	402	344	A
			全日		963	2,840	191	102	4,096	—	—
	假日 114.10.12	北	上午尖峰時段	09:00~10:00	61	193	16	5	275	260	A
			下午尖峰時段	16:00~17:00	94	210	9	1	314	273	A
			全日		938	2,815	128	46	3,927	—	—
		南	上午尖峰時段	11:00~12:00	59	234	11	4	308	290	A
			下午尖峰時段	12:00~13:00	50	211	10	3	274	259	A
			全日		915	2,823	125	37	3,900	—	—
坑尾活動中心	非假日 114.10.13	北	上午尖峰時段	07:00~08:00	246	422	27	34	729	671	A
			下午尖峰時段	17:00~18:00	67	190	14	17	288	287	A
			全日		1,011	2,995	365	416	4,787	—	—
		南	上午尖峰時段	09:00~10:00	40	154	28	66	288	381	A
			下午尖峰時段	17:00~18:00	193	365	17	26	601	552	A
			全日		1,015	2,917	374	570	4,876	—	—
	假日 114.10.12	北	上午尖峰時段	07:00~08:00	139	110	6	8	263	209	A
			下午尖峰時段	19:00~20:00	27	133	9	3	172	168	A
			全日		811	2,011	142	118	3,082	—	—
		南	上午尖峰時段	10:00~11:00	95	137	9	12	253	228	A
			下午尖峰時段	17:00~18:00	103	148	9	2	262	218	A
			全日		836	1,937	204	119	3,096	—	—

表2.5-2 施工期間路段交通量監測結果(2/2)

監測點	日期	方向	時間		機踏車(輛)	小型車(輛)	大型車(輛)	特種車(輛)	車輛總數	尖峰流量(PCU／hr)	服務水準
東明國小	非假日 114.10.13	東	上午尖峰時段	07:00~08:00	160	504	14	13	691	638	A
			下午尖峰時段	12:00~13:00	52	354	23	44	473	525	A
			全日		986	5,416	275	339	7,016	—	—
		西	上午尖峰時段	07:00~08:00	240	465	28	19	752	675	A
			下午尖峰時段	17:00~18:00	182	386	26	27	621	584	A
			全日		2,170	5,202	456	455	8,283	—	—
	假日 114.10.12	東	上午尖峰時段	11:00~12:00	97	469	17	20	603	593	A
			下午尖峰時段	15:00~16:00	72	430	20	26	548	561	A
			全日		1,019	5,573	193	211	6,996	—	—
		西	上午尖峰時段	11:00~12:00	130	397	13	38	578	577	A
			下午尖峰時段	17:00~18:00	82	421	20	13	536	525	A
			全日		1,453	5,612	265	388	7,718	—	—
觀音橋	非假日 114.10.13	東	上午尖峰時段	11:00~12:00	45	150	5	2	202	185	A
			下午尖峰時段	17:00~18:00	126	180	5	-	311	251	A
			全日		813	1,759	138	31	2,741	—	—
		西	上午尖峰時段	07:00~08:00	133	175	10	-	318	257	A
			下午尖峰時段	16:00~17:00	88	133	8	2	231	194	A
			全日		936	1,734	145	30	2,845	—	—
	假日 114.10.12	東	上午尖峰時段	11:00~12:00	42	125	6	-	173	155	A
			下午尖峰時段	17:00~18:00	72	113	3	-	188	154	A
			全日		705	1,405	72	11	2,193	—	—
		西	上午尖峰時段	11:00~12:00	35	116	5	-	156	141	A
			下午尖峰時段	16:00~17:00	66	94	2	-	162	130	A
			全日		783	1,356	57	25	2,221	—	—

表2.5-3 施工期間路口交通量監測結果(1/2)

監測站	日期	方向	時間		機踏車(輛)	小型車(輛)	大型車(輛)	特種車(輛)	車輛總數	尖峰流量(PCU／hr)	服務水準
台 15 線/台 66 線	非假日 114.10.13	東	上午尖峰時段	11:00~12:00	17	215	52	86	370	516.5	A
			下午尖峰時段	16:00~17:00	101	435	56	56	648	709.5	A
			全日		347	3,949	670	965	5,931	—	—
		西	上午尖峰時段	07:00~08:00	141	770	49	51	1,011	1,041.5	A
			下午尖峰時段	14:00~15:00	11	278	57	60	406	519	A
			全日		426	4,807	753	790	6,776	—	—
		南	上午尖峰時段	07:00~08:00	192	315	29	19	555	502	A
			下午尖峰時段	17:00~18:00	130	302	21	6	459	413.5	A
			全日		1,054	3,174	333	274	4,835	—	—
		北	上午尖峰時段	07:00~08:00	106	292	11	6	415	376.5	A
			下午尖峰時段	17:00~18:00	88	285	13	5	391	361	A
			全日		868	2,853	199	108	4,028	—	—
	假日 114.10.12	東	上午尖峰時段	11:00~12:00	21	230	23	43	317	382.5	A
			下午尖峰時段	17:00~18:00	38	404	19	19	480	499	A
			全日		306	3,766	328	457	4,857	—	—
		西	上午尖峰時段	11:00~12:00	20	364	33	33	450	506	A
			下午尖峰時段	14:00~15:00	16	342	20	30	408	455	A
			全日		392	4,484	391	367	5,634	—	—
		南	上午尖峰時段	07:00~08:00	127	206	17	19	369	342.5	A
			下午尖峰時段	17:00~18:00	78	213	9	3	303	273	A
			全日		984	2,861	186	175	4,206	—	—
		北	上午尖峰時段	09:00~10:00	61	193	16	5	275	260	A
			下午尖峰時段	16:00~17:00	94	210	9	1	314	273	A
			全日		938	2,815	128	46	3,927	—	—

表2.5-3 施工期間路口交通量監測結果(2/2)

監測站	日期	方向	時間		機踏車(輛)	小型車(輛)	大型車(輛)	特種車(輛)	車輛總數	尖峰流量(PCU／hr)	服務水準
台 61 線/台 66 線	非假日 114.10.13	東	上午尖峰時段	11:00~12:00	5	39	6	11	61	78	A
			下午尖峰時段	16:00~17:00	19	94	6	6	125	127.5	A
			全日		110	648	74	109	941	—	—
		西	上午尖峰時段	07:00~08:00	207	758	52	56	1,073	1,079.5	A
			下午尖峰時段	14:00~15:00	12	260	53	62	387	500.5	A
			全日		574	4,681	769	916	6,940	—	—
		南	上午尖峰時段	07:00~08:00	97	316	40	45	498	537	A
			下午尖峰時段	17:00~18:00	68	428	33	34	563	596.5	A
			全日		594	3,212	575	749	5,130	—	—
		北	上午尖峰時段	07:00~08:00	46	335	33	53	467	540	A
			下午尖峰時段	17:00~18:00	79	394	32	33	538	564	A
			全日		566	3,544	607	897	5,614	—	—
	假日 114.10.12	東	上午尖峰時段	11:00~12:00	5	31	3	5	44	50.5	A
			下午尖峰時段	16:00~17:00	8	47	3	3	61	63	A
			全日		95	489	40	65	689	—	—
		西	上午尖峰時段	07:00~08:00	86	319	26	37	468	493.5	A
			下午尖峰時段	14:00~15:00	18	308	16	32	374	421	A
			全日		437	4,160	372	461	5,430	—	—
		南	上午尖峰時段	07:00~08:00	109	164	16	29	318	315	A
			下午尖峰時段	17:00~18:00	55	249	13	16	333	336	A
			全日		834	2,576	258	449	4,117	—	—
		北	上午尖峰時段	11:00~12:00	43	166	20	42	271	322.5	A
			下午尖峰時段	17:00~18:00	72	299	14	19	404	403.5	A
			全日		646	2,840	273	554	4,313	—	—

2.6 河口水質和底泥

本季於114年10月15日進行大堀溪、觀音溪、小飯壢溪、新屋溪及社子溪河口之水質和底泥採樣，採樣當日天氣晴，溫度約29.5~31.1度左右，本季河口採樣皆於退潮期間進行樣品採集，河口採樣潮位高低如圖2.6-1，監測點位置參見圖1.4-1，監測記錄如附錄四所示，相關水體環境基準表如表2.6-1與表2.6-2所示。收集114年10月15日當日潮汐資料，潮差為大潮，根據潮位資料估算流向，計畫區附近海域退潮時流向偏北，漲潮時流向偏南。

評估河川水質之綜合性指標為「河川污染指數, River Pollution Index」簡稱「RPI」。河川污染程度分類表如表2.6-3所示，101年01月04日公告之「底泥品質指標之分類管理及用途限制辦法」之底泥品質指標如表2.6-4所示。河口水質監測成果、本季河川污染指數彙整表、底泥監測成果彙整於表2.6-5、表2.6-6及表2.6-8。

河口水質調查部分，參考桃園河川水質監測網及台灣電力公司環境資訊網站之檢測結果，彙整如表2.6-7所示。底泥調查部分，進一步參考環境部底泥品質檢測資訊公開網，查詢附近河口底泥之檢測結果，彙整如表2.6-9所示，本監測計畫河口水體主管機關為桃園市政府，管理單位為桃園市政府水務局，採樣日期為107年11月27～29日、110年10月27～28日、111年04月08日及113年03月28～29日，此為本工程案施工前及施工中之檢測數據。另因小飯壢溪屬戊類水體，故無監測數據。本季關於各河口水質及底泥調查結果，茲分別說明如下：

一、大堀溪河口

水體水質監測結果如**表 2.6-5** 所示，各檢測測項符合丁類水質標準，BOD_5/COD 比值為 0.09。本季大堀溪河口水質 RPI 污染程度屬中度污染。

底泥監測結果如**表 2.6-8** 所示，銅 126.0 mg/kg、鋅 351 mg/kg 及鎳 37.2 mg/kg 介於底泥品質指標下限值和上限值之間，其餘測項合底泥品質指標下限值。

由 113 年桃園市政府河口底泥檢測結果可知，桃園市政府大堀溪河口底泥銅濃度 325 mg/kg、鋅濃度 699 mg/kg 及鎳濃度 91.6 mg/kg，超過底泥品質指標上限值，鎘濃度 0.78 mg/kg 及鉻濃度 154 mg/kg 介於底泥品質指標下限值和上限值間，其餘符合底泥品質指標下限值，113 年桃園市政府河口底泥與本監測計畫濃度相比，銅、鋅、鎳、鎘及鉻金屬濃度較高，其餘測項則趨

勢相同。

二、觀音溪河口

水體水質監測結果如**表 2.6-5** 所示，大腸桿菌群 75,000 CFU/100mL，氨氮 3.40 mg/L，不符合丙類水質標準，BOD_5/COD 比值為 0.08。本季觀音溪河口水質 RPI 污染程度屬未(稍)受污染。

底泥監測結果如**表 2.6-8** 所示，鎳 30.1 mg/kg 及砷 17.80 mg/kg 介於底泥品質指標下限值和上限值之間，其餘測項符合底泥品質指標下限值。

由 113 年桃園市政府河口底泥檢測結果可知，觀音溪底泥銅濃度 51.3 mg/kg、鋅濃度 289 mg/kg 和鎳濃度 26.8 mg/kg，濃度介於底泥品質指標下限值和上限值間。其餘金屬則符合底泥品質指標下限值，113 年桃園市政府河口底泥與本監測計畫濃度相比，銅及鋅金屬濃度較高，而本計畫砷金屬則高於桃園市政府河口底泥檢測結果，其餘測項則趨勢相同。

三、小飯壢溪河口

水體水質監測結果如**表 2.6-5** 所示，各檢測測項符合戊類水質標準，BOD_5/COD 比值為 0.03。本季小飯壢溪河口水質 RPI 污染程度屬未(稍)受污染。

底泥監測結果如**表 2.6-8** 所示，鋅 179 mg/kg 介於底泥品質指標下限值和上限值之間，其餘測項符合底泥品質指標下限值。

四、新屋溪河口

水體水質監測結果如**表 2.6-5** 所示，氨氮 2.14 mg/L，不符合丙類水質標準，BOD_5/COD 比值為 0.02。本季新屋溪河口水質 RPI 污染程度屬輕度污染。

底泥監測結果如**表 2.6-8** 所示，銅 72.8 mg/kg 及鎳 30.8 mg/kg 介於底泥品質指標下限值和上限值之間，其餘測項符合底泥品質指標下限值。

由 113 年桃園市政府河口底泥檢測結果可知，新屋溪河口底泥銅濃度 124 mg/k、鋅濃度 197 mg/kg 介於底泥品質指標下限值和上限值間。鎳金屬本監測計畫檢測數據較桃園市政府河口底泥檢測結果高，而其餘測項則趨勢相同。

五、社子溪河口

水體水質監測結果如**表 2.6-5** 所示，大腸桿菌群 62,000 CFU/100mL，氨氮 3.22 mg/L，不符合丙類水質標準，BOD_5/COD 比值為 0.03。本季社子溪河口水質 RPI 污染程度屬中度污染。

底泥監測結果如**表 2.6-8** 所示，銅 52.0 mg/kg 介於底泥品質指標下限值和上限值之間，其餘測項符合底泥品質指標下限值。

由 113 年桃園市政府河口底泥檢測結果可知，社子溪河口鋅濃度 431 mg/kg，超過底泥品質指標上限值，銅濃度 139 mg/kg、鎳濃度 40.6 mg/kg 及汞濃度 0.301 mg/kg，濃度介於底泥品質指標下限值和上限值間。鋅、鎳及汞金屬檢測數據較本監測計畫濃度高，而其餘測項則趨勢相同。

除上述所敘，各河口測站檢測數據則皆符合地面水體分類及水質標準之「保護人體健康相關環境基準」。

本次調查結果顯示河口點位其主要為大腸桿菌群及氨氮等測項超過所屬標準，其污染項目與生活污水關聯較大，故其水質現況與上游污染源有關聯。參考「107年桃園市河川流域污染整治綜合管理計畫」期末報告，各河川之污染型態說明如下:大堀溪是以生活污水為主之污染型態,BOD 點源污染排放所占比例(%)為:生活污水86.0％、事業廢水13.9％、畜牧廢水0.1％；觀音溪是以生活污水為主之污染型態，BOD 點源污染排放所占比例(%)為:生活污水95.2％、事業廢水4.8％、畜牧廢水0 ％；新屋溪是以生活污水為主事業廢水集中之污染型態，BOD點源污染排放所占比例(%)為:生活污水78.8％、事業廢水20.7％、畜牧廢水0.5％；社子溪是以生活污水為主事業廢水集中之污染型態，BOD 點源污染排放所占比例(%)為:生活污水83.3％、事業廢水16.5％、畜牧廢水0.2％。且測站關鍵水質項目同為BOD及氨氮。根據彙整114年度桃園河川水質監測網及台灣電力公司環境資訊網站之各河口水質資料，彙整如**表2.6-7**所示，結果顯示生化需氧量、氨氮及大腸桿菌群等測項易超過所屬標準，除生化需氧量其餘彙整結果與本計畫監測結果相符。

而若以生化需氧量(BOD_5)和化學需氧量(COD)之比值進行探討，則代表為水質中有機物之生物可分解性，一般可將$BOD_5/COD \geqq 0.3$時，判斷為有機物為可生物分解，隨著比值愈高則可生物分解性愈高。而當$BOD_5/COD<0.3$時，水中有機物則較難被生物分解，隨著比值愈低則可生物分解性愈低。本季大堀溪及小飯壢溪符合水質標準。BOD_5/COD比值大堀溪0.09、觀音溪口0.08、小飯壢溪0.03、新屋溪口0.02及社子溪口0.03，屬於微生物難分解之有機物，此類有機物多為人工合成，如含有支鏈的化合物、清潔劑中常見之烷基苯磺酸鈉、染料、化學藥劑、多環芳香烴。該有機物容易在環境及生物體中累積，造成環境污染，對生物則可能具致癌性、致畸性、致突變性、生殖毒性及免疫毒性等。

而底泥調查部分，各河口之底泥亦有不同金屬濃度分佈底泥品質指標下限值和上限值之間，應為上游工業廢水貢獻而累積於底泥中，後續將持續觀察其底泥濃度的變異；桃園市政府調查點位與本計畫案點位雖不相同，但挑選各河川近河口點位進行比較結果顯示，桃園市政府河口底泥監測結果底泥銅、鋅曾超過底泥品質指標上限值，底泥鎘、銅、鋅、鎳及汞在部分河川點位不符合底泥品質指標下限值有受污染之跡象，底泥鉛跟砷皆符合底泥品質指標下限值。本監測計畫底泥中銅、鋅及鎳有較明顯受污染之狀況與桃園市政府監測結果分布趨勢大致相符，而砷金屬在觀音溪河口有受污染之跡象，其餘皆符合底泥品質指標下限值。




圖 2.6-1 114 年第 4 季河口採樣潮位高低圖

表2.6-1 陸域地面水體保護生活環境相關環境基準

分級	基準值						
	氫離子濃度指數(pH)	溶氧量(DO) (mg/L)	生化需氧量(BOD) (mg/L)	大腸桿菌群(CFU/100mL)	懸浮固體(SS) (mg/L)	氨氮(NH_3-N) (mg/L)	總磷(TP) (mg/L)
甲	6.5-8.5	6.5 以上	1 以下	50 個以下	25 以下	0.1 以下	0.02 以下
乙	6.5-9.0	5.5 以上	2 以下	5,000 個以下	25 以下	0.3 以下	0.05 以下
丙	6.5-9.0	4.5 以上	4 以下	10,000 個以下	40 以下	0.3 以下	—
丁	6.0-9.0	3 以上	8 以下	—	100 以下	—	—
戊	6.0-9.0	2 以上	10 以下	—	無漂浮物且無油污	—	—

依據:中華民國 106 年 9 月 13 日行政院環境保護署環署水字 1060071140 號令修正發布第 5 條條文及第 3 條附表一。

表2.6-2 地面水體保護人體健康相關環境基準

水質項目		基準值(單位：mg/L)
重金屬	鎘	0.005
	鉛	0.01
	六價鉻	0.05
	砷	0.05
	汞	0.001
	硒	0.01
	銅	0.03
	鋅	0.5
	錳	0.05
	銀	0.05
	鎳	0.1
無機鹽	氰化物	0.05
農藥	有機磷劑（巴拉松、大利松、達馬松、亞素靈、一品松、陶斯松）及氨基甲酸鹽（滅必蝨、加保扶、納乃得）之總量	0.1
	安特靈	0.0002
	靈丹	0.004
	毒殺芬	0.005
	安殺番	0.003
	飛佈達及其衍生物	0.001
	滴滴涕及其衍生物	0.001
	阿特靈、地特靈	0.003
	除草劑(丁基拉草、巴拉刈、2、4-地)	0.1
其他物質	酚	0.05

依據:中華民國 106 年 9 月 13 日行政院環境保護署環署水字 1060071140 號令修正發 布第 5 條條文及第 3 條附表二。

表2.6-3 RPI之計算及比對基準

水質/項目	未(稍)受污染	輕度污染	中度污染	嚴重污染
溶氧量 (DO)mg/L	DO≧6.5	6.5＞DO≧4.6	4.5≧DO≧2.0	DO＜2.0
生化需氧量 (BOD_5)mg/L	BOD_5≦3.0	3.0＜BOD_5≦4.9	5.0≦BOD_5≦15.0	BOD_5＞15.0
懸浮固體 (SS)mg/L	SS≦20.0	20.0＜SS≦49.9	50.0≦SS≦100	SS＞100
氨氮 (NH_3-N)mg/L	NH_3-N≦0.50	0.50＜NH_3-N≦0.99	1.00≦NH_3-N≦3.00	NH_3-N＞3.00
點數	1	3	6	10
污染指數積分值(S)	S≦2.0	2.0＜S≦3.0	3.1≦S≦6.0	S＞6.0

註:本表依 102 年 5 月 30 日環署水字第 1020045468 號函「河川污染指數(RPI)基準值及計算方式修正」研商會議結論，自 102 年起參考國家環境研究院公告「檢測報告位數表示規定」，調整計算 RPI 公式。

表2.6-4 底泥品質指標

項目	底泥品質指標	
參數	下限值	上限值
砷(mg/kg)	11	33
鎘(mg/kg)	0.65	2.49
鉻(mg/kg)	76	233
銅(mg/kg)	50	157
鉛(mg/kg)	48	161
汞(mg/kg)	0.23	0.87
鎳(mg/kg)	24	80
鋅(mg/kg)	140	384

依據:中華民國 101 年 1 月 4 日行政院環境保護署環署土字第 1,000116349 號令訂定發布第四條-底泥品質指標項目及其上、下限值規定。

表2.6-5 本季河口水質監測結果分析表(1/2)

監測地點	日 期/採樣時間		潮時/潮高(厘米)	透明度(m)	水溫(℃)	鹽度(psu)	酸鹼值(pH)	DO(mg/L)	DO(%)	BOD_5(mg/L)	油脂(mg/L)	SS(mg/L)	導電度(μmho/cm)	正磷酸鹽(mg/L)	硝酸鹽(mg/L)	總磷(mg/L)	氨氮(mg/L)	硝酸鹽氮(mg/L)	大腸桿菌群(CFU/100mL)
114年方法偵測極限			—	—	—	—	—	—	—	0.1	0.5	2.5	—	0.0078	0.035	0.0042	0.024	0.008	10
施工階段	大堀溪口	114 年 4 季(退潮) 114.10.15/08:13 (農曆:08 月 22 日)	05:01 /95 H 11:41 /-105 L 8:26 /124 H	0.67	28.0	0.4	7.1	5.4	69.5	4.1	2.4	15.1	888	0.480	16.40	0.530	10.60	3.71	4,300
	觀音溪口	114 年 4 季(退潮) 114.10.15/09:03 (農曆:08 月 22 日)	05:01 /95 H 11:41 /-105 L 8:26 /124 H	0.59	28.4	0.3	7.3	5.4	62.7	2.0	2.9	6.6	539	0.484	2.11	0.519	**3.40***	0.48	**75,000***
	小飯壢溪口	114 年 4 季(退潮) 114.10.15/10:02 (農曆:08 月 22 日)	05:01 /95 H 11:41 /-105 L 8:26 /124 H	0.62	27.3	3.1	7.4	6.2	78.2	1.0	2.9	10.6	5700	0.223	8.09	0.210	0.07	1.83	4,200
	新屋溪口	114 年 4 季(退潮) 114.10.15/11:02 (農曆:08 月 22 日)	05:01 /95 H 11:41 /-105 L 8:26 /124 H	0.66	31.2	4.0	7.5	5.6	72.9	0.9	1.3	14.1	7370	0.435	17.10	0.497	**2.14***	3.88	600
	社子溪口	114 年 4 季(退潮) 114.10.15/11:59 (農曆:08 月 22 日)	05:01 /95 H 11:41 /-105 L 8:26 /124 H	0.44	31.4	3.8	7.9	6.5	88.0	1.9	3.9	8.7	6960	1.200	5.70	1.160	**3.22***	1.29	**62,000***
丙類陸域地面水體水質標準 (觀音溪口、新屋溪口、社子溪口)				—	—	—	6.0-9.0	4.5 以上	—	4	—	40	—	—	—	—	0.3	—	10,000
丁類陸域地面水體水質標準(大堀溪口)				—	—	—	6.0-9.0	3 以上	—	8	—	100	—	—	—	—	—	—	—
戊類陸域地面水體水質標準(小飯壢溪口)				—	—	—	6.0-9.0	2 以上	—	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—

註：1.〝—〞為該階段並無進行該項目之監測。

2. 表示方式為 ND，則表示該點位測值低於方法偵測極限，若實測值介於方法偵測極限(MDL)和定量偵測極限(QDL)之間，表示方式為<QDL(實測值)。

3. 〝*〞為檢測值超出所屬地面水體水質標準標準值。

4. 依據 NIEA W436 方法檢測硝酸鹽氮濃度，而硝酸鹽濃度為硝酸鹽氮濃度乘以 4.43 換算而得。

5. 潮汐狀態參考中央氣象署海象測報中心-竹圍測站，潮高：以當地當年中等潮位為基準。此外，漲退潮狀況標註係依據實際採樣時間對應相對潮位時間。

6. 生化需氧量原分析方法為 W510.55B，114 年 10 月 15 日起方法更新為 W510.56B，故偵測極限更新為 0.1 mg/L。

表2.6-5 本季河口水質監測結果分析表(2/2)

監測地點	日 期/採樣時間		潮時/潮高(厘米)	葉綠素a(μg/L)	矽酸鹽(mg/L)	鎘(mg/L)	銅(mg/L)	六價鉻(mg/L)	鎳(mg/L)	總汞(汞)(mg/L)	鉛(mg/L)	鋅(mg/L)	鐵(mg/L)	砷(mg/L)	氰化物(mg/L)	酚類(mg/L)	陰離子界面活性劑(mg/L)	化學需氧量(mg/L)
114年方法偵測極限			—	0.5	0.0815	0.000068	0.000564	0.008	0.00016	0.00017	0.000069	0.001039	0.000722	—	—	0.00094	—	3.7
施工階段	大堀溪口	114 年 4 季(退潮) 114.10.15/08:13 (農曆:08 月 24 日)	05:01 /95 H 11:41 /-105 L 8:26 /124 H	23.8	15.6	ND	0.00405	ND	0.00452	ND	0.00062	0.01710	0.485	-	-	ND	-	43.2
	觀音溪口	114 年 4 季(退潮) 114.10. 15/09:03 (農曆:08 月 22 日)	05:01 /95 H 11:41 /-105 L 8:26 /124 H	5.6	18.9	ND	<0.00200	ND	0.00170	ND	0.00041	0.01100	0.492	-	-	ND	-	26.1
	小飯壢溪口	114 年 4 季(退潮) 114.10.15/10:02 (農曆:08 月 22 日)	05:01 /95 H 11:41 /-105 L 8:26 /124 H	7.0	16.9	ND	0.01660	ND	0.00576	ND	0.00086	0.02740	0.678	-	-	ND	-	34.3
	新屋溪口	114 年 4 季(退潮) 114.10.15/11:02 (農曆:08 月 22 日)	05:01 /95 H 11:41 /-105 L 8:26 /124 H	5.5	12.7	ND	0.01910	ND	0.02250	ND	0.00083	0.00885	0.858	-	-	ND	-	40.8
	社子溪口	114 年 4 季(退潮) 114.10.15/11:59 (農曆:08 月 22 日)	05:01 /95 H 11:41 /-105 L 8:26 /124 H	6.0	22.7	ND	0.00282	ND	0.00540	ND	0.00098	0.01230	0.809	-	-	ND	-	62.8
地面水體及水質標準附表二保護人類健康相關環境基準			—	—	—	0.005	0.03	—	0.1	0.001	0.01	0.5	—	0.05	0.05	0.05	—	—

註：1.〝—〞為該階段並無進行該項目之監測。

2. 表示方式為 ND，則表示該點位測值低於方法偵測極限，若實測值介於方法偵測極限(MDL)和定量真測極限(QDL)之間，表示方式為<QDL(實測值)。

3. 〝＊〞為檢測值超出所屬地面水體水質標準標準值。

4. 依據 NIEA W436 方法檢測硝酸鹽氮濃度，而硝酸鹽濃度為硝酸鹽氮濃度乘以 4.43 換算而得。

5. 葉綠素：指分析葉綠素 a 濃度，依據國家環境研究院方法 NIEA E508 方法檢測。

6. 潮汐狀態參考中央氣象署海象測報中心-竹圍測站，潮高：以當地當年中等潮位為基準。此外，漲退潮狀況標註係依據實際採樣時間對應相對潮位時間。

7. "總汞"為依據地面水體分類及水質標準之項目名稱，包含水域的有機汞化合物及無機汞化合物。

表2.6-6 本季河口水質河川污染指數彙整表

監測地點		日 期	DO (mg/L)	BOD_5 (mg/L)	SS (mg/L)	氨氮 (mg/L)	污染指數積分值	污染程度
施工階段	大堀溪口	114 年第 4 季 (114.10.15)	5.4	4.1	15.1	10.60	4.25	中度污染
	觀音溪口		5.4	2.0	6.6	3.40*	3.75	未(稍)受污染
	小飯壢溪口		6.2	1.0	10.6	0.07	1.00	未(稍)受污染
	新屋溪口		5.6	0.9	14.1	2.14*	2.75	輕度污染
	社子溪口		6.5	1.9	8.7	3.22*	3.25	中度污染

註：〝*〞為檢測值超出所屬地面水體水質標準標準值。

表2.6-7 桃園市河口水質監測結果分析表(1/2)

監測地點	日期/採樣時間		水溫 (°C)	酸鹼值 (pH)	DO (mg/L)	BOD_5 (mg/L)	SS (mg/L)	導電度 (μmho/cm)	總磷 (mg/L)	氨氮 (mg/L)	大腸桿菌群 (CFU/100mL)
施工階段	大堀溪口	114 年 1~3 季 (上游：富練橋)	19.1~29.8	7.4~7.7	5.5~6.8	1.1~11.6*	7.2~35.0	0.110~1.05	354~850	0.09~6.24	3,100~39,000
		114 年 1~3 季 (下游：新大堀溪橋)	20.1~29.7	7.7~8.0	8.0~9.6	1.8~9.1*	10.2~35.8	0.486~1.42	580~1040	2.78~13.6	1,000~4,000
	觀音溪口	114 年 1~3 季 (上游：觀音十號橋)	19.3~30.9	7.6~7.9	8.4~10.4	<1.0~4.7*	3.6~13.8	0.076~0.52	275~348	0.07~0.47*	3,300~14,000*
		114 年 1~3 季 (下游：白沙岬人行拱橋)	19.5~29.8	7.2~7.3	7.0~7.2	1.8~2.1	11.3~12.8	0.279~0.536	340~460	1.44*~3.40*	25,000*~51,000*
	小飯壢溪口	114 年 1~2 季	15.1~24.8	6.9~7.8	5.0~9.0	1.4~2.7	8.0~94.2	0.141~0.694	451~1,490	0.38~3.21	15,000~73,000
	新屋溪口	114 年 1~3 季 (上游：桃 87 無名橋)	17.5~31.6	7.2~7.5	4.3*~6.6	6.1*~12.7*	16.2~28.7	0.282~1.93	304~577	0.19~8.97*	19,000*~47,000*
		114 年 1~3 季 (下游：保興橋)	19.0~30.4	7.3~7.5	6.5~7.4	1.6~5.5*	12.2~21.0	0.54~1.71	110~1,570	1.65*~10.40*	4,600~33,000*
	社子溪口	114 年 1~3 季 (上游：星平橋)	16.4~33.0	7.6~7.7	6.8~7.3	4.3*~5.3*	6.0~10.5	0.762~0.930	311~397	1.40*~5.88*	42,000*~85,000*
		114 年 1~3 季 (下游：榛榔橋)	15.3~32	7.4~8.2	7.5~8.4	1.0~2.7	5.4~10.3	0.572~0.931	407~772	0.39*~2.20*	70~4,800
丙類陸域地面水體水質標準(觀音溪口、新屋溪口、社子溪口)			—	6.0-9.0	4.5 以上	4	40	—	—	0.3	10,000
丁類陸域地面水體水質標準(大堀溪口)			—	6.0-9.0	3 以上	8	100	—	—	—	—
戊類陸域地面水體水質標準(小飯壢溪口)			—	6.0-9.0	2 以上	10	—	—	—	—	—

註：1.〝—〞為該階段並無進行該項目之監測。

2.桃園市河川水質監測結果摘錄自桃園河川水質監測網 https://www.tydep.gov.tw/TYDEP/Static/river/index.html

3.台灣電力公司-大潭燃氣火力發電計畫營運期間環境監測 https://www.taipower.com.tw/tc/download.aspx?mid=220

表2.6-7 桃園市河口水質監測結果分析表(2/2)

監測地點	日期/採樣時間		鎘 (mg/L)	銅 (mg/L)	鎳 (mg/L)	鉛 (mg/L)	鋅 (mg/L)	化學需氧量 (mg/L)
施工階段	大堀溪口	114 年 1~3 季 (上游：富練橋)	ND<0.001	ND<0.005	ND<0.004	ND<0.0026~<0.008	<0.020~0.024	15.7~80.2
		114 年 1~3 季 (下游：新大堀溪橋)	ND<0.001	ND<0.005~<0.020	ND<0.004~<0.020	ND<0.0026~<0.008	<0.020~0.031	25.7~47.6
	觀音溪口	114 年 1~3 季 (上游：觀音十號橋)	ND<0.001	ND<0.005	ND<0.004	ND<0.0026~<0.008	<0.020~0.027	<10.0~31.4
		114 年 1~3 季 (下游：白沙岬人行拱橋)	ND<0.001	ND<0.005	ND<0.004	ND<0.0026~<0.008	0.025~0.062	18.1~23.9
	小飯壢溪口	114 年 1~2 季	ND<0.001	0.003~0.014	-	ND~<0.005	0.016~0.042	-
	新屋溪口	114 年 1~3 季 (上游：桃 87 無名橋)	ND<0.001	ND<0.005~<0.020	ND<0.004	ND<0.0026	<0.020~0.028	30.6~56.0
		114 年 1~3 季 (下游：保興橋)	ND<0.001	0.022~0.044*	<0.020~0.021	ND<0.0026~<0.008	<0.020~0.03	22.1~33.6
	社子溪口	114 年 1~3 季 (上游：星平橋)	ND<0.001	ND<0.005~<0.020	ND<0.004	ND<0.0026~<0.008	<0.020~0.022	26.3~27.8
		114 年 1~3 季 (下游：糠榔橋)	ND<0.001	<0.020	ND<0.004~<0.020	ND<0.0026~<0.008	<0.020~0.033	18.2~23.6
地面水體及水質標準附表二保護人類健康相關環境基準			0.005	0.03	0.1	0.01	0.5	–

註：1.〝—〞為該階段並無進行該項目之監測。

2.桃園市河川水質監測結果摘錄自桃園河川水質監測網 https://www.tydep.gov.tw/TYDEP/Static/river/index.html

3.台灣電力公司-大潭燃氣火力發電計畫營運期間環境監測 https://www.taipower.com.tw/tc/download.aspx?mid=220

表2.6-8 本季河口底泥監測結果分析表

監測地點		日 期	鉛 (mg/kg)	鎘 (mg/kg)	鉻 (mg/kg)	銅 (mg/kg)	鋅 (mg/kg)	鎳 (mg/kg)	砷 (mg/kg)	汞 (mg/kg)
114 年方法偵測極限			0.703	0.128	0.677	0.666	3.57	0.677	0.3287	0.0296
施工階段	大堀溪口	114 年第 4 季 (114.10.15)	25.0	<0.40	42.5	**126.0***	**351***	**37.2***	5.29	0.113
	觀音溪口		18.4	<0.40	20.5	30.2	136	**30.1***	**17.80***	ND<0.0296
	小飯壢溪口		10.4	<0.40	30.6	20.4	**179***	21.1	4.98	<0.100
	新屋溪口		19.7	<0.40	30.6	**72.8***	122	**30.8***	10.90	<0.100
	社子溪口		22.5	<0.40	22.1	**52.0***	137	22.4	5.64	<0.100
底泥品質指標下限值			48	0.65	76	50	140	24	11	0.23
底泥品質指標上限值			161	2.49	233	157	384	80	33	0.87

註：1. 〝—〞為復工前階段並無進行該項目之監測。
2. 表示方式為 ND，則表示該點位測值低於方法偵測極限。
3. 表示方式為<數值(實測值)，則表示該數值為檢量線第一點，該實測值為低於檢量線第一點但高於方法偵測極限。
4. 〝*〞為檢測值超出底泥品質指標下限值，〝**〞為檢測值超出底泥品質指標上限值。

表2.6-9 桃園市政府河口底泥監測結果分析表

監測河川	監測點位	日 期	鉛 (mg/kg)	鎘 (mg/kg)	鉻 (mg/kg)	銅 (mg/kg)	鋅 (mg/kg)	鎳 (mg/kg)	砷 (mg/kg)	汞 (mg/kg)
大堀溪	新大堀溪橋	107.11.27	26.8	ND	60.3	**143.0***	**336***	**42.1***	4.24	ND
		110.10.28	33.1	**1.26***	57.9	**152***	**306***	**50.1***	6.28	**0.290***
		113.03.28	40.5	**0.78***	**154***	**325****	**699****	**91.6****	6.5	<2.00
觀音溪	白沙岬人行拱橋	107.11.28	37.7	ND	27.4	**66.1***	**228***	21.6	4.21	ND
		110.10.27	30.8	**1.68***	64.6	36.5	**203***	**51.8***	4.30	<0.189
	下庄子橋	113.03.29	26.9	<5.0	41.8	**51.3***	**289***	**26.8***	4.95	<0.200
新屋溪	台 61 橋	107.11.29	29.3	ND	37.2	**439****	**251***	**29.3***	8.88	ND
		111.04.08	35.8	<0.642	33.2	**659****	**286***	**79.3***	7.86	**0.427***
		113.10.09	25.4	<0.50	35.1	**124***	**197***	22.5	5.91	0.221
社子溪	笨子港橋	107.11.29	42.7	ND	**105.0***	**88.0***	**383***	**53.8***	5.74	**0.257***
		111.04.08	32.6	ND	21.9	**182****	**285***	**35.6***	3.78	<0.207
		113.10.09	37.2	ND	44.8	**139***	**431****	**40.6***	5.75	**0.301***
底泥品質指標下限值			48	0.65	76	50	140	24	11	0.23
底泥品質指標上限值			161	2.49	233	157	384	80	33	0.87

註：1.監測資料於 114 年 3 月 20 日查詢「底泥品質檢測資訊公開網」。
2. 表示方式為 ND，則表示該點位測值低於方法偵測極限。
3. 〝*〞為檢測值超出底泥品質指標下限值，〝**〞為檢測值超出底泥品質指標上限值。

2.7 海域水質和底泥

114年10月13日執行114年度進行15個測站海域水質及底泥採樣工作，天氣為晴，海況良好，浪高約0.3 m至0.4 m左右，當日由上午09:30開始進行採樣，執行採樣至下午19:00，共執行15站次之水質和底泥採樣工作。監測點位置參見圖1.4-1，監測記錄如附錄四所示，相關海域環境分類及海洋品質標準如表2.7-1所示。海域水質及底泥監測成果彙整於表2.7-2～3，成果以海域水質A(海水深度10 m)、B(海水深度15 m)、C(海水深度30 m)為表、中和底層顯示，底泥監測結果因無監測標準故茲分別敘述如下。

一、大堀溪出海口測線

海域水質監測成果如**表 2.7-2** 所示，大堀溪出海口各項監測值皆符合乙類海域海洋環境品質標準之相關測項。底泥監測結果如**表 2.7-4** 所示。

二、觀音溪出海口測線

海域水質監測成果如**表 2.7-2** 所示，觀音溪出海口各項監測值皆符合乙類海域海洋環境品質標準之相關測項。底泥監測結果如**表 2.7-4** 所示。

三、小飯壢溪出海口測線

海域水質監測成果如**表 2.7-2** 所示，小飯壢溪出海口各項監測符合乙類海域海洋環境品質標準之相關測項。底泥監測結果如**表 2.7-4** 所示。

四、新屋溪出海口測線


海域水質監測成果如**表 2.7-2** 所示，新屋溪出海口各項監測符合乙類海域海洋環境品質標準之相關測項。底泥監測結果如**表 2.7-4** 所示。

五、社子溪出海口測線

海域水質監測成果如**表 2.7-2** 所示，社子溪出海口各項監測符合乙類海域海洋環境品質標準之相關測項。底泥監測結果如**表 2.7-4** 所示。

表2.7-1 海域環境分類及海洋品質標準

水體標準 / 水質項目	甲類	乙類	丙類
氫離子濃度指數	7.5-8.5	7.5-8.5	7.0-8.5
溶氧量(mg/L)	5.0 以上	5.0 以上	2.0 以上
生化需氧量(mg/L)	2 以下	3 以下	6 以下
大腸桿菌群(CFU/100 ml)	1,000 個以下	–	–
礦物性油脂(mg/L)	2.0	2.0	–
酚類(mg/L)	0.005	0.005	0.005
鎘(μg/L)	5	5	5
鉛(μg/L)	10	10	10
六價鉻(μg/L)	50	50	50
砷(μg/L)	50	50	50
汞(μg/L)	1	1	1
硒(μg/L)	10	10	10
銅(μg/L)	30	30	30
鋅(μg/L)	500	500	500
鎳(μg/L)	100	100	100

海域範圍		水體分類
鼻頭角向彭佳嶼延伸至高屏溪口向琉球嶼延伸線間海域		甲
高屏溪口向琉球嶼延伸至曾文溪口向西延伸線間海域		乙
曾文溪口向西延伸線至王功漁港向西延伸線間海域		甲
王功漁港向西延伸線至鼻頭角向彭佳嶼延伸線間海域		乙
澎湖群島海域		甲

備註：在右列之一海域水體內之河川、區域排水出海口或廢水管線排放口出口半徑二公里之範圍內之水體得列為次一級之水體。

1. 依據:中華民國 107 年 2 月 13 日行政院環境保護署環署水字第 1070012375 號令修正發布「海域環境分類及海洋環境品質標準」。
2. 依據台灣地區沿海海域範圍及海域分類，本計畫調查範圍為桃園市海域，位於王功漁港向西延伸線至鼻頭角向彭佳嶼延伸線間海域，故適用於乙類海域海洋環境品質標準。

表2.7-2 本季海域水質監測結果分析表(1/3)

監測項目	偵測極限	大堀溪出海口測線									觀音溪出海口測線									乙類海域海洋環境品質標準
		1A (海水深度 10 m)			1B (海水深度 15 m)			1C (海水深度 30 m)			2A (海水深度 10 m)			2B (海水深度 15 m)			2C (海水深度 30 m)			
		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	
採樣日期(時間)	—	114/10/13 (15:05) 農曆 08 月 22 日			114/10/13 (14:37) 農曆 08 月 22 日			114/10/13 (14:05) 農曆 08 月 22 日			114/10/13 (15:29) 農曆 08 月 22 日			114/10/13 (15:56) 農曆 08 月 22 日			114/10/13 (13:17) 農曆 08 月 22 日			—
潮時/潮高(厘米)	—	潮時: 02:23/潮高：150 H；潮時: 09:00/潮高: -140L；潮時: 15:41/潮高: 157 H；潮時: 21:53/潮高: -44 L																		
透明度(m)	—	0.5	-	-	0.5	-	-	2.0	-	-	1.5	-	-	2.0	-	-	0.5	-	-	—
水溫 (℃)	—	29.6	29.6	29.6	29.5	29.5	29.4	29.4	29.2	29.1	29.8	29.8	29.8	29.6	29.6	29.5	29.7	29.6	29.5	—
鹽度 (psu)	—	31.69	31.62	32.05	31.64	31.87	32.21	31.51	31.52	31.86	31.75	31.40	31.75	31.56	31.50	31.51	31.60	31.39	32.41	—
酸鹼值(pH)	—	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	7.5-8.5
溶氧(mg/L)	—	6.98	6.97	6.99	6.92	6.91	6.85	6.66	6.62	6.65	7.45	7.35	7.42	6.90	6.76	6.80	6.82	6.78	6.82	5.0
溶氧(%)	—	91.3	90.9	91.7	88.6	88.1	86.3	87.9	87.3	87.8	99.8	98.3	99.4	92.1	90.0	90.8	91.1	89.8	91.7	—
油脂(mg/L)	0.5	1.6	<0.5	1.7	1.5	<0.5	1.1	1.1	1.4	1.8	1.9	1.7	1.9	0.6	1.9	<0.5	1.8	1.2	1.9	2.0 (礦物性油脂)
正磷酸鹽(mg/L)	0.0078	0.021	0.027	0.028	0.026	0.029	0.028	0.027	0.023	0.027	0.026	0.027	0.024	0.021	0.023	0.029	0.021	0.025	0.024	—
硝酸鹽(mg/L)	0.035	0.220	0.180	0.220	<0.13	<0.13	<0.13	<0.13	<0.13	<0.13	0.150	<0.13	<0.13	<0.13	ND	<0.13	<0.13	ND	<0.13	—
酚類(mg/L)	0.00094	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
矽酸鹽(mg/L)	0.0815	0.454	0.483	0.469	0.422	0.568	0.576	0.437	0.347	0.378	0.315	0.561	0.400	0.446	0.333	0.353	0.335	0.261	0.360	—
葉綠素 a(μg / L)	0.5	1.0	0.9	0.5	0.8	1.0	0.9	1.4	0.8	1.1	1.6	1.2	1.3	0.9	0.6	0.5	0.6	0.5	0.7	—
鋅(μg/L)	0.1	0.8	0.6	1.4	0.8	7.0	14.8	1.0	0.9	1.2	0.5	0.6	0.6	9.6	0.8	1.2	0.9	2.1	9.7	30.0
銅(μg/L)	0.03	0.3	0.3	0.4	0.2	0.3	0.7	0.3	0.2	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	1.9	30.0
鉛(μg/L)	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	<0.2	ND	ND	0.4	ND	<0.2	ND	ND	<0.2	ND	ND	<0.2	ND	10.0
鎘(μg/L)	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.0
汞(μg/L)	0.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
鎳(μg/L)	0.03	0.2	0.2	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	<0.1	50
六價鉻(μg/L)	8.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	50
鐵(μg/L)	0.1	8.2	6.1	6.8	5.9	5.8	7.4	4.9	7.7	6.6	4.2	4.9	1.8	2.6	2.4	1.9	1.4	1.7	2.3	—
懸浮固體(mg/L)	2.5	8.9	11.0	12.6	14.2	17.8	21.5	7.8	10.2	22.1	9.1	6.6	9.8	9.3	13.4	13.2	6.4	6.9	17.0	—
生化需氧量(mg/L)	0.1	0.8	<0.1	<0.1	<0.1	0.5	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	3

註: 1.表示方式為 ND，則表示該點位測值低於方法偵測極限，表示方式為<數值(實測值)，則表示該數值為檢量線第一點，該實測值為低於檢量線第一點但高於方法偵測極限。2.潮汐狀態參考中央氣象署海象測報中心-竹圍測站，潮高：以當地當年中等潮位為基準。3.葉綠素：指分析葉綠素 a 濃度，依據國家環境研究院方法 NIEA E508 方法檢測。4.生化需氧量原分析方法為 W510.55B，114 年 10 月 15 日起方法更新為 W510.56B，故偵測極限更新為 0.1 mg/L。

表2.7-2 本季海域水質監測結果分析表(2/3)

監測項目	偵測極限	小飯壢溪出海口測線									新屋溪出海口測線									乙類海域海洋環境品質標準
		3A (海水深度 10 m)			3B (海水深度 15 m)			3C (海水深度 30 m)			4A (海水深度 10 m)			4B (海水深度 15 m)			4C (海水深度 30 m)			
		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	
採樣日期(時間)	—	114/10/13 (17:02) 農曆 08 月 22 日			114/10/13 (16:34) 農曆 08 月 22 日			114/10/13 (12:35) 農曆 08 月 22 日			114/10/13 (17:59) 農曆 08 月 22 日			114/10/13 (17:37) 農曆 08 月 22 日			114/10/13 (11:57) 農曆 08 月 22 日			—
潮時/潮高(厘米)	—	潮時: 02:23/潮高：150 H；潮時: 09:00/潮高: -140L；潮時: 15:41/潮高: 157 H；潮時: 21:53/潮高: -44 L																		
透明度(m)	—	0.5	-	-	1.0	-	-	2.0	-	-	1.0	-	-	1.0	-	-	2.0	-	-	—
水溫 (℃)	—	29.8	29.7	29.6	29.8	29.5	29.5	29.3	29.2	29.1	29.8	29.7	29.7	29.8	29.8	29.7	29.4	29.4	29.3	—
鹽度 (psu)	—	31.88	31.73	31.93	31.88	31.80	32.12	31.79	31.90	31.99	31.86	31.65	.32.13	32.02	32.12	32.20	31.55	31.69	31.86	—
酸鹼值(pH)	—	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	7.5-8.5
溶氧(mg/L)	—	6.93	7.05	6.86	6.93	6.91	6.94	6.86	6.89	6.90	6.84	6.82	6.87	6.95	6.97	6.90	6.11	6.13	6.14	5.0
溶氧(%)	—	93.5	93.9	91.2	93.7	90.3	91.5	91.1	91.4	91.8	90.9	89.5	90.8	92.1	91.9	91.6	92.5	93.4	95.2	—
油脂(mg/L)	0.5	1.3	0.8	1.1	1.6	<0.5	0.9	0.9	1.4	0.6	1.2	0.8	1.9	1.3	1.7	0.9	1.5	1.2	0.6	2.0 (礦物性油脂)
正磷酸鹽(mg/L)	0.0078	0.024	<0.020	0.020	0.022	0.036	0.024	0.023	0.025	0.026	0.028	0.027	<0.020	0.032	0.022	0.022	0.029	0.024	0.024	—
硝酸鹽(mg/L)	0.035	<0.13	<0.13	<0.13	ND	<0.13	<0.13	<0.13	<0.13	<0.13	ND	ND	ND	<0.13	<0.13	ND	<0.13	<0.13	ND	—
酚類(mg/L)	0.00094	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
矽酸鹽(mg/L)	0.0815	0.513	0.419	0.408	0.386	0.505	0.435	0.481	0.365	0.530	0.376	0.372	0.367	0.367	0.416	0.433	0.410	0.372	0.452	—
葉綠素 a (μg / L)	0.5	1.2	1.6	1.3	1.0	1.7	0.6	0.8	1.4	1.0	0.9	0.8	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	—
鋅(μg/L)	0.1	2.1	1.6	1.8	2.8	1.8	2.0	2.3	1.0	1.4	1.3	1.9	1.2	2.5	1.8	1.3	2.0	1.7	1.5	30.0
銅(μg/L)	0.03	0.3	0.2	0.4	0.2	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	1.9	0.3	0.2	30.0
鉛(μg/L)	0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	<0.2	ND	ND	10.0
鎘(μg/L)	0.03	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.0
汞(μg/L)	0.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
鎳(μg/L)	0.03	<0.1	ND	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	50
六價鉻(μg/L)	8.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	50
鐵(μg/L)	0.1	1.3	1.6	1.4	2.2	1.2	1.3	1.1	1.4	1.2	1.2	1.2	15.3	16.1	15.2	6.0	14.5	13.8	3.0	—
懸浮固體(mg/L)	2.5	8.4	9.8	9.0	8.2	7.5	7.8	9.2	10.7	20.2	8.9	9.2	9.0	8.4	10.1	15.1	9.7	13.2	16.2	—
生化需氧量(mg/L)	0.1	<0.1	0.10	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	3

註: 1.表示方式為 ND，則表示該點位測值低於方法偵測極限，表示方式為<數值(實測值)，則表示該數值為檢量線第一點，該實測值為低於檢量線第一點但高於方法偵測極限。2.潮汐狀態參考中央氣象署海象測報中心-竹圍測站，潮高：以當地當年中等潮位為基準。3.葉綠素：指分析葉綠素 a 濃度，依據國家環境研究院方法 NIEA E508 方法檢測。4.生化需氧量原分析方法為 W510.55B，114 年 10 月 15 日起方法更新為 W510.56B，故偵測極限更新為 0.1 mg/L。

表2.7-2 本季海域水質監測結果分析表(3/3)

監測項目	偵測極限	社子溪出海口測線									乙類海域水質標準
		5A (海水深度 10 m)			5B (海水深度 15 m)			5C (海水深度 30 m)			
		表層	中層	底層	表層	中層	底層	表層	中層	底層	
採樣日期(時間)	—	114/10/13 (10:18) 農曆 08 月 22 日			114/10/13 (10:46) 農曆 08 月 22 日			114/10/13 (11:15) 農曆 08 月 22 日			—
潮時/潮高(厘米)	—	潮時: 02:23/潮高：150 H；潮時: 09:00/潮高: -140L；潮時: 15:41/潮高: 157 H；潮時: 21:53/潮高: -44 L									
透明度(m)	—	1.5	-	-	1.5	-	-	2.0	-	-	—
水溫 (℃)	—	29.4	29.4	29.4	29.5	29.5	29.4	29.4	29.4	29.3	—
鹽度 (psu)	—	31.66	31.88	31.73	31.85	32.39	32.15	31.42	31.53	31.88	—
酸鹼值(pH)	—	8.1	8.2	8.3	8.2	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	7.5-8.5
溶氧(mg/L)	—	6.34	6.32	6.39	6.06	6.57	6.53	6.82	6.86	6.92	5.0
溶氧(%)	—	95.0	95.2	96.8	91.3	93.7	96.9	90.3	90.0	91.8	—
油脂(mg/L)	0.5	0.8	1.2	1.1	1.4	1.7	0.9	1.3	0.7	1.1	2.0 (礦物性油脂)
正磷酸鹽(mg/L)	0.0078	0.027	0.026	0.039	0.040	0.023	0.027	<0.020	0.023	0.028	—
硝酸鹽(mg/L)	0.035	<0.13	<0.13	<0.13	ND	ND	<0.13	ND	<0.13	<0.13	—
酚類(mg/L)	0.00094	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	0.005
矽酸鹽(mg/L)	0.0815	0.317	0.419	0.463	0.287	0.373	0.452	0.319	0.283	0.503	—
葉綠素 a (μg / L)	0.5	1.3	1.3	1.4	1.3	0.8	0.6	0.8	1.2	0.8	—
鋅(μg/L)	0.1	1.4	1.9	1.2	1.2	1.2	1.4	1.5	2.0	1.9	30.0
銅(μg/L)	0.03	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	30.0
鉛(μg/L)	0.1	1.0	ND	ND	ND	ND	ND	<0.2	<0.2	ND	10.0
鎘(μg/L)	0.03	ND	ND	<0.1	ND	ND	ND	ND	ND	ND	5.0
汞(μg/L)	0.17	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	1.0
鎳(μg/L)	0.03	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	50
六價鉻(μg/L)	8.0	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	50
鐵(μg/L)	0.1	2.2	4.3	2.9	2.5	1.9	10.0	5.7	4.6	2.3	—
懸浮固體(mg/L)	2.5	9.9	11.2	8.6	10.4	7.8	15.8	7.0	12.8	16.4	—
生化需氧量(mg/L)	0.1	<0.1	0.50	0.30	<0.1	0.50	0.40	0.40	0.50	0.40	3

註: 1.表示方式為 ND，則表示該點位測值低於方法偵測極限，表示方式為<數值(實測值)，則表示該數值為檢量線第一點，該實測值為低於檢量線第一點但高於方法偵測極限。2.潮汐狀態參考中央氣象署海象測報中心-竹圍測站，潮高：以當地當年中等潮位為基準。3.葉綠素：指分析葉綠素 a 濃度，依據國家環境研究院方法 NIEA E508 方法檢測。4.生化需氧量原分析方法為 W510.55B，114 年 10 月 15 日起方法更新為 W510.56B，故偵測極限更新為 0.1 mg/L。

表2.7-3 本季海域底泥增測監測結果分析表

監測地點		日 期	鉛 (mg/kg)	鎘 (mg/kg)	鉻 (mg/kg)	銅 (mg/kg)	鋅 (mg/kg)	鎳 (mg/kg)	砷 (mg/kg)	汞 (mg/kg)
114年方法偵測極限			0.703	0.128	0.677	0.666	3.57	0.677	0.3287	0.0296
大堀溪出海口測線	1A (海水深度 10 m)	114/10/13	24.8	1.22	19.1	7.68	82.6	23.2	47.0	ND
	1B (海水深度 15 m)	114/10/13	26.6	1.47	19.9	7.05	84.9	24.5	49.7	ND
	1C (海水深度 30 m)	114/10/13	28.2	1.62	20.7	11.1	91.2	24.5	48.7	ND
觀音溪出海口測線	2A (海水深度 10 m)	114/10/13	24.9	1.22	20.5	8.48	87.9	23.6	41.0	ND
	2B (海水深度 15 m)	114/10/13	20.6	0.63	19.7	11.6	88.5	21.8	27.2	ND
	2C (海水深度 30 m)	114/10/13	25.2	1.33	19.3	6.15	81.3	23.2	48.6	ND
小飯壢溪出海口測線	3A (海水深度 10 m)	114/10/13	24.7	1.27	19.4	6.77	83.1	23.9	41.1	ND
	3B (海水深度 15 m)	114/10/13	23.4	1.29	18.9	6.96	81.5	22.7	46.0	ND
	3C (海水深度 30 m)	114/10/13	32.4	1.85	20.9	10.6	91.3	25.4	57.2	ND
新屋溪出海口測線	4A (海水深度 10 m)	114/10/13	22.3	0.85	20.3	10.4	90.8	22.5	36.2	ND
	4B (海水深度 15 m)	114/10/13	26.3	1.27	20.0	10.3	88.4	23.8	41.3	ND
	4C (海水深度 30 m)	114/10/13	19.6	0.51	20.7	13.1	89.7	21.6	19.9	ND
社子溪出海口測線	5A (海水深度 10 m)	114/10/13	19.1	0.44	20.8	13.0	92.2	21.8	16.6	ND
	5B (海水深度 15 m)	114/10/13	17.6	0.43	19.5	12.3	89.8	21.2	15.7	ND
	5C (海水深度 30 m)	114/10/13	21.6	0.55	22.9	16.8	96.2	23.4	18.7	ND

註: 1. 表示方式為 ND，則表示該點位測值低於方法偵測極限。

2. 表示方式為<數值(實測值)，則表示該數值為檢量線第一點，該實測值為低於檢量線第一點但高於方法偵測極限。

2.8 海域生態

2.8.1 浮游植物

海域生態調查時間為 114 年 10 月 13 日，當天 7:00 出港，約 16:00 回港，浪高約 0.3 至 0.4 公尺，風速約 2 至 8 節；調查期間海域並無觀察到異常狀況。

114年第4季調查於10月採樣完成，海域浮游植物於五條測線15測站三個深度共45個樣品所採得之結果如**表2.8.1-1**所示，樣品中共計發現矽藻32種、矽質鞭毛藻3種、渦鞭毛藻2種、及裸藻1種，總計發現38種以上，豐度介於8,000至101,200 cells/L之間(**表2.8.1-1**)。其中矽藻豐度佔了總豐度近99%、其他藻合佔約1%以上。浮游植物平均豐度為31,964 ±19,399 cells/L，以5C表層數量最豐，為101,200 cells/L，而以3C表層最低，為8,000 cells/L，高低相差13倍(**圖2.8.1-1**)。參考歷季紀錄比較變化範圍後，此結果落於歷季變化範圍內，與近十一季（111年Q4-114Q3）相似。

優勢藻種以矽藻之海鏈藻屬百分比最高，佔了總豐度32%以上(**圖2.8.1-2**)；其他藻屬如矽藻之角毛藻屬及盒形藻屬，也佔了總豐度17%以上(**圖2.8.1-2**)。在各測站發現的種類介於5至17種之間(**表2.8.1-1**、**圖2.8.1-1**)。

114年第4季(114年10月)之各測站各水層之浮游植物種數豐度指數介於0.39-1.51之間；均勻度指數介於0.54-0.90之間；種歧異度指數介於1.08-2.51之間，此三指數數值普遍較高；而優勢度指數則介於0.10-0.47之間，所有樣品數值小於0.50，主要是本季並無極端優勢藻種，數量在各藻種間分佈相當均勻，因此樣品指數沒有極端值(**表2.8.1-1**)。

浮游植物群集在各測站間的相似程度方面顯示，大堀溪測線與觀音溪測線各樣品，以及新屋溪測線與社子溪測線各樣品之間相似度較高，多在60%以上，而與其他樣品之相似度多低於50% (**表2.8.1-2**、**圖2.8.1-3**)。約有1/3測站之間相似度在60%或以上(**表2.8.1-2**、**圖2.8.1-3**)。根據多維尺度分析（MDS）結果顯示，各樣品之浮游植物群集組成整體相似，未呈現明顯分群結構(**圖2.8.1-3**、**圖2.8.1-4**)。樣品間雖有部分聚集現象，但各樣品在二維空間中的分布仍相對分散，表示其群集相似度中等，差異不具顯著區隔。由各測線垂直水層（表層、中層、底層）樣品觀察，水層間分布亦無明顯規律，顯示水體垂直方向上浮游植物群聚差異不大。整體而言，樣品間的相似性高於測線或水層差異所造成的變化，代表此區域浮游植物群聚組成受區域性環境條件控制，且各測線間水體交換或混合作用可能使群聚趨於均質化。

第四季海域各測站之浮游植物豐度與水質因子相關分析顯示，浮游植物豐度

與懸浮固體及鎳濃度有顯著正相關（$p<0.05$），但與其他有測量的因子沒有顯著相關（$p>0.05$）**(表2.8.1-3)**。以線性回歸分析本季海域之浮游植物豐度與Chl a 相關性之分析圖顯示，兩者之間沒有顯著相關（$p>0.05$）**(圖2.8.1-5)**。

從本季所採得樣品分析，海域五條測線15測站三個深度共45個樣品所採穫之浮游植物豐度高低差別約13倍。五條測線間浮游植物豐度有顯著差異（ANOVA, $F = 4.331, p = 0.005$），社子溪測線浮游植物豐度顯著較其他測線豐度高。各測站所發現種類相似,但各樣品優勢種百分比有所不同。所發現的藻類大多具有廣溫、廣鹽的適應性，分布範圍廣泛，種類也相當多樣，在台灣近海普遍可見。其中，以矽藻中的海鏈藻屬（**圖2.8.1-6**）、角毛藻屬及盒形藻屬最常成為優勢種，本季的調查結果亦顯示相同的現象。

表2.8.1-1　　本季海域各測站之浮游植物統計表(1/2)

測站	1A			1B			1C			2A			2B			2C			3A			3B			3C		
深度	表	中	底	表	中	底	表	中	底	表	中	底	表	中	底	表	中	底	表	中	底	表	中	底	表	中	底
Heterokontophyta 異鞭毛藻門, Bacillariophyceae 矽藻綱																											
Achnanthes spp. (曲殼藻)	0	800	1200	0	1200	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0
Amphiprora spp. (鞘形藻屬)	800	0	0	0	0	0	400	400	0	2000	0	0	0	400	400	400	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
Amphora spp. (雙眉藻屬)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	400	0	0	0	0	0	0
Asterionella spp. (星桿藻屬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bacteriastrum spp. (輻桿藻屬)	0	0	0	0	0	0	0	1200	2000	0	0	0	0	0	0	10800	4400	3600	0	0	2000	0	0	0	0	0	0
Biddulphia spp. (盒形藻屬)	0	2000	800	800	800	1200	0	4800	4000	800	0	2400	2800	800	2000	0	3600	400	2000	4400	400	3600	5600	8000	800	3200	1600
Chaetoceros spp. (角毛藻屬)	0	12000	9200	6000	4400	10000	0	8400	7600	6000	8800	6000	0	6800	10000	0	3600	3600	16000	14400	24800	6000	11200	8000	0	4800	12000
Cocconeis spp. (卵形藻屬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Coscinodiscus spp. (圓篩藻屬)	1200	800	1200	4000	1600	2000	800	400	0	3200	0	800	1600	2400	0	1200	0	0	3200	1200	2800	3600	400	800	1200	400	0
Cyclotella spp. (小環藻屬)	2400	6000	3200	2400	800	1200	1200	0	400	2000	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dictylum spp. 雙針藻屬	2000	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diploneis fusca (淡褐雙壁藻)	400	0	0	400	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Diploneis splendica 華麗雙壁藻	0	400	0	800	0	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	400	400	0	0	0	0	0	0
Eucampia spp. (彎角藻屬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	1200	0	1200	0	0	1200	2000	0	0	0	0	0	0
Fragilaria spp. (脆杆藻屬)	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gomphonema spp. (異極藻屬)	400	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gyrosigma spp. (布紋藻)	400	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Licmophora spp. (楔形藻屬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	400	0	0	0	1200	0	400	0	400	400
Mastogloia spp. (胸隔藻屬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Navicula spp. (舟形藻屬)	800	800	1200	400	1200	800	800	1200	2000	1200	1200	1200	800	1200	1200	0	1200	800	0	400	800	800	400	0	0	800	400
Nitzschia paradoxa 奇異菱形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4800	0	0	1600	0	0	0	0	0
Nitzschia sigma 彎菱形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nitzschia spp. (菱形藻屬)	2000	2000	2400	1600	800	1200	800	1200	1200	1600	400	800	0	1200	800	0	800	800	0	2000	4000	800	0	0	800	800	800
Pinnularia spp. 羽紋藻屬	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pleurosigma spp. 斜紋藻屬	800	0	0	400	0	400	0	0	0	400	0	0	0	400	400	0	0	400	400	0	0	0	0	0	400	0	0
Rhizosolenia spp. (根管藻屬)	2400	400	800	400	1200	1600	800	400	800	1200	400	400	0	800	1200	400	0	800	0	800	800	400	0	400	0	400	0
Stephanopyxis spp. (冠蓋藻屬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Surirella spp. (雙菱藻)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Synedra spp. (針桿藻屬)	800	400	0	2000	0	400	1200	400	400	3200	400	800	1600	1200	800	1200	800	1200	800	400	0	2000	400	800	800	400	800
Tabellaria spp. (平板藻屬)	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Thalassionema spp. (海線藻屬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3200	0	0	1600	0	0	0	0	0
Thalassiosira spp. (海鏈藻屬)	4400	38000	20000	12800	21200	7200	9200	16000	7200	3600	10000	14400	4000	8800	8800	5200	7600	4400	3200	6000	20000	3200	2400	2000	4000	1600	2000
Heterokontophyta 異鞭毛藻門, Dictyochophyceae 矽質鞭毛藻																											
Dictyocha fibula (四角網骨藻)	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ebria spp. 裂碎藻屬	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	400	400	0	0	0
Mesocena polymorpha 多型中空藻	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400	0
Dinophyta 渦鞭毛藻門																											
Prorocentrum spp. (原甲藻屬)	0	400	0	0	0	0	800	0	0	0	400	0	400	0	0	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0
Protoperidinium spp. (原多甲藻屬)	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0
Euglenophyta 裸藻門																											
Trachelomonas spp. 囊裸藻屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
總豐度 (cells/L)	21200	64400	40000	33200	34000	27200	16800	36800	25600	27600	23600	28000	11600	24800	27600	21200	23200	18000	35600	32000	58800	24800	21200	20800	8000	13200	18000
種類數目 (種)	16	13	9	14	11	12	11	15	9	15	10	10	7	12	12	10	8	12	11	12	12	11	8	8	6	10	7
種數豐度指數(Species Richness Index, SR)	1.51	1.08	0.75	1.25	0.96	1.08	1.03	1.33	0.79	1.37	0.89	0.88	0.64	1.09	1.08	0.90	0.70	1.12	0.95	1.06	1.00	0.99	0.70	0.70	0.56	0.95	0.61
均勻度指數(Evenness Index, J')	0.90	0.54	0.70	0.75	0.59	0.76	0.71	0.66	0.81	0.89	0.63	0.67	0.86	0.75	0.72	0.66	0.86	0.85	0.75	0.70	0.62	0.90	0.63	0.69	0.82	0.80	0.60
種歧異度指數(Shannon Diversity Index, H') (base 10)	2.51	1.38	1.53	1.97	1.43	1.88	1.70	1.78	1.79	2.41	1.45	1.55	1.67	1.88	1.78	1.51	1.80	2.10	1.80	1.73	1.54	2.16	1.31	1.44	1.47	1.84	1.18
優勢度指數(Dominance Index, C)	0.10	0.39	0.32	0.21	0.41	0.22	0.32	0.26	0.21	0.11	0.33	0.32	0.22	0.22	0.25	0.33	0.20	0.16	0.25	0.26	0.30	0.14	0.36	0.31	0.31	0.22	0.47

註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

表2.8.1-1　　本季海域各測站之浮游植物統計表(2/2)

測站	4A			4B			4C			5A			5B			5C			平均	標準偏差	百分比
深度	表	中	底	表	中	底	表	中	底	表	中	底	表	中	底	表	中	底			
Heterokontophyta異鞭毛藻門, Bacillariophyceae矽藻綱																					
Achnanthes spp. (曲殼藻)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	169	386	0.53
Amphiprora spp. (繭形藻屬)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	800	400	0	400	0	0	0	400	0	187	378	0.58
Amphora spp. (雙眉藻屬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	175	0.14
Asterionella spp. (星桿藻屬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	179	0.08
Bacteriastrum spp. (輻桿藻屬)	0	0	0	0	0	0	10400	0	0	12000	2000	6000	4800	6400	0	14000	2000	1600	1849	3578	5.78
Biddulphia spp. (盒形藻屬)	7200	4800	5600	15200	7600	8800	7200	8000	4400	27600	5200	14400	22000	12800	6800	15200	7600	9200	5476	5927	17.13
Chaetoceros spp. (角毛藻屬)	0	8800	12800	8000	12000	10000	0	400	7200	6000	6400	8400	0	12000	10000	8000	6000	9200	7218	5085	22.58
Cocconeis spp. (卵形藻屬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	101	0.08
Coscinodiscus spp. (圓篩藻屬)	1600	0	400	1200	800	0	1600	800	400	400	400	0	1200	800	0	800	0	0	1004	1047	3.14
Cyclotella spp. (小環藻屬)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3600	0	0	560	1228	1.75
Dictylum spp. 雙針藻屬	0	400	0	800	0	0	0	400	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	107	345	0.33
Diploneis fusca (淡褐雙壁藻)	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	62	170	0.19
Diploneis splendica 華麗雙壁藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	89	207	0.28
Eucampia spp. (彎角藻屬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	428	0.44
Fragilaria spp. (脆杆藻屬)	0	0	0	0	0	0	1600	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	98	321	0.31
Gomphonema spp. (異極藻屬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	36	115	0.11
Gyrosigma spp. (布紋藻)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	83	0.06
Licmophora spp. (楔形藻屬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71	214	0.22
Mastogloia spp. (胸隔藻屬)	800	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	132	0.08
Navicula spp. (舟形藻屬)	800	800	0	800	0	400	400	800	800	800	400	800	400	800	0	1200	400	400	702	444	2.20
Nitzschia paradoxa 奇異菱形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142	749	0.44
Nitzschia sigma 彎菱形藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	119	0.06
Nitzschia spp. (菱形藻屬)	800	800	0	800	0	0	0	800	0	400	0	800	0	0	800	400	0	0	764	813	2.39
Pinnularia spp. 羽紋藻屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	27	132	0.08
Pleurosigma spp. 斜紋藻屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	800	400	800	0	0	0	0	142	244	0.44
Rhizosolenia spp. (根管藻屬)	1200	400	800	800	800	400	3200	1200	800	2800	400	800	0	800	400	4000	400	0	800	844	2.50
Stephanopyxi s spp. (冠蓋藻屬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12400	2000	0	0	0	0	320	1866	1.00
Surirella spp. (雙菱藻)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	27	132	0.08
Synedra spp. (針桿藻屬)	0	400	0	400	400	800	800	400	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	604	658	1.89
Tabellaria spp. (平板藻屬)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	119	0.06
Thalassionema spp. (海線藻屬)	8800	0	0	800	0	0	0	0	0	2400	1200	2000	0	2000	0	2400	0	0	542	1497	1.70
Thalassiosira spp. (海鏈藻屬)	6000	6400	7200	1600	0	6000	14800	2400	1600	41600	4800	16000	4400	13200	4400	48400	4000	32000	10267	10936	32.12
Heterokontophyta異鞭毛藻門, Dictyochophyceae 矽質鞭毛藻																					
Dictyocha fibula (四角網骨藻)	0	400	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	53	138	0.17
Ebria spp. 裂碎藻屬	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	400	62	147	0.19
Mesocena polymorpha 多型中空藻	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	44	127	0.14
Dinophyta渦鞭毛藻門																					
Prorocentrum spp. (原甲藻屬)	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	98	244	0.31
Protoperidinium spp. (原多甲藻屬)	1200	0	0	1200	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	800	0	0	107	288	0.33
Euglenophyta裸藻門																					
Trachelomonas spp. 囊裸藻屬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	0	18	119	0.06
總豐度(cells/L)	32000	23200	26800	31600	22000	26400	40400	15600	16000	99600	21600	50400	46400	51600	22400	101200	21200	52800	31964	19399	100.00
種類數目(種)	13	9	5	11	6	6	9	10	7	17	10	10	9	10	5	15	8	6	38		
種數豐度指數(Species Richness Index, SR)	1.16	0.80	0.39	0.97	0.50	0.49	0.75	0.93	0.62	1.39	0.90	0.83	0.74	0.83	0.40	1.21	0.70	0.46			
均勻度指數(Evenness Index, J')	0.81	0.71	0.75	0.68	0.61	0.73	0.75	0.72	0.76	0.60	0.78	0.74	0.65	0.78	0.77	0.63	0.75	0.61			
種歧異度指數(Shannon Diversity Index, H') (base 10)	2.08	1.56	1.20	1.62	1.08	1.30	1.65	1.66	1.49	1.69	1.79	1.70	1.42	1.80	1.23	1.72	1.56	1.09			
優勢度指數(Dominance Index, C)	0.17	0.27	0.35	0.30	0.42	0.31	0.24	0.30	0.30	0.27	0.21	0.23	0.32	0.20	0.33	0.28	0.25	0.43			

註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

表2.8.1-2　　本季海域浮游植物各測站之相似度三角矩陣

	1A 表	1A 中	1A 底	1B 表	1B 中	1B 底	1C 表	1C 中	1C 底	2A 表	2A 中	2A 底	2B 表	2B 中	2B 底	2C 表	2C 中	2C 底	3A 表	3A 中	3A 底	3B 表	3B 中	3B 底	3C 表	3C 中	3C 底	4A 表	4A 中	4A 底	4B 表	4B 中	4B 底	4C 表	4C 中	4C 底	5A 表	5A 中	5A 底	5B 表	5B 中	5B 底	5C 表	5C 中	5C 底
1A 表																																												
1A 中	26.17																																											
1A 底	37.91	72.80																																										
1B 表	45.59	53.28	69.95																																									
1B 中	33.33	62.60	84.32	65.48																																								
1B 底	46.28	53.28	69.05	67.55	60.13																																						
1C 表	56.84	34.48	47.89	57.60	51.97	54.55																																					
1C 中	30.34	60.87	76.04	66.29	70.06	66.25	47.76																																				
1C 底	34.19	44.44	58.54	57.14	52.35	74.24	49.06	74.36																																			
2A 表	54.10	35.65	50.89	67.11	46.75	64.23	45.05	44.72	54.14																																		
2A 中	33.93	51.82	69.18	66.20	61.11	75.59	63.37	68.87	71.54	51.56																																	
2A 底	32.52	55.41	71.76	74.51	73.55	63.77	57.14	80.25	68.66	51.80	71.32																																
2B 表	43.90	22.11	26.36	37.50	31.58	41.24	50.70	34.71	43.01	44.90	31.82	44.44																															
2B 中	43.48	44.84	64.20	74.48	62.59	78.46	65.38	67.53	73.02	68.70	74.38	75.76	46.15																														
2B 底	36.07	50.43	63.91	60.53	57.14	80.29	55.86	69.57	75.19	55.07	78.13	74.82	38.78	79.39																													
2C 表	33.96	18.69	23.53	32.35	26.09	33.06	44.21	30.34	34.19	27.87	28.57	30.89	41.46	38.26	27.87																												
2C 中	30.63	34.70	44.30	49.65	48.95	55.56	50.00	61.33	77.05	42.52	56.41	67.19	48.28	61.67	67.72	46.85																											
2C 底	40.82	27.18	37.24	45.31	41.54	51.33	45.98	43.80	60.55	50.88	50.00	48.70	43.24	57.94	54.39	48.98	69.90																										
3A 表	25.35	37.60	39.15	41.86	29.89	56.05	19.85	41.99	43.14	48.10	41.89	40.25	32.20	49.01	53.16	21.13	32.65	31.34																									
3A 中	34.59	51.45	56.67	52.76	43.64	72.97	39.34	65.12	70.83	49.66	60.43	60.00	42.20	63.38	72.48	30.08	57.97	43.20	62.72																							
3A 底	24.00	60.39	71.26	53.91	62.93	53.95	32.80	61.92	47.39	37.04	49.51	56.22	19.32	50.72	52.78	24.00	40.00	33.33	49.15	59.03																						
3B 表	31.30	32.29	40.74	59.31	40.82	56.92	34.62	50.65	60.32	65.65	46.28	57.58	54.95	62.90	54.96	26.09	53.33	50.47	60.93	56.34	34.45																					
3B 中	16.98	39.25	43.14	38.24	33.33	61.16	18.95	57.93	63.25	42.62	55.36	48.78	39.02	48.70	63.93	15.09	46.85	36.73	57.75	72.18	37.00	57.39																				
3B 底	19.05	31.92	39.47	40.00	32.12	53.33	21.28	55.56	62.07	44.63	48.65	50.82	39.51	50.88	57.85	19.05	45.45	39.18	48.23	60.61	29.15	61.40	80.00																			
3C 表	49.32	18.78	28.33	38.83	32.38	43.18	51.61	28.57	35.71	42.70	30.38	40.00	69.39	48.78	38.20	41.10	41.03	49.23	29.36	36.00	19.16	41.46	27.40	30.56																		
3C 中	25.58	28.87	36.09	41.38	38.98	51.49	29.33	51.20	61.86	49.02	45.65	56.31	48.39	54.74	54.90	16.28	57.14	53.85	37.70	54.87	25.56	67.37	62.79	65.88	37.74																	
3C 底	20.41	41.75	45.52	42.19	32.31	65.49	22.99	49.64	58.72	47.37	57.69	50.43	32.43	54.21	70.18	14.29	44.66	46.67	61.19	68.80	40.63	56.07	79.59	65.98	33.85	64.10																
4A 表	39.10	24.90	31.11	34.36	37.58	41.89	47.54	40.70	44.44	34.90	33.09	37.33	44.04	39.44	37.58	28.57	40.58	28.80	31.95	43.75	22.91	42.25	34.59	39.39	34.00	31.86	19.20															
4A 中	32.43	45.66	56.96	53.90	47.55	74.60	44.00	74.67	83.61	50.39	75.21	67.19	45.98	68.33	77.17	27.03	67.24	54.37	48.98	76.81	42.93	63.33	75.68	70.91	38.46	65.93	67.96	46.38													
4A 底	23.33	48.25	55.09	49.33	44.74	72.59	38.53	66.67	74.81	42.65	65.08	59.85	37.50	62.02	73.53	25.00	57.60	41.07	58.97	82.99	50.47	52.71	81.67	68.91	29.89	52.00	69.64	43.54	81.60												
4B 表	24.24	30.83	39.11	35.80	32.93	50.34	21.49	51.46	55.94	41.89	43.48	44.30	31.48	46.81	48.65	13.64	39.42	33.87	41.67	55.35	30.09	55.32	63.64	73.28	24.24	55.36	51.61	45.28	62.77	56.16											
4B 中	9.26	36.11	37.42	30.43	25.71	53.66	10.31	48.98	53.78	35.48	42.11	40.00	23.81	41.03	54.84	7.41	33.63	26.00	52.78	68.15	34.65	47.86	83.33	82.24	13.33	52.27	70.00	32.59	63.72	77.05	65.67										
4B 底	25.21	42.29	50.60	48.32	39.74	68.66	35.19	64.56	72.31	44.44	64.00	58.82	42.11	59.38	72.59	26.89	58.06	45.05	51.61	73.97	40.38	56.25	78.99	81.36	32.56	54.55	66.67	47.95	83.87	82.71	67.59	76.03									
4C 表	33.77	35.88	44.78	45.65	50.54	36.69	41.96	58.03	44.85	25.88	35.00	56.14	38.46	40.49	38.82	58.44	52.83	35.62	20.00	36.46	40.32	30.67	29.87	36.60	28.10	23.88	16.44	46.41	38.99	41.67	32.22	29.49	44.31								
4C 中	36.96	21.00	24.46	26.23	29.03	37.38	37.04	41.22	46.60	35.19	26.53	38.53	52.94	35.64	37.04	21.74	43.30	38.10	23.44	43.70	17.20	47.52	52.17	65.93	44.07	55.56	33.33	55.46	55.67	45.28	59.32	53.19	57.14	44.29							
4C 底	23.66	31.84	41.43	42.28	35.20	57.41	26.83	57.58	71.15	51.38	52.53	56.36	46.38	58.82	60.55	17.20	53.06	47.06	46.51	63.33	29.95	66.67	77.42	80.43	30.00	79.45	68.24	33.33	75.51	67.29	65.55	69.47	69.81	29.79	55.70						
5A 表	19.21	60.00	43.55	32.53	46.11	29.65	21.99	46.33	33.87	23.90	29.87	38.87	15.83	30.23	31.45	29.80	33.22	24.49	23.08	28.57	39.39	26.37	25.17	27.91	11.15	20.57	17.69	30.40	31.27	31.65	41.46	24.34	34.29	52.57	24.31	24.22					
5A 中	28.04	33.49	42.86	46.72	40.29	55.74	33.33	65.75	76.27	48.78	53.10	58.06	45.78	60.34	58.54	37.38	64.29	56.57	47.55	64.18	36.82	65.52	69.16	67.92	35.14	64.37	52.53	47.76	75.00	71.07	57.14	56.88	71.67	42.58	49.46	72.34	34.32				
5A 底	21.23	49.48	61.06	51.67	56.87	50.52	34.52	74.31	61.05	33.85	54.05	63.27	24.52	51.06	57.44	32.40	56.52	43.27	37.21	50.49	53.48	43.62	48.04	52.81	20.55	36.48	38.60	42.72	58.70	56.99	66.34	47.51	62.50	64.32	40.00	44.58	62.40	56.67			
5B 表	21.30	13.72	15.74	19.10	16.92	20.65	20.25	28.85	30.00	18.38	13.71	21.51	28.97	21.35	20.54	31.95	36.78	28.57	17.56	26.53	15.97	23.60	26.04	32.14	23.53	18.79	12.42	35.71	27.59	28.42	47.18	24.56	37.36	41.47	37.42	21.79	44.93	37.65	50.41			
5B 中	20.88	50.34	55.90	50.94	48.60	53.81	33.92	66.06	58.03	33.33	53.19	59.30	26.58	50.26	57.58	35.16	53.48	40.23	46.79	58.37	54.35	42.93	54.95	53.04	20.13	34.57	45.98	42.11	56.68	66.33	61.54	57.61	65.64	62.61	39.29	44.97	56.61	56.83	87.84	52.24		
5B 底	25.69	40.55	50.00	44.60	38.30	67.74	28.57	63.51	71.67	46.40	60.87	55.56	40.00	55.93	70.40	22.02	54.39	47.52	52.41	73.53	39.41	59.32	82.57	79.63	36.84	60.67	71.29	45.59	84.21	82.93	65.19	77.48	88.52	36.94	56.84	70.83	29.51	74.55	57.14	32.56	58.38	
5C 表	18.95	65.70	49.86	36.31	46.15	33.64	22.37	47.54	37.22	25.47	34.62	39.63	14.89	31.11	33.54	28.76	33.44	23.49	23.98	31.83	42.00	26.67	28.10	31.48	10.99	20.28	20.81	30.63	33.44	34.38	43.98	27.92	36.99	51.98	23.97	25.94	81.67	33.88	63.85	34.69	58.64	32.36
5C 中	24.53	30.84	37.91	42.65	36.23	49.59	27.37	59.31	71.79	47.54	50.00	53.66	43.90	52.17	54.10	32.08	61.26	57.14	40.85	57.14	33.00	59.13	67.92	76.19	32.88	60.47	51.02	46.62	72.07	66.67	60.61	64.81	77.31	45.45	63.04	68.82	34.44	85.98	56.98	42.60	56.04	78.90
5C 底	12.97	74.40	65.52	46.51	62.67	45.00	27.59	68.75	53.06	26.87	50.26	57.43	22.36	43.30	51.74	18.38	44.21	29.38	32.58	47.17	56.63	34.02	48.65	50.00	15.79	30.30	37.29	32.08	53.68	55.28	45.50	45.99	61.62	51.50	32.75	39.53	64.57	49.46	69.77	31.45	64.37	54.26


註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

表2.8.1-3　　本季海域各測站之浮游植物與水質因子相關分析

水質因子	相關係數	*p* 值
透明度	-0.463	0.078
溫度	-0.027	0.862
鹽度	0.072	0.643
pH	-0.017	0.912
DO	-0.037	0.810
油脂	-0.154	0.339
懸浮固體	0.319	0.035*
正磷酸鹽	0.015	0.924
硝酸鹽	0.632	0.333
矽酸鹽	0.192	0.211
葉綠素 a	0.094	0.540
銅	-0.056	0.715
鋅	-0.224	0.143
鎳	0.445	0.049*
鐵	0.255	0.095

註：Spearman correlation analysis。顯著 * $p < 0.05$。



註 1：1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2：A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

圖 2.8.1-1　　本季海域各測站之浮游植物種類及數量分布圖






圖 2.8.1-2　　本季海域各類浮游植物優勢大類數量百分比



註 1：1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。
註 2：A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

圖 2.8.1-3　　本季海域浮游植物之群集分析圖



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。
註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

圖 2.8.1-4　　本季海域浮游植物 MDS 圖




圖 2.8.1-5　　本季海域各測站浮游植物豐度與葉綠素 a 濃度散布圖

海鏈藻屬(*Thalassiosira*)


圖 2.8.1-6　　本季海域浮游植物優勢物種

2.8.2 浮游動物

海域生態調查時間為114年10月13日，當天7:00出港，約16:00回港，浪高約0.3至0.4公尺，風速約2至8節；調查期間海域並無觀察到異常狀況。

本季(114年10月)海域浮游動物之平均豐度為106,038 ± 9,197 ind./1,000 m^3，平均發現大類數18 ± 1種，平均豐富度指數1.501 ± 0.100，平均均勻度指數0.617 ± 0.008，平均種歧異度指數1.788 ± 0.020，平均優勢度指數0.281 ± 0.007（**表2.8.2-1**）。浮游動物類群組成方面（**表2.8.2-1**、**圖2.8.2-1**），本季之第一優勢類群為哲水蚤（Calanoida），平均豐度為51,679 ± 4,881 ind./1,000 m^3，佔總豐度的48.74%；第二優勢類群為劍水蚤（Cyclopoida），平均豐度為16,806 ± 1,369 ind./1,000m^3，佔總豐度的15.85%；第三優勢類群為藤壺幼生（Barnacle nauplius），平均豐度為8,038 ± 852 ind./1,000 m^3，佔總豐度的7.58%；第四優勢類群為猛水蚤（Harpacticoida），平均豐度為6,799 ± 666 ind./1,000 m^3，佔總豐度的6.41%；第五優勢類群為蝦類幼生（Shrimp larva），平均豐度為5,848 ± 754 ind./1,000 m^3，佔總豐度的5.51%；第六優勢類群為橈足類幼生（Copepoda nauplius），平均豐度為3,318 ± 397 ind./1,000 m^3，佔總豐度的3.13%。此六個主要優勢類群合計佔本季浮游動物總豐度的87.22%。

本季豐度在近遠岸的變化趨勢不一致，各測站中以5B的豐度明顯較高，為190,841 ind./1,000 m^3，2B豐度最低，為55,277 ind./1,000 m^3。大類數以2C和5A發現22大類最多，而1A發現15大類最少。豐富度指數以2C最高(1.763)，1A最低(1.262)。均勻度指數的變化則無一致性，最高值出現在1B(0.670)，最低則出現在5C(0.552)。歧異度指數亦無一致性情形，最高值是3C(1.897)，最低則為5C(1.625)。優勢度指數方面最高是4A (0.327)，而最低則是1C(0.239)。

相似度分析方面，本季近遠岸測站的區隔並不明顯，顯示近、岸間的種類組成無太大差異，各測站相似度介於82.28%~93.49%之間，其中相似度最高的測站為2A和5A，達93.49%，相似度最低的測站為1C和4C，僅82.28%；如以相似度85%為基準，可以把測站分為兩群，第一群僅有4B和4C，其餘測站都屬第二群，主要是因為這些測站的翼足類所佔比例較多（**圖2.8.2-8~9**）。此外，由本季所採得浮游動物樣本進行分析，發現3個深度之間的豐度沒有顯著差異（ANOVA, $F = 0.214$, $p > 0.05$），5條測線間亦無明顯差異（ANOVA, $F = 0.319$, $p > 0.05$）。

我們亦將本季各測站之浮游動物豐度與水質因子做相關性分析，結果顯示

浮游動物豐度與海水溫度、海水鹽度及浮游植物豐度皆無顯著相關性；此外，浮游動物豐度與浮游植物豐度的X-Y散布圖亦可發現相關係數*r*值並不高，顯示兩者相關性不高 **(表2.8.2-3、圖2.8.2-10)**。

表2.8.2-1　　本季海域各測站之浮游動物監測結果統計表

測站	1A	1B	1C	2A	2B	2C	3A	3B	3C	4A	4B	4C	5A	5B	5C	平均	標準偏差	百分比
生物排水容積量(ml)	6.2	8.8	12.4	10.2	6.2	14.8	10.6	9.2	8.6	10.4	11.4	8.6	17.6	20.2	13.8	**11.3**	**1.0**	
有孔蟲 Foraminifera	366	62	195	534	402	982	762	1,171	462	652	509	464	1,502	937	492	**633**	**95**	**0.60%**
放射蟲 Radiolaria	0	0	0	0	31	0	0	64	39	0	0	66	120	144	164	**42**	**14**	**0.04%**
水母 Medusa	0	0	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	**12**	**8**	**0.01%**
管水母 Siphonophora	1,383	1,597	1,479	2,315	865	2,430	1,704	2,171	2,118	2,222	4,390	1,591	3,724	4,251	2,021	**2,284**	**261**	**2.15%**
多毛類 Polychaeta	0	0	78	0	0	103	0	0	116	0	0	0	120	72	164	**44**	**15**	**0.04%**
翼足類 Pteropoda	854	1,431	1,402	2,341	1,282	3,412	4,215	1,383	3,889	1,811	3,627	3,480	4,085	5,619	3,442	**2,818**	**352**	**2.66%**
端腳類 Amphipoda	0	0	117	51	0	155	336	277	116	0	95	99	841	432	164	**179**	**56**	**0.17%**
蟹類幼生 Crab zoea	1,118	705	701	611	294	931	561	1,937	1,271	676	1,527	1,690	1,141	2,377	1,311	**1,123**	**144**	**1.06%**
蟹類大眼幼蟲 Crab megalopa	0	0	195	51	0	724	135	0	0	0	0	0	240	216	0	**104**	**48**	**0.10%**
螢蝦類 Lucifera	0	41	117	127	124	465	314	64	231	628	573	166	841	216	492	**293**	**63**	**0.28%**
枝角類 Cladocera	1,057	684	1,908	127	0	776	179	0	655	121	0	0	240	144	0	**393**	**135**	**0.37%**
橈足類幼生 Copepoda nauplius	2,806	4,458	1,869	2,850	1,004	3,826	1,323	2,171	3,350	3,212	3,372	3,016	6,908	6,052	3,551	**3,318**	**397**	**3.13%**
哲水蚤 Calanoida	31,274	33,696	45,705	49,231	26,959	70,571	45,225	40,843	44,085	50,116	47,687	43,520	85,359	96,177	64,737	**51,679**	**4,881**	**48.74%**
劍水蚤 Cyclopoida	12,465	16,216	17,441	13,026	9,872	24,558	15,561	15,707	8,047	15,433	16,383	15,943	18,922	28,745	23,764	**16,806**	**1,369**	**15.85%**
猛水蚤 Harpacticoida	3,213	7,009	10,161	7,760	2,704	9,616	5,224	8,535	8,278	4,734	4,390	3,182	10,452	8,861	7,867	**6,799**	**666**	**6.41%**
蝦類幼生 Shrimp larva	2,176	4,417	7,747	5,394	6,411	10,702	4,372	5,193	6,661	2,512	3,118	2,221	10,452	11,095	5,245	**5,848**	**754**	**5.51%**
糠蝦類 Mysidacea	0	0	0	0	0	414	0	0	0	0	0	0	120	0	0	**36**	**27**	**0.03%**
藤壺幼生 Barnacle nauplius	5,165	4,935	11,718	7,505	2,874	12,305	5,022	4,172	8,047	6,642	13,075	7,789	10,512	13,328	7,484	**8,038**	**852**	**7.58%**
棘皮類幼生 Echinodermata larva	0	0	0	0	0	103	22	0	0	0	0	0	0	0	0	**8**	**7**	**0.01%**
毛顎類 Chaetognatha	1,159	1,991	1,479	1,908	911	1,499	830	1,128	1,848	1,667	763	2,486	1,922	4,755	656	**1,667**	**252**	**1.57%**
尾蟲類 Appendicularia	1,932	767	2,920	560	1,143	1,810	1,704	2,213	1,463	1,232	3,945	1,160	1,322	5,331	819	**1,888**	**324**	**1.78%**
海樽類 Thaliacea	590	1,555	1,285	2,671	371	3,722	1,099	809	1,579	1,642	2,450	3,613	5,046	1,873	710	**1,934**	**334**	**1.82%**
魚卵 Fish eggs	0	41	0	0	31	207	0	0	0	0	64	99	60	144	0	**43**	**16**	**0.04%**
仔稚魚 Fish larva	20	0	39	51	0	103	45	21	39	48	32	99	120	72	55	**50**	**9**	**0.05%**
豐度(ind./1,000m^3)	**65,577**	**79,607**	**106,632**	**97,113**	**55,277**	**149,413**	**88,633**	**87,859**	**92,289**	**93,349**	**105,999**	**90,685**	**164,051**	**190,841**	**123,246**	**106,038**	**9,197**	**100.00%**
大類數	**15**	**16**	**20**	**18**	**16**	**22**	**19**	**17**	**19**	**16**	**17**	**18**	**22**	**21**	**19**	**18**	**1**	
種數豐富度指數(Species Richness Index, *SR*)	**1.262**	**1.329**	**1.641**	**1.480**	**1.374**	**1.763**	**1.580**	**1.406**	**1.574**	**1.311**	**1.383**	**1.489**	**1.749**	**1.645**	**1.536**	**1.501**	**0.100**	
均勻度指數(Evenness Index, *J'*)	**0.660**	**0.670**	**0.625**	**0.606**	**0.614**	**0.597**	**0.586**	**0.640**	**0.644**	**0.601**	**0.661**	**0.626**	**0.582**	**0.588**	**0.552**	**0.617**	**0.008**	
種岐異度指數(Shannon Diversity Index, *H'*) (base e)	**1.787**	**1.857**	**1.871**	**1.752**	**1.701**	**1.844**	**1.727**	**1.815**	**1.897**	**1.666**	**1.872**	**1.810**	**1.800**	**1.792**	**1.625**	**1.788**	**0.020**	
優勢度指數(Dominance Index，*C*)	**0.278**	**0.240**	**0.239**	**0.294**	**0.290**	**0.269**	**0.304**	**0.266**	**0.261**	**0.327**	**0.250**	**0.276**	**0.301**	**0.291**	**0.325**	**0.281**	**0.007**	

註 1:1:大堀溪口、2:觀音溪口、3:觀塘工業區、4:新屋溪口、5:社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

表2.8.2-2　　本季海域各測站之浮游動物相似度矩陣

	1A	1B	1C	2A	2B	2C	3A	3B	3C	4A	4B	4C	5A	5B
1B	89.86													
1C	89.75	88.76												
2A	87.51	91.50	87.50											
2B	87.70	86.59	87.87	88.79										
2C	86.38	88.86	89.67	92.19	89.43									
3A	86.47	86.27	87.75	89.48	91.27	90.66								
3B	89.51	87.75	88.35	88.67	90.24	86.94	89.87							
3C	88.75	90.42	88.75	91.84	86.99	90.28	88.66	88.24						
4A	90.82	89.89	85.62	92.84	89.87	90.35	90.31	88.06	89.66					
4B	88.05	84.00	84.32	87.64	85.18	87.12	87.41	86.28	87.85	90.39				
4C	88.16	87.02	82.28	89.74	86.30	88.05	86.87	85.89	89.34	91.08	90.61			
5A	84.99	88.55	84.83	93.49	87.40	92.14	90.75	87.87	90.00	91.36	86.76	87.43		
5B	91.32	89.15	88.14	91.83	91.17	89.01	90.92	91.52	91.44	91.30	90.46	90.94	90.09	
5C	86.54	87.36	84.79	89.86	89.34	88.93	90.32	88.27	87.41	89.71	87.46	87.45	89.57	90.16

註 1:1:大堀溪口、2:觀音溪口、3:觀塘工業區、4:新屋溪口、5: 社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

表2.8.2-3　　本季海域各測站之浮游動物與水質因子相關分析

水質因子	相關係數	*p* 值
水溫	-0.161	0.079
鹽度	0.428	0.052
浮游植物	0.055	0.132

註：Spearman correlation analysis。顯著 * $p < 0.05$。






圖 2.8.2-1　　本季海域各類浮游動物優勢大類數量百分比



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。


圖 2.8.2-2　　本季海域各測站浮游動物豐度變化圖



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。


圖 2.8.2-3　　本季海域各測站浮游動物大類數變化圖



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。


圖 2.8.2-4　　本季海域各測站浮游動物豐富度變化圖



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。


圖 2.8.2-5　　本季海域各測站浮游動物均勻度變化圖



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。


圖 2.8.2-6　　本季海域各測站浮游動物歧異度變化圖



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。


註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

圖 2.8.2-7　　本季海域各測站浮游動物優勢度變化圖



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。
註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

圖 2.8.2-8　　本季海域各測站浮游動物群集組成之相似度圖



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。
註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

圖 2.8.2-9　　本季海域各測站浮游動物群集分析圖




圖 2.8.2-10　　各測站浮游動物豐度與浮游植物豐度散布圖

哲水蚤(Calanoida)	藤壺幼生(Barnacle nauplius)
	
劍水蚤(Cyclopoida)	
	

圖 2.8.2-11　　本季海域浮游動物優勢大類

2.8.3 底棲生物

海域生態調查時間為114年10月13日，當天07:00出港，約16:00回港，浪高約0.3至0.4公尺，風速約2至8節；調查期間海域並無觀察到異常狀況。

本季15個測站所採獲海域底棲生物，計有環節、節肢、脊索、刺胞、棘皮、軟體、毛顎與星蟲動物，共計8個動物門131科171屬190種3,410隻生物個體**(表2.8.3-1、2；圖2.8.3-2、3)**。

各測站在物種數方面，以4A測站的56種生物最多，物種數最少的是2B測站僅採獲16種生物；在個體隻數方面，以3C測站的597隻生物個體最多，數量最少的是3B測站僅採獲43隻生物個體；本次採樣優勢種為北海道櫻蛤(*Nitidotellina valtonis*)捕獲514隻生物個體(15.07%)，其次為珊瑚蜊(*Gregariella coralliophaga*)計有483隻生物個體(14.16%)；在生物密度方面，以3C測站(5.64隻/m^2)最高，其次為5B測站(4.18隻/m^2)，生物密度最低為3B測站(0.41隻/m^2)，平均生物密度2.15±0.37隻/m^2 **(表2.8.3-1；圖2.8.3-1、6)**。

種數豐度指數(Species Richness Index, *SR*)之值介於3.51~9.80之間，2C測站捕獲物種數及生物個體數雖不是本季最低，因捕獲大量的北海道櫻蛤，故指數最低；至於4A測站捕獲物種數為本季高之測站，故數值最高**(表2.8.3-1)**。

均勻度指數(Evenness Index, *J'*)在各測站間之變化介於0.32~0.88之間，數值愈高代表個體數在種間分配愈均勻，其中3C測站捕獲大量的珊瑚蜊佔了此測站的7成以上，故數值最低；而3B測站因捕獲18種43個生物個體，且沒有明顯優勢物種，故數值最高，次高為2A測站**(表2.8.3-1)**。

物種歧異度(Species diversity, *H'*)介於1.14~3.38之間，其中2A測站為本季捕獲物種與個體隻數雖不是最多，但在各物種捕獲數量分配較為平均，故有最高的數值；3C測站因捕獲大量的珊瑚蜊，故數值最低**(表2.8.3-1)**。

優勢度指數(Dominance Index, *C*)介於0.04~0.60之間，2A測站無捕獲明顯的優勢種，故數值最低；3C測站因捕獲珊瑚蜊佔該測佔總數7.7成以上的生物個體，故數值最高**(表2.8.3-1)**。

15個測站間底棲生物相似程度方面，以Bray-Curtis係數分析各測站間生物相似度，各測站相似度由1.98%至57.15%，相似度最高為4A與

4B測站，其次為5A與5B測站(56.50%)**(表2.8.3-3；圖2.8.3-4、5)**。

群集分析樹狀圖與MDS分析圖相似性呈現的結果顯示可大致區隔為5個群集，相似度30.40%處可將1A、1B、2A、4A、4B與5C測站形成為最高的一個群集，相似度30.37%處1C、2B、2C、3A、5A與5B測站形成一個群集，則3B、3C及4C測站各自為一個群集；本季調查遠、近岸物種組成無明顯的差異，南、北組成上因3及4測線皆有捕撈到鵝卵石及礁岩碎塊，故出現較多刺胞動物門之物種，如檜葉螅科**(表2.8.3-3；圖2.8.3-4、5)**。

本季海域各測站捕獲底棲生物豐度與底層水質因子相關分析顯示，水質因子正磷酸鹽有顯著相關，未來將持續觀察有顯著相關之測項與底棲生物的關係**(表2.8.3-4)**。本季所採得底棲生物豐度分析，海域5條測線(大堀溪口、觀音溪口、觀塘工業區小飯壢溪口、新屋溪口、社子溪口)3個深度(10 m、15 m、30 m)共15個測站，本季所捕獲之海域底棲生物個體隻數介於43~597隻之間，3個深度間的海域底棲生物個體隻數無顯著差異(ANOVA, F=1.17, p=0.34)；而五條測線之間海域底棲生物個體隻數無顯著差異(ANOVA, F=0.56, p=0.69) (**表2.8.3-1**)。

表2.8.3-1　　本季海域各測站之底棲生物之種類與數量

學名	中文名	1A	1B	1C	2A	2B	2C	3A	3B	3C	4A	4B	4C	5A	5B	5C	Total	平均	百分比	標準差	標準誤差
Annelida	**環節動物門**																				
Polychaeta	**多毛綱**																				
Polychaeta sp.	多毛綱	3															3	3.000	0.09%	0.775	0.200
Amphinomidae	仙蟲科																				
Amphinomidae sp.	仙蟲科															3	3	3.000	0.09%	0.775	0.200
Errantia	**游走亞綱**																				
Aphroditidae	鱗沙蠶科																				
Aphroditidae sp.	鱗沙蠶科						1										1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Capitellidae	小頭蟲科																				
Capitellidae sp.	小頭蟲科														1		1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Eunicidae	磯沙蠶科																				
Eunice sp.	磯沙蠶屬	1			1				1		2	3					8	1.600	0.23%	0.915	0.236
Lysidice sp.	襟松蟲屬	3			8											1	12	4.000	0.35%	2.145	0.554
Palola sp.		3			11	1					3	1	1				20	3.333	0.59%	2.870	0.741
Glyceridae	吻沙蠶科																				
Glycera sp.	吻沙蠶屬							3			1	1					5	1.667	0.15%	0.816	0.211
Goniadidae	角吻沙蠶科																				
Goniadidae sp.	角吻沙蠶科	1	1		3						4	8	2			3	22	3.143	0.65%	2.264	0.584
Lumbrineridae	索沙蠶科																				
Lumbrineridae sp.	索沙蠶科	1			1												2	1.000	0.06%	0.352	0.091
Nephtyidae	齒吻沙蠶科																				
Aglaophamus sp.	內卷齒蠶屬	3			1	1	2					1			1	1	10	1.429	0.29%	0.900	0.232
Onuphidae	歐努菲蟲科																				
Onuphidae sp.	歐努菲蟲科										1	1					2	1.000	0.06%	0.352	0.091
Paralacydoniidae	特須蟲科																				
Paralacydonia sp.	擬特須蟲屬														1	2	3	1.500	0.09%	0.561	0.145
Polynoidae	多鱗蟲科																				
Polynoidae sp.	多鱗蟲科	4	4		13					1	4	1	10			4	41	5.125	1.20%	3.990	1.030
Sigalionidae	錫鱗蟲科																				
Sigalionidae sp.	錫鱗蟲科		6					3						4	1		14	3.500	0.41%	1.870	0.483
Syllidae	裂蟲科																				
Syllidae sp.	裂蟲科				7						1		2				10	3.333	0.29%	1.839	0.475
Sedentaria	**隱居亞綱**																				
Flabelligeridae	扇沙蟲科																				
Flabelligeridae sp.	扇沙蟲科	1			1					2							4	1.333	0.12%	0.594	0.153
Maldanidae	海竹節蟲科																				
Maldanidae sp.	海竹節蟲科										1	1					2	1.000	0.06%	0.352	0.091
Orbiniidae	錐頭蟲科																				
Orbiniidae sp.	錐頭蟲科														2	1	3	1.500	0.09%	0.561	0.145
Opheliidae	海蛹科																				
Ophelina sp.	海蛹屬		1				1	2				1				1	6	1.200	0.18%	0.632	0.163
Oweniidae	歐文蟲科																				
Oweniidae sp.	歐文蟲科		1														1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Pectinariidae	筆帽蟲科																				
Pectinariidae sp.	筆帽蟲科				1												1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Sabellariidae	帚毛蟲科																				
Sabellariidae sp.	帚毛蟲科	1			7					1	18					1	28	5.600	0.82%	4.809	1.242
Serpulidae	龍介蟲科																				
Serpulidae sp.	龍介蟲科	1			1						1						3	1.000	0.09%	0.414	0.107
Travisiidae	臭海蛹科																				
Travisia sp.	臭海蛹															1	1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Trichobranchidae	毛鰓蟲科																				
Trichobranchidae sp.	毛鰓蟲科					1											1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Arthropoda	**節肢動物門**																				
Malacostraca	**軟甲綱**																				
Amphipoda	**端足目**																				
Ampeliscidae	雙眼鉤蝦科																				
Ampeliscidae sp.	雙眼鉤蝦科														38		38	38.000	1.11%	9.812	2.533
Caprellidae	麥桿蟲科																				
Caprellidae sp.	麥桿蟲科										1						1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Photidae	亮鉤蝦科																				
Photidae sp.	亮鉤蝦科	1			4						3	3			5	1	17	2.833	0.50%	1.727	0.446
Cumacea	**連蟲目**																				
Bodotriidae	連蟲科																				
Bodotriidae sp.	連蟲科											1			1		2	1.000	0.06%	0.352	0.091
Decapoda	**十足目**																				
Sergestidae	櫻蝦科																				
Acetes sp.	毛蝦屬											7			3		10	5.000	0.29%	1.915	0.494
Decapoda/Dendrobranchiata	**十足目/枝鰓亞目**																				
Penaeidae	對蝦科																				
Metapenaeus ensis	刀額新對蝦			1													1	1.000	0.03%	0.258	0.067

Penaeidae sp.	對蝦科	1	15	9		1	4			10	3			8	5	4	60	6.000	1.76%	4.614	1.191
Decapoda	**十足目/短尾下目**																				
Megalopa	大眼幼蟲			1	1						1	1			1		5	1.000	0.15%	0.488	0.126
Inachidae	尖頭蟹科																				
Achaeus japonicus	日本英雄蟹									1							1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Leucosiidae	玉蟹科																				
Arcania undecimspinosa	十一刺栗殼蟹		2														2	2.000	0.06%	0.516	0.133
Leucosia craniolaris	頭蓋玉蟹														1		1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Philyra platychira	長螯拳蟹							2									2	2.000	0.06%	0.516	0.133
Parthenopidae	菱蟹科																				
Harrovia elegans	美麗短角蟹												1				1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Pilumnidae	毛刺蟹科																				
Pilumnus longicornis	長角毛刺蟹				13								4				17	8.500	0.50%	3.441	0.888
Pilumnus sp.	毛刺蟹屬									1							1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Typhlocarcinus sp.	盲蟹屬									1							1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Portunidae	梭子蟹科																				
Charybdis obtusifrons	鈍額蟳												4				4	4.000	0.12%	1.033	0.267
Charybdis sp.	蟳屬		6														6	6.000	0.18%	1.549	0.400
Thalamita kagosimensis	鹿島短槳蟹										14	6				2	22	7.333	0.65%	3.815	0.985
Xiphonectes hastatoides	矛形梭子蟹			1				1	1					2	2		7	1.400	0.21%	0.743	0.192
Portunidae sp.	梭子蟹科				2												2	2.000	0.06%	0.516	0.133
Xanthidae	扇蟹科																				
Liomera rugata	皺紋花瓣蟹				1												1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Decapoda/Pleocyemata	**十足目/抱卵亞目**																				
Galatheidae	鎧甲蝦科																				
Allogalathea elegans	美麗異鎧蝦												2				2	2.000	0.06%	0.516	0.133
Galathea orientalis	東方鎧甲蝦						1										1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Galathea pubescens	柔毛鎧甲蝦				1								4				5	2.500	0.15%	1.047	0.270
Hippidae	蟬蟹科																				
Mastigochirus gracilis	細鞭足蟹			4						1							5	2.500	0.15%	1.047	0.270
Porcellanidae	瓷蟹科																				
Enosteoides ornatus	裝飾擬豆瓷蟹	6			16	1				3			5			1	32	5.333	0.94%	4.307	1.112
Polyonyx sinensis	中華多指瓷蟹							1			1	1			2		5	1.250	0.15%	0.617	0.159
Decapoda/Pleocyemata/Anom	**十足目/抱卵亞目/異尾下目**																				
Diogenidae	活額寄居蟹科																				
Dardanus deformi	畸形真寄居蟹												1				1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Diogenes nitidimanus	閃光活額寄居蟹			2						2							4	2.000	0.12%	0.704	0.182
Diogenes rectimanus	直螯活額寄居蟹	1		2			11	1	1	2	6	23		4	4	1	56	5.091	1.64%	6.100	1.575
Paguridae	寄居蟹科																				
Nematopagurus sp.	線寄居蟹屬												1				1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Decapoda/Pleocyemata/Carid	**十足目/抱卵亞目/真蝦下目**																				
Alpheidae	槍蝦科																				
Alpheidae sp.	槍蝦科	1	4		3			1		2	3	3	3		2	2	24	2.400	0.70%	1.404	0.363
Crangonidae	褐蝦科																				
Crangonidae sp.	褐蝦科			2						3							5	2.500	0.15%	0.900	0.232
Lysmatidae	鞭腕蝦科																				
Lysmata vittata	紅紋鞭腕蝦											2					2	2.000	0.06%	0.516	0.133
Ogyrididae	長眼蝦科																				
Ogyrides sp.	長眼蝦屬		4														4	4.000	0.12%	1.033	0.267
Palaemonidae	長臂蝦科																				
Palaemon pacificus	太平洋長臂蝦									4							4	4.000	0.12%	1.033	0.267
Palaemonidae sp.	長臂蝦科		8		3				2		16	37	58			5	129	18.429	3.78%	16.864	4.354
Pasiphaeidae	玻璃蝦科																				
Leptochela gracilis	修長細螯蝦		1	2			2	2			1	1		5	5	12	31	3.444	0.91%	3.218	0.831
Upogebiidae	螻姑蝦科																				
Upogebia edentata	無刺螻蛄蝦				1												1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Mysida	**糠蝦目**																				
Mysidae sp.	糠蝦科			3		1	2							4	22		32	6.400	0.94%	5.643	1.457
Stomatopoda	**口足目**																				
Squillidae	蝦蛄科																				
Oratosquillina inornata	無刺似口蝦蛄		1	1				1									3	1.000	0.09%	0.414	0.107
Ostracoda	**介形綱**																				
Cypridinidae sp.	海螢科		1				1	1			4	4		2	13	1	27	3.375	0.79%	3.385	0.874
Pycnogonida	**海蜘蛛綱**																				
Pantopods	海蜘蛛目																				
Pantopods sp.	海蜘蛛目										1						1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Thecostraca	**鞘甲綱**																				
Balanidae	藤壺科																				
Amphibalanus amphitrite	紋藤壺	121	10														131	65.500	3.84%	31.164	8.047
Chordata	**脊索動物門**																				
Ascidiacea	**海鞘綱**																				
Ascidiacea sp.	海鞘										4						4	4.000	0.12%	1.033	0.267

Actinopterygii	**輻鰭魚綱**																					
Juvenile fish	幼魚	1	3				3										7	2.333	0.21%	1.060	0.274
Cynoglossidae	舌鰨科																					
Cynoglossidae sp.	舌鰨科					1								1			2	1.000	0.06%	0.352	0.091
Gobiidae	鰕虎魚科																					
Trypauchen vagina	孔蝦虎魚							1									1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Gobiidae sp.	鰕虎魚科			1							1	3		1	3		9	1.800	0.26%	1.056	0.273
Cnidaria	**刺胞動物門**																					
Anthozoa	**花蟲綱**																					
Actiniaria sp.	海葵目									5						1	6	3.000	0.18%	1.298	0.335
Hormathiidae	鏈索海葵科																					
Calliactis sp.	美麗海葵屬									1							1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Octocorallia	**八放珊瑚綱**																					
Acanthogorgiidae	棘柳珊瑚科																					
Acanthogorgiidae sp.	棘柳珊瑚科	4	2		4					3	1					2	16	2.667	0.47%	1.534	0.396
Acroporidae	軸孔珊瑚科																					
Montipora sp.	表孔珊瑚屬												2				2	2.000	0.06%	0.516	0.133
Alcyoniidae	軟珊瑚科																					
Sarcophyton sp.	肉質軟珊瑚屬									1			2				3	1.500	0.09%	0.561	0.145
Alcyoniidae sp.	軟珊瑚科									2							2	2.000	0.06%	0.516	0.133
Clavulariidae	羽珊瑚科																					
Carijoa sp.	雪花珊瑚屬												10				10	10.000	0.29%	2.582	0.667
Ellisellidae	鞭珊瑚科																					
Ellisellidae sp.	鞭珊瑚科										19						19	19.000	0.56%	4.906	1.267
Gorgoniidae	柳珊瑚科																					
Gorgoniidae sp.	柳珊瑚科		1														1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Nephtheidae	棘軟珊瑚科																					
Litophyton sp.	穗軟珊瑚屬										1		2				3	1.500	0.09%	0.561	0.145
Plexauridae	網柳珊瑚科																					
Plexauridae sp.	網柳珊瑚科				1					1	2						4	1.333	0.12%	0.594	0.153
Turbinoliidae	圓錐珊瑚科																					
Turbinoliidae sp.	圓錐珊瑚科												81				81	81.000	2.38%	20.914	5.400
Xeniidae	傘軟珊瑚科																					
Xeniidae sp.	傘軟珊瑚科												1				1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Leptothecata	軟水母目																					
Aglaopheniidae sp.	羽螅科									29	6		2				37	12.333	1.09%	7.511	1.939
Sertulariidae sp.	檜葉螅科	6	15							40	31	18	160			1	271	38.714	7.95%	41.275	10.657
Echinodermata	**棘皮動物門**																					
Asteroidea	**海星綱**																					
Crinoidea	**海百合綱**																					
Comatulida sp.	海羊齒目	4	5		5					2		1	28				45	7.500	1.32%	7.171	1.852
Echinoidea	**海膽綱**																					
Dendrasteridae	樹星海膽科																					
Dendrasteridae sp.	樹星海膽科						1										1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Holothuroidea	**海參綱**																					
Holothuroidea sp.	海參綱		1														1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Stichopodidae	刺參科																					
Stichopodidae sp.	刺參科				1												1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Ophiuroidea	**蛇尾綱**																					
Amphiuridae	陽燧足科																					
Amphiuridae	陽燧足科							5			2	1	4				12	3.000	0.35%	1.612	0.416
Ophiactidae	輻蛇尾科																					
Ophiactidae sp.	輻蛇尾科	1	2		13	1					2	1	2			1	23	2.875	0.67%	3.270	0.844
Ophiocomidae	櫛蛇尾科																					
Ophiocomidae sp.	櫛蛇尾科									1							1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Ophiotrichidae	刺蛇尾科																					
Ophiothela sp.	疣蛇尾屬										28						28	28.000	0.82%	7.230	1.867
Mollusca	**軟體動物門**																					
Polyplacophora	**多板綱**																					
Chitonidae	石鱉科																					
Chitonidae sp.	石鱉科		2														2	2.000	0.06%	0.516	0.133
Gastropoda	**腹足綱**																					
Architectonicidae	車輪螺科																					
Heliacus implexus	栗色繩目車輪螺												1				1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Buccinidae	峨螺科																					
Engina armillata											1						1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Columbellidae	麥螺科																					
Mitrella sp.	麥螺				2					3	1		7				13	3.250	0.38%	1.922	0.496
Coralliophilidae	珊瑚螺科																					
Coralliophila sp.	珊瑚螺屬										1						1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Costellariidae	蛹筆螺科																					
Vexillum sp.	蛹筆螺屬	1								1							2	1.000	0.06%	0.352	0.091

Eratoidae	石榴螺科																						
Sulcerato tomlini	花背石榴螺				1													1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Eulimidae	瓷螺科																						
Eulima bifasciata	雙帶瓷螺						1	1								4		6	2.000	0.18%	1.056	0.273
Muricidae	骨螺科																						
Bedeva birileffi	籠目結螺										1		3					4	2.000	0.12%	0.799	0.206
Cytharomorula grayi			1															1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Ergalatax contracta	粗肋結螺	1			1								3					5	1.667	0.15%	0.816	0.211
Ergalatax sp.	粗肋結螺屬												1					1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Indothais sacellum			1															1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Murex trapa	寶島骨螺					1												1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Nassariidae	織紋螺科																						
Nassarius gaudiosa	網紋織紋螺											2						2	2.000	0.06%	0.516	0.133
Nassarius nodiferus	粗肋織紋螺															1		1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Nassarius succinctus	尖頂織紋螺		1						1									2	1.000	0.06%	0.352	0.091
Nassarius silvardi												1						1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Nassarius teretiusculus	小塔織紋螺			1		2	7	3	1					8	3			25	3.571	0.73%	2.610	0.674
Nassarius variciferus	縱肋織紋螺			2		9	10	5	1	3	2	2		1	7	1		43	3.909	1.26%	3.335	0.861
Zeuxis sp.			10					1	5		23	21				1		61	10.167	1.79%	7.787	2.011
Naticidae	玉螺科																						
Natica gualteriana	小灰玉螺			1										3				4	2.000	0.12%	0.799	0.206
Natica lineata	細紋玉螺														1			1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Sinum sp.	廣口玉螺屬				1													1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Pseudomelatomidae																							
Inquisitor sp.	玉米捲管螺屬					1										1		2	1.000	0.06%	0.352	0.091
Solariellidae	日晷螺科																						
Solariella sp.	小鈴螺屬												2					2	2.000	0.06%	0.516	0.133
Terebridae	筍螺科																						
Strioterebrum plumbeum						1		15						1	17	3		37	7.400	1.09%	5.566	1.437
Terebra anilis	徐娘筍螺														1			1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Triphoridae	左錐螺科																						
Triphoridae sp.	左錐螺科										3							3	3.000	0.09%	0.775	0.200
Trochidae	鐘螺科																						
Calliostoma haliarchus	陀螺鐘螺												1					1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Ethminolia nektonica	階梯鐘螺	1			14										2	1		18	4.500	0.53%	3.590	0.927
Umbonium vestiarium	彩虹蝠螺			1														1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Turridae	捲管螺科																						
Brachytoma kurodai	瑞珠卷管螺														1			1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Etrema sp.	腹螺屬						1							6	5			12	4.000	0.35%	1.935	0.500
Paradrillia inconstans	沙土卷管螺			1														1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Paradrillia sp.	異管螺屬															1		1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Tomopleura nivea	淡彩捲管螺														1			1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Scaphopoda	**掘足綱**																						
Gadilidae	胖象牙貝科																						
Gadila anguidens	胖象牙貝		1	1		5		11	4		3	3		35	19			82	9.111	2.40%	9.709	2.507
Gadilinidae	纖細象牙貝科																						
Episiphon virgula	頂管象牙貝		8						6	2								16	5.333	0.47%	2.492	0.643
Laevidentaliidae	光滑象牙貝科																						
Laevidentalium coruscum				2						1						16		19	6.333	0.56%	4.114	1.062
Bivalvia	**雙殼綱**																						
Arcidae	魁蛤科																						
Arca avellana	船魁蛤				1													1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Barbatia foliata	鬍魁蛤												1					1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Barbatia virescens	青鬍魁蛤				2													2	2.000	0.06%	0.516	0.133
Chamidae	偏口蛤科																						
Chama pacifica	太平洋偏口蛤	1			1											3		5	1.667	0.15%	0.816	0.211
Corbulidae	抱蛤科																						
Corbula formosensis	台灣抱蛤			1				44	3		1	4		3	3	3		62	7.750	1.82%	11.128	2.873
Corbula scaphoides	舟形抱蛤										9	10	1			3		23	5.750	0.67%	3.335	0.861
Cuspidariidae	杓蛤科																						
Cardiomya gouldiana	密彫杓蛤				1				3							1		5	1.667	0.15%	0.816	0.211
Crassatellidae	厚蛤科																						
Crenocrassatella foveolata	厚蛤													8				8	8.000	0.23%	2.066	0.533
Nipponocrassatella nana	娜娜日本厚蛤													2	3			5	2.500	0.15%	0.900	0.232
Gastrochaenidae	開腹蛤科																						
Gastrochaena cuneiformis	開腹蛤				9								1					10	5.000	0.29%	2.320	0.599
Hiatellidae	縫棲蛤科																						
Panomya sp.					1							1						2	1.000	0.06%	0.352	0.091
Hiatellidae sp.	縫棲蛤科											1						1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Isognomonidae	障泥蛤科																						
Isognomon legumen	白障泥蛤				9													9	9.000	0.26%	2.324	0.600
Lasaeidae	猿頭蛤科																						

Kellia porculus	豆形凱利蛤				2												2	2.000	0.06%	0.516	0.133
Lasaeidae sp.	猿頭蛤科				1						2						3	1.500	0.09%	0.561	0.145
Lucinidae	滿月蛤科																				
Lucinidae sp.	滿月蛤科							5	1						2	7	15	3.750	0.44%	2.138	0.552
Lyonsiidae	波浪蛤科																				
Agriodesma navicula	舟形長帶蛤										1						1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Mactridae	馬珂蛤科																				
Mactra nipponica	日本馬珂蛤							1			2			17	1		21	5.250	0.62%	4.356	1.125
Malleidae	丁蠣科																				
Malleus sp.	丁蠣屬											1					1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Myochamidae	三角板蛤科																				
Myadora sp.															3	2	5	2.500	0.15%	0.900	0.232
Mytilidae	殼菜蛤科																				
Gregariella coralliophaga	珊瑚蚶	4		3	9		1			460	3	2				1	483	60.375	14.16%	118.372	30.564
Modiolus nipponicus	日本殼菜蛤		1		1												2	1.000	0.06%	0.352	0.091
Musculus sp.	肌蛤屬				1												1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Trichomusculus semigranatus	半粒毛肌蛤										2						2	2.000	0.06%	0.516	0.133
Nuculanidae	彎錦蛤科																				
Nuculana takaoensis	打狗彎錦蛤								1								1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Nuculidae	銀錦蛤科																				
Ennucula niponica	日本銀錦蛤		1											1	18	21	41	10.250	1.20%	6.840	1.766
Pandoridae	屠刀蛤科																				
Pandoridae sp.	屠刀蛤科										1						1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Pharidae	刀蟶科																				
Siliqua radiata	光芒豆蟶							6									6	6.000	0.18%	1.549	0.400
Pteriidae	鶯蛤科																				
Pteria sp.	珍珠貝屬												1				1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Pholadidae	鴕蛤科																				
Jouannetia cumingii	鈴蛤										1						1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Psammobiidae	紫雲蛤科																				
Gari sp.	地蛤屬			2													2	2.000	0.06%	0.516	0.133
Semelidae	唱片蛤科																				
Leptomya sp.	小海螂屬										1						1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Spondylidae	海菊蛤科																				
Spondylus sp.	海菊蛤屬										6		1				7	3.500	0.21%	1.552	0.401
Tellinidae	櫻蛤科																				
Cadella semen	賽門櫻蛤			19			17			2		1		6	1	2	48	6.857	1.41%	6.224	1.607
Nitidotellina hokkaidoensis	北海道亮櫻蛤					3		14	1	1	1						20	4.000	0.59%	3.599	0.929
Nitidotellina minuta	小亮櫻蛤		1					6	9					1	1	8	26	4.333	0.76%	3.150	0.813
Nitidotellina valtonis	北海道櫻蛤			67		15	153	51	1	1	1	1		24	199	1	514	46.727	15.07%	61.698	15.930
Pinguitellina sp.	胖櫻蛤屬															1	1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Veneridae	簾蛤科																				
Callithaca sp.	麗目蛤屬											1					1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Cyclina sinensis	環文蛤							2									2	2.000	0.06%	0.516	0.133
Dosinorbis japonica	日本鏡文蛤													8			8	8.000	0.23%	2.066	0.533
Irus irus	寬葉百合簾蛤				7						18	2				1	28	7.000	0.82%	4.824	1.245
Meretrix lyrata	皺肋文蛤							3						1			4	2.000	0.12%	0.799	0.206
Placamen chlorotica	奶油蛋糕簾蛤		1														1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Veremolpa scabra	海星小簾蛤							1				6		7			14	4.667	0.41%	2.282	0.589
Veremolpa sp.	小簾蛤屬											1					1	1.000	0.03%	0.258	0.067
Yoldiidae	綾衣蛤科																				
Yoldia lepidula	綾衣蛤		1						1				1			1	4	1.000	0.12%	0.458	0.118
Chaetognatha	**毛顎動物門**																				
Chaetognatha sp.	毛顎類						2										2	2.000	0.06%	0.516	0.133
Sipuncula	**星蟲動物門**																				
Aspidosiphonida	盾管星蟲目																				
Aspidosiphonidae sp.	盾管星蟲科		2	4	5		4			3	2	3	1	7	37	37	105	9.545	3.08%	12.352	3.189
Golfingiida	戈芬星蟲目																				
Golfingiidae sp.	戈芬星蟲科				13												13	13.000	0.38%	3.357	0.867
Sipunculidae	星蟲科																				
Sipunculidae sp.	星蟲科									1							1	1.000	0.03%	0.258	0.067
科		25	33	21	41	14	18	23	13	30	52	35	36	21	36	40	131				
屬		27	32	23	46	14	19	26	14	33	54	40	38	25	39	43	171				
物種數		27	35	25	47	16	20	29	18	35	56	44	39	27	41	46	190				
個體數(隻)		177	125	134	206	45	225	193	43	597	273	194	417	170	442	169	3410				
S R		5.02	7.04	4.90	8.63	3.94	3.51	5.32	4.52	5.32	9.80	8.16	6.30	5.06	6.57	8.77					
J'		0.48	0.87	0.63	0.88	0.79	0.47	0.74	0.88	0.32	0.83	0.80	0.59	0.85	0.62	0.80					
H'		1.58	3.09	2.03	3.38	2.18	1.41	2.49	2.55	1.14	3.33	3.03	2.17	2.79	2.32	3.06					
C		0.47	0.06	0.28	0.04	0.18	0.47	0.14	0.10	0.60	0.06	0.08	0.21	0.09	0.23	0.09					
生物密度(隻/㎡)		1.67	1.18	1.27	1.95	0.43	2.13	1.82	0.41	5.64	2.58	1.83	3.94	1.61	4.18	1.60	32.23				
標準偏差		0.217	0.037	0.127	0.043	0.037	0.318	0.113	0.022	0.732	0.067	0.068	0.275	0.073	0.297	0.061	0.538				
平均生物豐度(隻/㎡)							2.15		±	0.37											

註 1：1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2：A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

註 3：採樣面積為矩形底棲生物採樣器寬 0.457(m)*作業時間 300(s)*船速 1.5(Kn)*0.5144(m/s)=105.79(m^2) 。

註 4：每測站重複數 1，故無平均值±標準差。

註 5：表格內單位:隻。

註 6：豐富度指數（Species Richness Index, *SR*）、均勻度指數（Evenness Index, *J'*）、歧異度指數(Shannon Diversity Index, *H'*)、優勢度指數（Dominance Index, *C*）。

表2.8.3-2　　本季海域底棲生物各動物門之物種數及個體數

項目	物種數	個體數
環節動物	26	207
節肢動物	45	708
脊索動物	5	23
刺胞動物	15	457
棘皮動物	8	112
軟體動物	87	1782
毛顎動物	1	2
星蟲動物	3	119


表2.8.3-3　　本季海域底棲生物之各測站間相似度分析表

	1A	1B	1C	2A	2B	2C	3A	3B	3C	4A	4B	4C	5A	5B	5C
1A															
1B	31.96														
1C	10.23	15.70													
2A	48.11	21.04	8.01												
2B	19.21	9.57	28.53	9.96											
2C	17.00	19.31	48.96	7.65	34.02										
3A	5.48	22.29	31.10	1.98	29.03	31.73									
3B	7.35	25.38	26.67	7.72	27.26	16.43	40.55								
3C	34.53	23.62	34.12	24.49	16.29	22.70	12.34	15.35							
4A	29.36	28.81	23.36	34.08	16.37	18.40	26.10	21.27	30.64						
4B	28.63	31.95	27.25	28.90	17.48	27.16	31.29	24.27	23.72	57.15					
4C	25.04	24.73	2.35	32.23	8.30	2.46	5.18	5.87	23.39	31.35	25.66				
5A	5.55	22.45	50.06	2.98	33.62	45.26	46.40	29.22	17.30	22.58	27.77	2.17			
5B	13.07	19.28	39.28	12.14	26.66	42.00	44.82	24.50	16.20	26.40	35.22	3.91	56.50		
5C	37.10	35.74	26.02	32.13	21.38	29.13	29.00	29.00	31.74	37.83	43.15	20.57	29.61	43.01	

表2.8.3-4　　本季海域底棲生物與水質因子相關分析

水質因子	相關係數	*p* 值
水溫	0.479	0.069
pH	-0.210	0.411
鹽度	0.354	0.189
溶氧	-0.100	0.714
葉綠素 a	-0.407	0.127
懸浮固體	-0.311	0.219
鋅	-0.054	0.842
鐵	0.245	0.367
銅	0.038	0.883
正磷酸鹽	-0.631	0.015*
矽酸鹽	-0.336	0.214
油脂(正己烷抽出物)	0.079	0.785
動植物性油脂	0.200	0.504

註：Spearman correlation analysis。顯著 * $p < 0.05$。



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

註 3:採樣面積為矩形底棲生物採樣器寬 0.457(m)*作業時間 300(s)*船速 1.5(Kn)*0.5144(m/s) = 105.79(m^2) 。

圖 2.8.3-1　　本季海域各測站底棲生物之種類數及個體數比較圖




圖 2.8.3-2　　本季海域底棲生物各動物門之物種數百分比






圖 2.8.3-3　　本季海域底棲生物各動物門之個體數百分比



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。
註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

圖 2.8.3-4　　本季底棲生物之各測站群集分析樹狀圖



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。
註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

圖 2.8.3-5　　本季海域底棲生物之各測站群集 MDS 圖


北海道櫻蛤(*Nitidotellina hokkaidoensis*)	珊瑚蜊(*Gregariella coralliophaga*)
	
檜葉螅科(Sertulariidae)	
	

圖 2.8.3-6　　本季海域底棲生物表優勢物種

2.8.4 魚類(仔稚魚及魚卵)

本季海域態調查時間為114年10月13日，當天07:00出港，約16:00回港，浪高約0.3至0.4公尺，風速約2至8節；調查期間海域並無觀察到異常狀況。

本季(114年10月) 於觀塘附近海域亞潮帶15個測站所採集之浮游性仔稚魚計3科3屬3種，各測站平均豐度為305±200(ind./1,000m^3)，採得魚種包括鬚鯛科(Mullidae)、沙鮻科(Sillaginidae)及鯛科(Sparidae)等各1種，其中以鯛科之真鯛(*Pagrus major*)最為優勢(相對豐度66.76%)，其次為緋鯉屬(*Upeueus*)魚種(21.34%) **(表2.8.4-1)**。

在各測站浮游性仔稚魚物種數的比較方面，本季僅於觀塘工業區外3C測站、新屋溪口外4C測站及社子溪口外測站有採得仔稚魚樣本。仔稚魚豐度最高的測站出現於社子溪口外之5B測站，豐度為2,975 ind./1,000m^3。本季魚卵部分之豐度分布亦以社子溪口外測線較高，其中又以測站5C採得魚卵樣本豐度最高(2,657 ind./1,000m^3)，本季採得魚卵之豐度較仔稚魚豐度來得高**(表2.8.4-1)**。

種歧異度（Species Diversity）可用來提供生物之自然集合或群集組合之訊息，亦可用於解釋棲息於特殊棲地環境生物群集結構之改變及空間之差異。在本季採樣中，僅有測站3C、4C、5A、5B及5C測站有採得仔稚魚樣本，優勢度指數（Dominance Index,*C*）方面以僅採得一種魚種之測站5A最高(1.00)，其次為測站5B(0.68)。種歧異度指數(Shannon Diversity Index, *H'*)部分以測站4C及5C較高(0.39)，採得魚種數在1種以下之測站其指數值皆為0；均勻度指數（Evenness Index, *J'*）方面以測站4C較高(0.82)，其次為測站3C及5C(0.81)，而未採得仔稚魚樣本之測站其均勻度指數無法測得。而浮游性仔稚魚之種豐富度指數（Species Richness Index, *SR*）方面，測站5A由於僅採得1種魚種，其*SR*值為0，測站5C仔稚魚物種數高且魚種豐度相對其餘測站分配較為平均，所以該測站之種豐度指數最高(0.31)，其餘未採得仔稚魚樣本之測站則無法測得**(表2.8.4-1)**。以Bray-Curtis係數分析15個測站間浮游性仔稚魚群集組成相似度，除去未採得仔稚魚之測站後，測站4C及5C之仔稚魚群及相似度最高(92.86)，其次為測站5B及5C(82.56)**(表2.8.4-2、圖2.8.4-1)**。MDS群集分析圖亦可看出類似的結果**(圖2.8.4-2)**。本季海域各測站之浮

游性仔稚魚與水質因子相關分析顯示，其豐度與海域表層溫度(p<0.01)、酸鹼值(p<0.001)及溶氧量皆呈顯著負相關(p<0.01)**(表 2.8.4-3)**。

由本季所採得仔稚魚樣本進行分析，海域5條測線以及距岸遠近3種海域深度採得之浮游性仔稚魚豐度於3個深度（ANOVA, F =0.67, p > 0.05）及5條測線間（F = 1.55, p > 0.05）皆無顯著差異。

本季採得前3種優勢種仔稚魚樣本照如**圖 2.8.4-3**所示。

表2.8.4-1　　本季海域各測站仔稚魚之豐度(ind./1000m^3)、平均豐度(Mean ± S.E.)、相對豐度(R.A., %)、各測站之出現率(O.R., %)及歧異度分析表

	1A	1B	1C	2A	2B	2C	3A	3B	3C	4A	4B	4C	5A	5B	5C	Mean±S.E.	R.A.(%)	O.R(%)
Fish larvae																		
Mullidae																		
Upeneus sp.	0	0	0	0	0	0	0	0	149	0	0	444	0	186	197	65 ± 33	21.34	26.67
Sillaginidae																		
Sillago parvisquamis	0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	0	74	0	372	49	36 ± 25	11.91	26.67
Sparidae																		
Pagrus major	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222	72	2417	344	204 ± 160	66.76	26.67
Species number	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	3	1	3	3	1 ± 0.3	-	-
Total abundance (inds/1000m^3)	0	0	0	0	0	0	0	0	199	0	0	741	72	2975	591	305 ± 200	-	-
Fish eggs	0	0	202	0	0	0	123	113	946	128	148	815	574	744	2657	430 ± 180	-	-
SR	-	-	-	-	-	-	-	-	0.19	-	-	0.30	0.00	0.25	0.31	-	-	-
J'	-	-	-	-	-	-	-	-	0.81	-	-	0.82	-	0.55	0.81	-	-	-
H'	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.39	0.00	0.26	0.39	-	-	-
C	-	-	-	-	-	-	-	-	0.62	-	-	0.46	1.00	0.68	0.46	-	-	-

註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

註 3:豐富度指數（Species Richness Index, *SR*）、均勻度指數（Evenness Index, *J'*）、歧異度指數(Shannon Diversity Index, *H'*)、優勢度指數（Dominance Index, *C*）。

註 4:"-"為統計軟體計算各指數過程中顯示「無法計算」之結果。

表2.8.4-2　　本季海域各測站仔稚魚群集之相似度分析表

	3C	4C	5A	5B	5C
3C					
4C	70.16				
5A	0.00	40.72			
5B	57.91	79.20	32.33		
5C	72.91	92.86	42.77	82.56	


註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

表2.8.4-3　　本季海域各測站之浮游性仔稚魚豐度與水質因子相關分析

水質因子	相關係數	*p* 值
水溫	-0.685	0.004*
鹽度	-0.251	0.359
pH 值	-0.756	0.001*
溶氧量	-0.698	0.003*
葉綠素 *a*	-0.091	0.743


註：Spearman correlation analysis。顯著 * $p < 0.05$。



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

圖 2.8.4-1　　本季仔稚魚之群集分析樹狀圖



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

圖 2.8.4-2　　本季仔稚魚之 MDS 群集分析圖




真鯛(*Pagrus major*)	緋鯉屬(*Upeneus*)
	
小鱗沙鮻(*Sillago parvisquamis*)	
	

圖 2.8.4-3　　本季仔稚魚優勢物種

2.8.5 總基礎生產力

海域生態調查時間為114年10月13日，當天7:00出港，約16:00回港，浪高約0.3至0.4公尺，風速約2至8節；調查期間海域並無觀察到異常狀況。

本季海域生態調查由每一河口測站向海方向延伸三個測站A(靠近岸)、B、及C (離岸最遠測站)，依照各測站現況採三個深度(表層、中層、底層)之總基礎生產力。

不同測站之不同水層總基礎生產力數值介於0.13-12.45 mg C/m^3/h之間，本次總基礎生產力以5A中層較低，而1A表層數值最高 (**表2.8.5-1、圖2.8.5-1~5**)。

本季海域不同測線總基礎生產力有顯著差異，測線1(大堀溪口)顯著高於其它測線(2-Way ANOVA，測站：F =5.700，p = 0.002)，不同水深間之總基礎生產力無顯著差異(2-Way ANOVA，水深：F =0.231，p = 0.795)。本季海域總基礎生產力與浮游植物豐度有顯著正相關(p = 0.026)，而與其他水質因子之透明度及鋅濃度為顯著負相關，與溫度、DO、油脂及鎳為顯著正相關(**表2.8.5-2)**，與水體葉綠素*a*濃度無顯著相關 (p = 0.270) (**圖2.8.5-6**)。

表2.8.5-1　　本季海域各測站之總基礎生產力分析

地點	測站	水層		
		表層	中層	底層
1 大堀溪	A	12.45	12.40	5.33
	B	4.25	3.60	2.78
	C	1.94	1.82	1.70
2 觀音溪	A	3.52	2.76	2.14
	B	2.19	2.35	1.43
	C	0.78	1.08	0.50
3 小飯壢溪	A	1.41	1.38	6.06
	B	0.76	0.70	0.52
	C	0.69	0.65	0.52
4 新屋溪	A	1.96	1.00	1.15
	B	0.90	0.59	0.80
	C	0.69	0.31	0.37
5 社子溪	A	0.78	0.13	0.89
	B	0.94	0.82	0.38
	C	0.28	0.20	0.37

註 1：1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2：A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。


註 3：資料以平均值 ± 標準機差 (n=3) 表示，單位為 mg C/m^3/h。

註 4：本表主要呈現基礎生產力數值，淨基礎生產力結果詳附錄十所示。

表2.8.5-2　　本季海域各測站之總基礎生產力與水質因子相關分析表

水質因子	相關係數	*p* 值
浮游植物	0.333	0.026*
透明度	-0.628	0.012*
溫度	0.429	0.003*
鹽度	-0.198	0.191
pH	0.221	0.144
DO	0.396	0.007*
油脂	0.323	0.040*
懸浮固體	-0.073	0.630
正磷酸鹽	0.065	0.682
硝酸鹽	0.632	0.333
矽酸鹽	0.176	0.247
葉綠素 a	0.167	0.270
銅	0.176	0.245
鋅	-0.380	0.010*
鎳	0.581	0.006*
鐵	0.110	0.468


註：Spearman correlation analysis。顯著* $p < 0.05$。



註 1：A=水深 10M (取-1M、-5M，-9M)、B=水深 15M (取-1M、-7M，-14M)、C=水深 30M (取-1M、-15M，-29M)。

註 2：資料以平均值 ± 標準機差 (n=3) 表示，不同英文字母表示據統計顯著差異(Tukey's test，$p < 0.05$) 。


圖 2.8.5-1　　本季大堀溪測站之總基礎生產力分析



註 1：A=水深 10M (取-1M、-5M，-9M)、B=水深 15M (取-1M、-7M，-14M)、C=水深 30M (取-1M、-15M，-29M)。

註 2：資料以平均值 ± 標準機差 (n=3) 表示，不同英文字母表示據統計顯著差異(Tukey's test，$p < 0.05$) 。


圖 2.8.5-2　　本季觀音溪測站之總基礎生產力分析



註 1：A=水深 10M (取-1M、-5M，-9M)、B=水深 15M (取-1M、-7M，-14M)、C=水深 30M (取-1M、-15M，-29M)。

註 2：資料以平均值 ± 標準機差 (n=3) 表示，不同英文字母表示據統計顯著差異(Tukey's test，$p < 0.05$)。


圖 2.8.5-3　　本季小飯壢溪測站之總基礎生產力分析



註 1：: A=水深 10M (取-1M、-5M，-9M)、B=水深 15M (取-1M、-7M，-14M)、C=水深 30M (取-1M、-15M，-29M)。

註 2：資料以平均值 ± 標準機差 (n=3) 表示，不同英文字母表示據統計顯著差異(Tukey's test，$p < 0.05$)。

圖 2.8.5-4　　本季新屋溪測站之總基礎生產力分析



註 1： A=水深 10M (取-1M、-5M，-9M)、B=水深 15M (取-1M、-7M，-14M)、C=水深 30M (取-1M、-15M，-29M)。

註 2：資料以平均值 ± 標準機差 (n=3) 表示，不同英文字母表示據統計顯著差異(Tukey's test，$p < 0.05$)。

圖 2.8.5-5　　本季社子溪測站之總基礎生產力分析




圖 2.8.5-6　　本季海域各測站總基礎生產力與葉綠素 a 濃度散布圖

2.9 河口生態

2.9.1 浮游植物

河口生態調查時間為 114 年 10 月 14 日及 15 日，乾潮時間為 10:17 及 11:45。調查期間各河口測站無發現異常狀況。

河口生態浮游植物於 114 年 10 月採樣完成，於五個河口測站所採得之結果如**表 2.9.1-1** 所示，共發現矽藻 22 種、藍綠菌 2 種、渦鞭毛藻 1 種、綠藻 5 種及裸藻 2 種，總計發現 32 種**(表 2.9.1-1)**。五個河口測站平均以綠藻佔了總豐度近 54%最高、矽藻佔了 24%為第二、藍綠菌佔了 20%為第三、其他藻佔了 2%以下。浮游植物平均豐度為 695,120 ± 631,230 cells/L，以 5D 社子溪口數量最豐，豐度為 1,582,800 cells/L，而以 3D 小飯壢溪口豐度較低，為 36,000 cells/L，高低相差近 44 倍**(圖 2.9.1-1)**。

河口生態浮游植物種類平均以綠藻之空星藻屬最為豐富，佔了總豐度 31% **(圖 2.9.1-2)**，主要出現在 5D 社子溪口**(表 2.9.1-1)**。本季各測站的淡水藻皆密度很高，溪流藻相種類相當高**(表 2.9.1-1)**。在各測站種類數目方面，發現的種類介於 13 至 23 種之間，以 5D 社子溪口發現的種類較多**(表 2.9.1-1、圖 2.9.1-1)**。

浮游植物之種數豐度指數介於 1.14-1.54 之間；均勻度指數介於 0.45-0.83 之間；種歧異度指數介於 0.61-1.04 之間；而優勢度指數則介於 0.11-0.40 之間。本季各測站沒有極度優勢的種類，因此各指數值皆正常**(表 2.9.1-1**）。

五個河口浮游植物群集相似度分析顯示，3D 小飯壢溪口與其他測站相似度較低外（4-14%），其他測站之間的相似度也多在 40%以下 **(表 2.9.1-2)**。群集分析圖及 MDS 圖顯示，各溪口樣品之浮游植物群集組成呈現一定程度的差異，其中 1D 大堀溪與 2D 觀音溪樣品相似度最高，兩者聚為一群，顯示兩溪口環境條件或群聚結構相近；而 4D 新屋溪與 5D 社子溪則與前述群組有中度相似性；3D 小飯壢溪則獨立分出，顯示其群聚組成差異較大**(圖 2.9.1-3、圖 2.9.1-4)**。五個溪口間呈現一定程度的群聚差異，反映出各河口浮游植物群集可能受不同水文條件或外源輸入影響所致。本季河口之浮游植物豐度與 Chl a 相關性分析圖顯示，兩者之間沒有顯著相關（F =0.307, p = 0.618）**(圖 2.9.1-5)**。

從本季五個河口測站所採得樣品分析，各測站所採穫之浮游植物豐度差異約 44 倍。4D 新屋溪口連續三季皆有密度非常高的微囊藻屬，不過近兩季大幅降低，但仍需要多加注意。與所測之環境及水質因子進行相關性分析**(表 2.9.1-3**），浮游植物豐度與總磷有顯著正相關。

表2.9.1-1　　本季河口各測站之浮游植物監測結果統計表

測站	1D大堀溪口	2D觀音溪口	3D小飯壢溪口	4D新屋溪口	5D社子溪口	平均	標準偏差	百分比
Heterokontophyta異鞭毛藻門, Bacillariophyceae矽藻綱								
Achnanthes spp. (曲殼藻)	8000	8400	400	0	4400	4240	4006	0.61
Amphiprora spp. (繭形藻屬)	0	0	400	800	1200	480	522	0.07
Amphora spp. (雙眉藻屬)	3200	2800	400	0	1200	1520	1425	0.22
Biddulphia spp. (盒形藻屬)	2000	0	0	0	0	400	894	0.06
Chaetoceros spp. (角毛藻屬)	0	0	0	14000	22000	7200	10257	1.04
Cocconeis spp. (卵形藻屬)	400	0	0	800	0	240	358	0.03
Coscinodiscus spp. (圓篩藻屬)	0	0	1200	0	1600	560	780	0.08
Cyclotella spp. (小環藻屬)	97200	68400	3600	6400	36000	42320	40378	6.09
Cymbella spp. (橋彎藻屬)	0	0	0	0	1600	320	716	0.05
Diploneis fusca (淡褐雙壁藻)	0	2000	2400	1600	1600	1520	912	0.22
Fragilaria spp. (脆杆藻屬)	64000	39200	4800	22400	9200	27920	24210	4.02
Gomphonema spp. (異極藻屬)	11600	38000	0	4000	0	10720	15968	1.54
Gyrosigma spp. (布紋藻)	0	1200	0	0	0	240	537	0.03
Hydrosera spp.	1200	0	0	0	0	240	537	0.03
Mastogloia spp. (胸隔藻屬)	400	0	0	0	0	80	179	0.01
Melosira spp. (直鏈藻屬)	48000	8000	0	16000	18000	18000	18221	2.59
Navicula spp. (舟形藻屬)	14800	18000	1600	9200	26000	13920	9184	2.00
Nitzschia spp. (菱形藻屬)	12800	20800	2400	9200	60400	21120	22939	3.04
Pinnularia spp. 羽紋藻屬	16400	16000	400	400	3600	7360	8176	1.06
Rhizosolenia spp. (根管藻屬)	0	0	0	0	800	160	358	0.02
Surirella spp. (雙菱藻)	5600	5200	0	2000	6000	3760	2632	0.54
Synedra spp. (針桿藻屬)	10000	14800	1600	4000	14400	8960	5991	1.29
Cyanophyta藍綠菌門								
Microcystis spp. 微囊藻屬	214800	0	0	34000	380000	125760	167792	18.09
Phormidium spp. (席藻屬)	0	20000	0	20000	40000	16000	16733	2.30
Dinophyta渦鞭毛藻門								
Protoperidinium spp. (原多甲藻屬)	0	1200	8800	1600	0	2320	3692	0.33
Chlorophyta綠藻門								
Closterium spp.	0	400	0	0	0	80	179	0.01
Coelastrum spp. 空星藻屬	76800	38400	0	38400	921600	215040	395911	30.94
Pediastrum spp. 盤星藻屬	192000	57600	0	0	0	49920	83249	7.18
Scenedesmus spp. 柵藻屬	264000	188800	0	36800	17600	101440	117851	14.59
Tribonema sp. 黃絲藻屬	14000	22000	8000	0	10000	10800	8075	1.55
Euglenophyta 裸藻門								
Phacus spp. 扁裸藻屬	0	0	0	0	2800	560	1252	0.08
Trachelomonas spp. 囊裸藻屬	3600	1600	0	1600	2800	1920	1368	0.28
總豐度 (Cells/L)	1060800	572800	36000	223200	1582800	695120	631230	100.00
種類數目	21	21	13	19	23	32		
種數豐度指數(Species Richness Index, SR)	1.44	1.51	1.14	1.46	1.54			
均勻度指數(Evenness Index, J')	0.71	0.76	0.83	0.82	0.45			
種歧異度指數(Shannon Diversity Index, H') (base 10)	0.93	1.01	0.92	1.04	0.61			
優勢度指數(Dominance Index, C)	0.16	0.15	0.15	0.11	0.40			

表2.9.1-2　　本季河口各測站之浮游植物相似度三角矩陣

測站	1D 大堀溪口	2D 觀音溪口	3D 小飯壢溪口	4D 新屋溪口	5D 社子溪口
1D 大堀溪口					
2D 觀音溪口	60.87				
3D 小飯壢溪口	4.23	8.67			
4D 新屋溪口	28.79	41.51	13.89		
5D 社子溪口	33.11	19.48	3.26	20.42	

表2.9.1-3　　本季河口各測站之浮游植物與水質因子相關分析

水質因子	相關係數	*P* 值
水溫	0.600	0.350
鹽度	-0.100	0.950
pH 值	0.100	0.950
溶氧量	0.051	0.950
生化需氧量	0.700	0.233
懸浮固體	-0.100	0.950
導電度	-0.100	0.950
正磷酸鹽	0.900	0.083
硝酸鹽	-0.300	0.683
矽酸鹽	0.500	0.450
硝酸鹽氮	-0.300	0.683
氨氮	0.700	0.233
總磷	1.000	0.017*
Chl a	0.200	0.783
鎳	-0.500	0.450
銅	-0.800	0.333
鉛	0.100	0.950
鋅	-0.100	0.950
鐵	-0.200	0.783
透明度	-0.300	0.683
大腸桿菌群	0.500	0.450

註：Spearman correlation analysis。顯著 * $p < 0.05$。




圖 2.9.1-1　　本季河口各測站之浮游植物種類及數量分布圖




圖 2.9.1-2　　本季河口浮游植物優勢種數量百分比




圖 2.9.1-3　　本季河口各測站之浮游植物之群集分析圖



圖 2.9.1-4　　本季河口各測站之浮游植物之 MDS 圖




圖 2.9.1-5　　本季河口各測站浮游植物豐度與葉綠素 a 濃度散布圖

空星藻屬(*Coelastrum*)



圖 2.9.1-6　　本季河口浮游植物優勢物種

2.9.2 浮游動物

河口生態調查時間為114年10月14日及15日，乾潮時間為10:17及11:45。調查期間各河口測站無發現異常狀況。

本季觀塘河口海域浮游動物之平均豐度為78,000 ± 7,178 ind./1,000 m^3，平均發現大類數12 ± 1種，平均豐富度指數1.011 ± 0.074，平均均勻度指數0.855 ± 0.010，平均種歧異度指數2.138 ± 0.046，平均優勢度指數0.143 ± 0.005**(表 2.9.2-1)**。浮游動物類群組成方面**(表 2.9.2-1、圖 2.9.2-1)**，本季之第一優勢類群為哲水蚤（Calanoida），平均豐15,200 ± 1,968 ind./1,000 m^3，佔總豐度的19.49%；第二優勢類群為劍水蚤（Cyclopoida），平均豐度為14,600 ± 2,012 ind./1,000 m^3，佔總豐度的18.72%；第三優勢類群為蝦類幼生（Shrimp larva），平均豐度為13,000 ± 1,166 ind./1,000 m^3，佔總豐度的16.67%；第四優勢類群為藤壺幼生（Barnacle nauplius），平均豐度為9,600 ± 1,315 ind./1,000 m^3，佔總豐度的12.31%；第五優勢類群為橈足類幼生（Copepoda nauplius），平均豐度為6,400 ± 1,187 ind./1,000m^3，佔總豐度的8.21%；第六優勢類群為蟹類幼生（Crab zoea），平均豐度為5,000 ± 632 ind./1,000 m^3，佔總豐度的6.41%。此六個主要優勢類群合計佔本季浮游動物總豐度的81.81%。

本季豐度在各測站中，以3D小飯壢溪口的豐度較高，為97,000 ind./1,000 m^3，1D大堀溪口豐度最低，為57,000 ind./1,000 m^3。大類數以3D小飯壢溪口發現16大類最多，而1D大堀溪口發現10大類最少。豐富度指數以3D小飯壢溪口最高(1.306)，1D大堀溪口最低(0.822)。至於均勻度指數最高值出現在4D新屋溪口(0.891)，最低則出現在2D觀音溪口(0.828)。歧異度指數最高值是3D小飯壢溪口(2.314)，最低則為1D大堀溪口(1.987)。優勢度指數變化相對較小，最高是1D大堀溪口(0.163)，而最低則是3D小飯壢溪口(0.130)(**表 2.9.2-1、圖 2.9.2-2~7**)。

由相似度分析結果顯示，本季河口各測站的浮游動物物種組成有一定程度的差異，各測站相似度介於78.57%~85.55%之間，其中相似度最高的測站為2D觀音溪口和3D小飯壢溪口，達85.55%，相似度最低的測站為1D大堀溪口和3D小飯壢溪口，為78.57%；以相似度80%為基準，可以將測站分為兩群，第一群有2D觀音溪口和3D小飯壢溪口，其餘均為第二群，主要是因為這兩測站的哲水蚤較多**(表 2.9.2-2、圖 2.9.2-8~9)**。此外，由本季所採得浮游動物樣本進行分析，發現本季各河口浮游動物豐度在測站間沒有顯著差異存在（ANOVA, F =0.199, $p > 0.05$）。

我們將本季各測站之浮游動物豐度與水質因子做相關性分析，結果顯示浮游動物豐度與海水溫度、海水鹽度及浮游植物豐度均無顯著相關，其中浮游動物豐度與浮游植物豐度的X-Y散布圖亦可發現相關係數*r*值不高，顯示兩者相關性頗低（**表2.9.2-3、圖2.9.2-10**）。

表2.9.2-1　　本季河口各測站之浮游動物監測結果統計表

測站	1D	2D	3D	4D	5D	平均	標準偏差	百分比
生物排水容積量(ml)	4.8	6.6	7.4	5.2	5.8	**6.0**	**0.4**	
有孔蟲 Foraminifera	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
放射蟲 Radiolaria	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
水母 Medusa	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
管水母 Siphonophora	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
櫛水母 Ctenophora	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
多毛類 Polychaeta	0	1,000	2,000	0	0	**600**	**358**	**0.77%**
翼足類 Pteropoda	2,000	2,000	1,000	2,000	0	**1,400**	**358**	**1.79%**
異足類 Heteropoda	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
端腳類 Amphipoda	1,000	0	2,000	0	1,000	**800**	**335**	**1.03%**
蟹類幼生 Crab zoea	3,000	7,000	5,000	4,000	6,000	**5,000**	**632**	**6.41%**
蟹類大眼幼蟲 Crab megalopa	0	0	1,000	0	0	**200**	**179**	**0.26%**
螢蝦類 Lucifera	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
櫻蝦類 Sergestidae	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
其他十足類 Other Decapoda	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
枝角類 Cladocera	0	1,000	1,000	0	0	**400**	**219**	**0.51%**
介形類 Ostracoda	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
橈足類幼生 Copepoda nauplius	6,000	3,000	5,000	7,000	11,000	**6,400**	**1,187**	**8.21%**
哲水蚤 Calanoida	15,000	21,000	19,000	9,000	12,000	**15,200**	**1,968**	**19.49%**
劍水蚤 Cyclopoida	7,000	16,000	21,000	15,000	14,000	**14,600**	**2,012**	**18.72%**
猛水蚤 Harpacticoida	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
蝦類幼生 Shrimp larva	11,000	16,000	14,000	9,000	15,000	**13,000**	**1,166**	**16.67%**
糠蝦類 Mysidacea	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
磷蝦類 Euphausiacea	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
藤壺幼生 Barnacle nauplius	9,000	15,000	9,000	6,000	9,000	**9,600**	**1,315**	**12.31%**
棘皮類幼生 Echinodermata larva	0	0	0	0	0	**0**	**0**	**0.00%**
毛顎類 Chaetognatha	0	7,000	4,000	1,000	1,000	**2,600**	**1,152**	**3.33%**
尾蟲類 Appendicularia	2,000	4,000	7,000	8,000	3,000	**4,800**	**1,035**	**6.15%**
海樽類 Thaliacea	0	0	3,000	0	2,000	**1,000**	**566**	**1.28%**
魚卵 Fish eggs	0	1,000	1,000	2,000	1,000	**1,000**	**283**	**1.28%**
仔稚魚 Fish larva	1,000	1,000	2,000	1,000	2,000	**1,400**	**219**	**1.79%**
豐度(ind./1,000 m^3)	**57,000**	**95,000**	**97,000**	**64,000**	**77,000**	**78,000**	**7,178**	**100.00%**
大類數	**10**	**13**	**16**	**11**	**12**	**12**	**1**	
種數豐富度指數(Species Richness Index, *SR*)	**0.822**	**1.047**	**1.306**	**0.904**	**0.978**	**1.011**	**0.074**	
均勻度指數(Evenness Index, *J'*)	**0.863**	**0.828**	**0.834**	**0.891**	**0.858**	**0.855**	**0.010**	
種歧異度指數(Shannon Diversity Index, *H'*) (base e)	**1.987**	**2.125**	**2.314**	**2.136**	**2.131**	**2.138**	**0.046**	
優勢度指數(Dominance Index，*C*)	**0.163**	**0.145**	**0.130**	**0.137**	**0.139**	**0.143**	**0.005**	

註:1D 大堀溪口、2D 觀音溪口、3D 小飯壢溪口、4D 新屋溪口、5D 社子溪口。

表2.9.2-2　　本季河口各測站之浮游動物相似度矩陣

測站	1D 大堀溪	2D 觀音溪	3D 小飯壢溪	4D 新屋溪
2D 觀音溪	81.84			
3D 小飯壢溪	78.57	85.55		
4D 新屋溪	84.48	83.91	81.41	
5D 社子溪	84.61	80.65	84.90	84.95

註:1D 大堀溪口、2D 觀音溪口、3D 小飯壢溪口、4D 新屋溪口、5D 社子溪口。

表2.9.2-3　　本季河口各測站之浮游動物與水質因子相關分析

水質因子	相關係數	*p* 值
水溫	-0.400	0.095
鹽度	-0.032	0.117
浮游植物	-0.365	0.062

註：Spearman correlation analysis。顯著 * $p < 0.05$。






圖 2.9.2-1　　本季河口浮游動物優勢大類數量百分比




註:1D 大堀溪口、2D 觀音溪口、3D 小飯壢溪口、4D 新屋溪口、5D 社子溪口。

圖 2.9.2-2　　本季河口各測站之浮游動物豐富度變化圖




註:1D 大堀溪口、2D 觀音溪口、3D 小飯壢溪口、4D 新屋溪口、5D 社子溪口。

圖 2.9.2-3　　本季河口各測站之浮游動物大類數變化圖




註:1D 大堀溪口、2D 觀音溪口、3D 小飯壢溪口、4D 新屋溪口、5D 社子溪口。

圖 2.9.2-4　　本季河口各測站之浮游動物豐富度變化圖




註:1D 大堀溪口、2D 觀音溪口、3D 小飯壢溪口、4D 新屋溪口、5D 社子溪口。

圖 2.9.2-5　　本季河口各測站之浮游動物均勻度變化圖




註:1D 大堀溪口、2D 觀音溪口、3D 小飯壢溪口、4D 新屋溪口、5D 社子溪口。

圖 2.9.2-6　　本季河口各測站之浮游動物歧異度變化圖




註:1D 大堀溪口、2D 觀音溪口、3D 小飯壢溪口、4D 新屋溪口、5D 社子溪口。

圖 2.9.2-7　　本季河口各測站之浮游動物優勢度變化圖



註:1D 大堀溪口、2D 觀音溪口、3D 小飯壢溪口、4D 新屋溪口、5D 社子溪口。

圖 2.9.2-8　　本季河口各測站之浮游動物群集組成之相似度圖



註:1D 大堀溪口、2D 觀音溪口、3D 小飯壢溪口、4D 新屋溪口、5D 社子溪口。

圖 2.9.2-9　　本季河口各測站之浮游動物群集分析圖




圖 2.9.2-10　　本季河口各測站浮游動物豐度與浮游植物豐度散布圖

哲水蚤（Calanoida）	蝦類幼生 (Shrimp larva)
	
劍水蚤 (Cyclopoida)	
	

圖 2.9.2-11　　本季河口浮游動物優勢大類

2.9.3 底棲生物

一、1D 大堀溪口

本測站位於桃園市觀音區大堀溪出海口附近潮間帶，本測站第 4 季採樣採獲 7 科 7 屬 7 種 18 隻生物個體，數量最多的種類為 *Scopimera bitympana* 雙扇股窗蟹 10 個體。以樣框覆蓋面積估算，本測站底棲生物密度為 24 隻/m^2。使用蝦籠採樣之單位努力採獲量為 0 個體/籠，以方籠採樣之單位努力採獲量為 0 個體/籠。本測站為第 4 季各測站中採獲生物個體數最少的測站(表 2.9.3-1、圖 2.9.3-1)。

二、2D 觀音溪口

本測站位於桃園市觀音區觀音溪出海口附近潮間帶，本測站第 4 季採樣採獲 8 科 8 屬 8 種 18 隻生物個體，數量最多的種類為 *Urothoe* sp.5 個體。以樣框覆蓋面積估算，本測站底棲生物密度為 21.33 隻/m^2。使用蝦籠採樣之單位努力採獲量為 1.33 個體/籠，以方籠採樣之單位努力採獲量為 0 個體/籠。本測站為第 4 季各測站中採獲生物物種數最多但個體數最少的測站(表 2.9.3-1、圖 2.9.3-1)。

三、3D 小飯壢溪口

本測站位於桃園市觀音區小飯壢溪出海口附近潮間帶，本測站第 4 季採樣採獲 3 科 3 屬 3 種 21 隻生物個體，數量最多的種類為 *Scopimera bitympana* 雙扇股窗蟹 11 個體。以樣框覆蓋面積估算，本測站底棲生物密度為 28 隻/m^2。使用蝦籠採樣之單位努力採獲量為 0 個體/籠，以方籠採樣之單位努力採獲量為 0 個體/籠。本測站為第 4 季各測站中採獲生物物種數最少的測站(表 2.9.3-1、圖 2.9.3-1)。

四、4D 新屋溪口

本測站位於桃園市新屋區新屋溪出海口附近潮間帶，本測站第 4 季採樣採獲 5 科 5 屬 5 種 24 隻生物個體，數量最多的種類為 *Scopimera bitympana* 雙扇股窗蟹 16 個體。以樣框覆蓋面積估算，本測站底棲生物密度為 32 隻/m^2。使用蝦籠採樣之單位努力採獲量為 0 個體/籠，以方籠採樣之單位努力採獲量為 0 個體/籠(表 2.9.3-1、圖 2.9.3-1)。

五、5D 社子溪口

本測站位於桃園市新屋區社子溪出海口附近潮間帶，本測站第 4 季採樣採獲 4 科 4 屬 4 種 25 隻生物個體，數量最多的種類為 *Scopimera bitympana* 雙扇股窗蟹 22 個體。以樣框覆蓋面積估算，本測站底棲生物密度為 32 隻/m^2。使用蝦籠採樣之單位努力採獲量為 0.67 個體/籠，以方籠採樣之單位努力採獲量為 0 個體/籠。本測站為第 4 季各測站中採獲生物個體數最多的測站(表 2.9.3-1、圖 2.9.3-1)。

就河口底棲動物採樣結果而言，可知物種數方面以節肢動物門的種數最多，佔全數的 57.14%；個體數方面仍然以節肢動物門的數量最多，共佔全數的 86.79%(表 2.9.3-2、圖 2.9.3-2、圖 2.9.3-3)。

各測站相似度介於 26.70-75.93%；其中以小飯壢溪口與新屋溪口間相似度 75.93%為最高；大堀溪口與社子溪口之間 26.70%為最低。(表 2.9.3-3)。

各測站優勢度指數(Dominance Index, *C*)介於 0.18-0.78 之間(表 2.9.3-1)。主要影響此數值的原因為社子溪口所採獲之 25 個生物個體含有 22 個體的雙扇股窗蟹，為此站之優勢物種，所以該數值顯得最高，而本季於觀音溪口採獲之 18 個個體即包含 8 個物種，無明顯優勢種，相較之下該數值顯得最低(表 2.9.3-1)。

在各測站中種歧異度指數(Shannon Diversity Index, *H'*)介 0.22-0.81 之間(表 2.9.3-1)，數值最高的為觀音溪口，因該站採獲 8 個物種。而最低值為社子溪口，主要是因為此站僅採獲 4 種底棲動物(表 2.9.3-1)。

均勻度指數(Evenness Index, *J'*)在各測站間之變化介於 0.36-0.90 (表 2.9.3-1)，均勻度取決於該測站的採獲個體數是否平均分布於各物種，越平均者數值越高，例如觀音溪口由於採獲的 8 種生物之個體數量均介於 1 至 5 之間，分布較其他站平均。而社子溪口的數值為最低，是因為出現了較大比例的尾鉤蝦科（22 隻個體，佔該站個體數之 88.0%）所致(表 2.9.3-1)。

種數豐度指數(Species Richness Index, *SR*)之值介於 0.66-2.42 之間(表 2.9.3-1)，其中以觀音溪口最高，此站均採獲 18 隻個體，並包含 8 種生物。最低小飯壢溪口，因為分別僅採獲 3 種生物(表 2.9.3-1)。

另由 Bray–Curtis Similarity 群集分析樹狀圖則顯示出與相似度所得到的相同結果。整體而言，第 4 季各站之間物種群聚均有部分相似，其中又以小飯壢溪口與新屋溪口相似度最高。其餘 3 站大堀溪口、社子溪口與觀音溪口測站彼此間互有不同的相似度 (圖 2.9.3-4、圖 2.9.3-5)。

觀察物種組成與測站位置可發現所有測站均有採獲雙扇股窗蟹，其中以社子溪口與新屋溪口所採獲之雙扇股窗蟹數量佔該測站比例最高（分別為 88.0%與 66.7%）。而四個測站均採獲尾鉤蝦科(僅社子溪口未採獲)，個體數量占比介於 11.1%-42.9%。上述兩物種為歷年監測主要

優勢物種，亦廣泛分布於台灣西海岸之河口與潮間帶沙質灘地，亦是本季採獲個體數量最多的物種，合計佔整體個體數之 78.3%。

本季河口各測站之底棲動物豐度與 30 項水質監測因子進行相關分析(Spearman correlation)，結果顯示底棲動物豐度與 pH 值有顯著正相關($r = 0.89$, $p < 0.05$)、與導電度有顯著正相關($r = 0.95$, $p < 0.05$)、與鐵濃度有顯著正相關($r = 0.98$, $p < 0.05$)、與鹽度數值有顯著正相關($r = 0.95$, $p < 0.05$)，與其餘水質數值則無顯著相關（表 2.9.3-4）。進一步觀察監測數值可得知大堀溪口與觀音溪口兩站的導電度與鹽度均較低，分別小於或等於 888 μmho/cm 與 0.4psu，其餘三站則均大於 5700 μmho/cm 與 3.1psu。一般而言，導電度越高代表水中溶解的鹽分（離子）越多，而各處河口水域的鹽分變化受到上游淡水影像起伏較大，具體是否影響該站生物豐度仍須長期追蹤觀察。

以變異數分析(ANOVA)檢驗本季於 5 個河口測站以方框於潮間帶高中低 3 個位置與蝦籠、魚籠共 5 次採樣所採穫之底棲動物個體數量，而五個河口測站間無顯著相關（ANOVA, $F = 0.12$, $p = 0.98$）。

表2.9.3-1　　本季河口各測站之底棲生物名錄

學名	中文名	大堀溪 1D	觀音溪 2D	小飯壢 3D	新屋溪 4D	社子溪 5D	Total	平均	標準偏差	百分比	標準差
Annelida	**環節動物門**										
Polychaeta	**多毛綱**										
Capitellidae	小頭蟲科										
Capitellidae sp.	小頭蟲科	1	0	0	1	0	**2**	0.40	0.25	1.89%	0.55
Glyceridae	吻沙蠶科										
Glyceridae sp.	吻沙蠶科	0	1	0	2	0	**3**	0.60	0.40	2.83%	0.89
Nereididae	沙蠶科										
Nereididae sp.	沙蠶科	1	0	0	0	0	**1**	0.20	0.20	0.94%	0.45
Orbiniidae	錐頭蟲科										
Orbiniidae sp.	錐頭蟲科	0	3	1	1	1	**6**	1.20	0.49	5.66%	1.10
Arthropoda	**節肢動物門**										
Malacostraca	**軟甲綱**										
Amphipoda	端足目										
Urothoidae	尾鉤蝦科										
Urothoe sp.	尾鉤蝦科	2	5	9	4	0	**20**	4.00	1.52	18.87%	3.39
Decapoda	十足目										
Diogenidae	活額寄居蟹科										
Diogenes rectimanus	直螯活額寄居蟹	0	0	0	0	1	**1**	0.20	0.20	0.94%	0.45
Dotillidae	毛帶蟹科										
Scopimera bitympana	雙扇股窗蟹	10	4	11	16	22	**63**	12.60	3.03	59.43%	6.77
Matutidae	黎明蟹科										
Matuta victor	勝利黎明蟹	0	1	0	0	0	**1**	0.20	0.20	0.94%	0.45
Ocypodidae	沙蟹科										
Ocypode ceratophthalm	角眼沙蟹	2	1	0	0	0	**3**	0.60	0.40	2.83%	0.89
Penaeidae	對蝦科										
Penaeidae sp.	對蝦科	0	2	0	0	0	**2**	0.40	0.40	1.89%	0.89
Portunidae	梭子蟹科										
Thranita crenata	鈍齒短槳蟹	0	0	0	0	1	**1**	0.20	0.20	0.94%	0.45
Stomatopoda	口足目										
Lysiosquillidae	琴蝦蛄科										
Lysiosquilla sp.	琴蝦蛄屬	1	0	0	0	0	**1**	0.20	0.20	0.94%	0.45
Mollusca	**軟體動物門**										
Bivalvia	**雙殼綱**										
Veneridae	簾蛤科										
Ruditapes philippinarum	花蛤	0	1	0	0	0	**1**	0.20	0.20	0.94%	0.45
Gastropoda	**腹足綱**										
Batillariidae	海蜷科										
Batillaria sordida	黑瘤海蜷	1	0	0	0	0	**1**	0.20	0.20	0.94%	0.45
科		7	8	3	5	4	**14**				
屬		7	8	3	5	4	**14**				
種類數		7	8	3	5	4	**14**				
個體數(隻)		18	18	21	24	25	**106**				
豐富度指數(Species Richness Index, SR)		2.08	2.42	0.66	1.26	0.93					
均勻度指數 (Evenness Index, J')		0.75	0.90	0.77	0.65	0.36					
歧異度指數(Shannon Diversity Index, H')		0.63	0.81	0.37	0.45	0.22					
優勢度指數 (Dominance Index, C')		0.35	0.18	0.46	0.48	0.78					
樣框內生物密度 (個體/m^2)		24.00	21.33	28.00	32.00	32.00					
樣框內生物個體數標準偏差		2.47	1.59	3.42	4.02	5.46					
樣框內平均生物密度 (個體/m^2)		27.47±4.77									
方籠單位努力採獲量(個體/蝦籠)		0.00	1.33	0.00	0.00	0.67					
蝦籠單位努力採獲量(個體/方籠)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					

註:豐富度指數(Species Richness Index, *SR*)、均勻度指數(Evenness Index, *J'*)、歧異度指數(Shannon Diversity Index, *H'*)、優勢度指數(Dominance Index, *C*)。

表2.9.3-2　　本季河口底棲生物各大類之種類數及總個體數

	物種數	個體數
環節動物門	4	12
節肢動物門	8	92
軟體動物門	2	2

表2.9.3-3　　本季河口各測站底棲生物之相似度值

測站	大堀溪口	觀音溪口	小飯壢溪口	新屋溪口	社子溪口
大堀溪口					
觀音溪口	41.01				
小飯壢溪口	46.70	55.98			
新屋溪口	53.76	60.29	75.93		
社子溪口	26.70	33.12	58.05	50.98	

表2.9.3-4　　本季河口各測站底棲生物與水質因子相關分析

水質因子	相關係數	*p* 值	水質因子	相關係數	*p* 值
大腸桿菌群	-0.04	0.95	溶氧量	0.70	0.19
化學需氧量	0.7.0	0.19	葉綠素 a	-0.55	0.34
水溫	0.83	0.08	鉛	0.87	0.05
正磷酸鹽	0.55	0.34	銅	0.39	0.52
生化需氧量	-0.59	0.29	鋅	-0.25	0.69
油脂	0.07	0.91	導電度	0.95	0.01*
矽酸鹽	0.16	0.79	總汞	ND,未檢出	
氨氮	-0.51	0.38	總鉻	-0.19	0.76
動植物性油脂	0.10	0.87	總磷	0.53	0.36
pH 值	0.89	0.04*	鎳	0.58	0.31
透明度	-0.52	0.37	懸浮固體	0.02	0.97
硝酸鹽	0.10	0.87	礦物類油脂	0.00	1.00
硝酸鹽氮	0.10	0.87	鐵	0.98	0.00*
鹽度	0.95	0.00*	鎘	ND,未檢出	
六價鉻	ND,未檢出		酚類	ND,未檢出	

註：Spearman correlation analysis。顯著 *$p < 0.05$。




圖 2.9.3-1　　本季河口各測站之底棲生物之種類數及個體數




圖 2.9.3-2　　本季河口底棲生物各大類物種數百分比




圖 2.9.3-3　　本季河口各測站之底棲生物各大類個體數百分比




圖 2.9.3-4　　本季河口各測站底棲生物之群集分析樹狀圖




圖 2.9.3-5　　本季河口各測站底棲生物之 MDS 圖

雙扇股窗蟹(*Scopimera bitympana*)	端足目尾鉤蝦科(*Urothoe*)
	

圖 2.9.3-6　　本季河口底棲生物優勢物種

2.9.4 魚類

本次河口生態調查時間為 114 年 10 月 15 日至 16 日。調查期間各河口測站無發現異常狀況。本年度(114 年 7 月)於桃園市境內，1D 大堀溪、2D 觀音溪、3D 小飯壢溪、4D 新屋溪及 5D 社子溪等之河口測站，進行河口魚類群聚生態調查，共調查記錄到 7 科 7 屬 8 種 50 尾河口魚類，包括：鯔科的鯔、笛鯛科的火斑笛鯛和約氏笛鯛、鑽嘴魚科的奧奈鑽嘴魚、鯛科的太平洋棘鯛、鰕虎科的花身鰕虎、慈鯛科的尼羅口孵魚及四齒魨科的凹鼻魨。本季採樣調查，未發現任何特有及保育類物種。

總魚類群聚而言，族群數量最多的魚種為尼羅口孵魚(21 尾，佔 42.0%)，其次為花身鰕虎(20 尾，佔 40.0%)及凹鼻魨(4 尾，佔 8.0%)，均屬於一般河口或淡水常見之魚種。各溪流河口魚類群及採獲狀況，分述如下(表 2.9.4-1)。

(一)1D 大堀溪

本年度(114 年)10 月調查共紀錄魚類 1 科 1 屬 1 種 21 尾。採獲魚種為尼羅口孵魚(21 尾，佔 100.0%))。為臺灣地區西部淡水或河口水域環境下常見的物種。優勢度指數(λ)為 1.00，多樣性指數(H’)為 0.00，Margalef 指標(SR)為 0.00，均勻度指數(J’)為 0.00，單位努力量(尾/籠)為 7.00。

(二)2D 觀音溪

本年度(114 年)10 月調查共紀錄魚類 1 科 1 屬 1 種 1 尾。採獲魚種鯔(1 尾，佔 100.0%)。為臺灣地區西部河口水域環境下常見的物種。優勢度指數(λ)為 1.00，多樣性指數(H’)為 0.00，Margalef 指標(SR)為 0.00，均勻度指數(J’)為 0.00，單位努力量(尾/籠)為 0.33。

(三)3D 小飯壢溪

本年度(114 年)10 月調查共紀錄魚類 2 科 2 屬 2 種 24 尾。採獲魚種為花身鰕虎(20 尾，佔 83.33%)及凹鼻魨(4 尾，佔 16.67%)。為臺灣地區西部河口水域環境下常見的物種。優勢度指數(λ)為 0.72，多樣性指數(H’)為 0.45，Margalef 指標(SR)為 0.31，均勻度指數(J’)為 0.65，單位努力量(尾/籠)為 8.00。

(四)4D 新屋溪

本年度(114 年)10 月調查共紀錄魚類 3 科 3 屬 4 種 4 尾。採獲魚種為火斑笛鯛、約氏笛鯛、奧奈鑽嘴魚及太平洋棘鯛(各 1 尾，佔 25.0%)。為臺灣地區西部淡水或河口水域環境下常見的物種。優勢度指數(λ)為 0.25，多樣性指數

(H’)為 1.39，Margalef 指標(SR)為 2.16，均勻度指數(J’)1.00，單位努力量(尾/籠)為 1.33。

(五)5D 社子溪

本年度(114 年)10 月調查無採獲任何魚類。優勢度指數(λ)為 0.00，多樣性指數(H’)為 0.00，Margalef 指標(SR)為 0.00，均勻度指數(J’)為 0.00，單位努力量(尾/籠)為 0.00。

從本季五個河口測站所採得樣品分析，所採獲之魚類以新屋溪在魚種數上為最多，以小飯壢溪在數量上為最多。

從本季五個河口測站所採得樣品分析，所採穫之魚類以大堀溪在魚種數上較多。與環境及水質因子進行相關性分析(**表 2.9.4-2**)，魚類豐度與環境因子皆無顯著相關，僅有鋅接近顯著相關。

表2.9.4-1　　本季河口各測站之魚類資源調查結果表(1/2)

樣站編號			1	2	3	4	5
測站名稱			大堀溪	觀音溪	小飯壢溪	新屋溪	社子溪
			DG	**KI**	**SFL**	**SU**	**SS**
			砂石場旁	觀音相旁	風車旁	小涼亭旁	永安漁港
季別			夏	夏	夏	夏	夏
鯔科	鯔	***Mugil cephalus***		1			
笛鯛科	火斑笛鯛	***Lutjanus fulviflamma***				1	
笛鯛科	約氏笛鯛	***Lutjanus johnii***				1	
鑽嘴魚科	奧奈鑽嘴魚	***Gerres oyena***				1	
鯛科	太平洋棘鯛	***Acanthopagrus pacificus***				1	
鯬科	花身鯬	***Terapon jarbua***			20		
慈鯛科	尼羅口孵魚	***Oreochromis niloticus***	21				
四齒魨科	凹鼻魨	***Chelonodon patoca***			4		
合計 7 科 7 屬 8 種 50 尾			**1 種**	**1 種**	**2 種**	**4 種**	**0 種**
			21 尾	**1 尾**	**24 尾**	**4 尾**	**0 尾**
Simpson 優勢度指數(λ)			1.00	1.00	0.72	0.25	0.00
Shannon-Wiener 多樣性指數(*H'*)			0.00	0.00	0.45	1.39	0.00
Margelef 指標(*SR*)			0.00	0.00	0.31	2.16	0.00
Pielou 均勻度指數(*J'*)			0.00	0.00	0.65	1.00	0.00
Standard Deviation 標準差(SD)			-	-	11.31	0.00	-
Standard Error 標準誤差(SE)			-	-	6.53	0.00	-

表2.9.4-1　　本季河口各測站之魚類資源調查結果表(2/2)

大堀溪										
科名	種名	學名	第一籠漁獲(尾)	第二籠漁獲(尾)	第三籠漁獲(尾)	總計漁獲(尾)	百分比(%)	努力量(尾/籠)	標準差(尾)	標準誤差(尾)
慈鯛科	尼羅口孵魚	***Oreochromis niloticus***	10	5	6	21	100.00%	7.00	-	-
觀音溪										
科名	種名	學名	第一籠漁獲(尾)	第二籠漁獲(尾)	第三籠漁獲(尾)	總計漁獲(尾)	百分比(%)	努力量(尾/籠)	標準差(尾)	標準誤差(尾)
鯔科	鯔	***Mugil cephalus***	0	1	0	1	100.00%	0.33	-	-
小飯壢溪										
科名	種名	學名	第一籠漁獲(尾)	第二籠漁獲(尾)	第三籠漁獲(尾)	總計漁獲(尾)	百分比(%)	努力量(尾/籠)	標準差(尾)	標準誤差(尾)
鯻科	花身鯻	***Terapon jarbua***	7	2	11	20	83.33%	8.00	4.20	1.40
四齒魨科	凹鼻魨	***Chelonodon patoca***	1	3	0	4	16.67%			
新屋溪										
科名	種名	學名	第一籠漁獲(尾)	第二籠漁獲(尾)	第三籠漁獲(尾)	總計漁獲(尾)	百分比(%)	努力量(尾/籠)	標準差(尾)	標準誤差(尾)
笛鯛科	火斑笛鯛	***Lutjanus fulviflamma***	1	0	0	1	25.00%	1.33	0.49	0.16
笛鯛科	約氏笛鯛	***Lutjanus johnii***	0	1	0	1	25.00%			
鑽嘴魚科	奧奈鑽嘴魚	***Gerres oyena***	0	0	1	1	25.00%			
鯛科	太平洋棘鯛	***Acanthopagrus pacificus***	0	1	0	1	25.00%			

表2.9.4-2　　本季河口各測站之魚類豐度與水質因子相關分析

水質因子	相關係數	*p* 值
透明度	0.554	0.332
導電度	-0.189	0.760
水溫	-0.757	0.139
pH 值	-0.584	0.302
鹽度	-0.200	0.747
溶氧量	-0.043	0.945
葉綠素 a	0.587	0.298
懸浮固體	0.505	0.386
總鉻	0.713	0.176
鎳	-0.193	0.755
銅	0.305	0.618
鋅	0.868	0.057
鉛	0.037	0.952
鐵	-0.354	0.559
硝酸鹽氮	0.374	0.536
硝酸鹽	0.376	0.533
氨氮	0.228	0.712
總磷	-0.650	0.235
正磷酸鹽	-0.616	0.269
矽酸鹽	-0.377	0.532
油脂	-0.135	0.828
動植物性油脂	-0.161	0.795

註：Spearman correlation analysis。顯著 * $p < 0.05$。

尼羅口孵魚 (*Oreochromis niloticus*)	花身鯽 (*Terapon jarbua*)
	
凹鼻鮀 (*Chelonodon patoca*)	
	

圖 2.9.4-1　　本季河口魚類優勢物種

2.9.5 總基礎生產力

河口生態調查時間為114年10月14日及15日，乾潮時間為10:17及11:45。調查期間各河口測站無發現異常狀況。

本次河口測站總基礎生產力，各河口介於 0.05-0.58 mg C/m^3/h，本次總基礎生產力皆低 (**表 2.9.5-1 及圖 2.9.5-1**)，與本季較過去 5 季浮游植物豐度較低吻合，但五測站之總基礎生產力相差不大。不同河口總基礎生產力與浮游植物豐度無顯著相關，也與其他水質因子無顯著相關，且與水體葉綠素 *a* 濃度也沒有顯著相關 (F =0.277, p =0.635) (**表 2.9.5-2、圖 2.9.5-2**)。

表2.9.5-1　　河口總基礎生產力比較表

地點	總基礎生產力 單位：mg C/m^3/h
大堀溪口	0.14
觀音溪口	0.24
小飯壢溪口	0.27
新屋溪口	0.05
社子溪口	0.58

註：本表主要呈現總基礎生產力數值，淨基礎生產力結果詳附錄十所示。

表2.9.5-2　　本季河口各測站之總基礎生產力與水質因子相關分析

水質因子	相關係數	*p* 值
浮游植物	0.300	0.683
水溫	-0.100	0.950
鹽度	0.900	0.083
pH 值	-0.300	0.683
溶氧量	0.600	0.350
生化需氧量	-0.100	0.950
懸浮固體	0.100	0.950
導電度	0.051	0.950
正磷酸鹽	0.700	0.233
硝酸鹽	-0.100	0.950
矽酸鹽	0.500	0.450
硝酸鹽氮	-0.300	0.683
氨氮	0.700	0.233
總磷	-0.800	0.333
Chl a	0.300	0.683
鎳	-0.100	0.950
銅	-0.100	0.950
鉛	-0.100	0.950
鋅	0.500	0.450

註：Spearman correlation analysis。顯著 * $p < 0.05$。




圖 2.9.5-2　　本季河口各測站總基礎生產力與葉綠素 a 濃度散布圖

2.10 漁業經濟

2.10.1 刺網現場生物採樣

本計畫於114年09月22日、10月14日及11月20日，於觀塘工業區沿岸海域施放刺網網具以採集生物樣本，以了解本季(114年09月~11月間)之專用港沿岸海域之魚類資源情況，並考量當時海況及潮汐情況，其網具施放位置及採樣時間略有變動。

114年09月22日清晨6時，於25°00´~25°01´N、121°00´~121°01´E之範圍內，進行刺網漁具施放及起網，其網具施放深度為20-30 m左右，本次網具施放時間約1.5小時。本次採樣漁獲僅由漁民協助，於進港後、在現場進行種類辨識、計數及量測重量，而本次所得漁獲共計每小時捕獲17.33尾，捕獲重量則為每小時12.5公斤，共分類出3科5種，其生物種類組成及各捕獲尾數等資料詳如**表2.10.1-1**所示。根據每小時捕獲尾數之結果來看，本月的優勢魚種為中國鯧 (*Pampus chinensis*)，捕獲數量為每小時6尾 (佔總捕獲樣本數的34.62 %)，而總捕獲重量則為每小時3.5公斤；其次則為海蘭德若鯵 (*Carangoides hedlandensis*)，為每小時捕獲4尾 (23.08 %)，總捕獲重量為每小時1公斤；第三優勢魚種則為每小時捕獲3.33尾之寬尾斜齒鯊 (*Scoliodon laticaudus*)，其總捕獲重量為每小時3公斤。而本次採樣並無採集到紅肉丫髻鮫。

114年10月14日之下午4點、於24°59´N、121°00´E進行刺網漁具施放，其回收網具時間為當日晚間6點，網具施放時間約2小時。本次採樣漁獲 (**圖2.10.1-1**)於進港後以冰藏方式保存、並攜回實驗室進行後續鑑種及拍照。本次漁獲共有魚類9尾(每小時4.5尾)、總重7.834公斤 (每小時3.917公斤)，共分類出6科6種 (**表2.10.1-2**)，各魚類外觀照片如**圖2.10.1-2**所示，其種類組成及各捕獲尾數等資料詳如**表2.10.1-2**。以每小時之捕獲尾數結果來看，本月的優勢魚種為黃帶圓腹鯡 (*Dussumieria elopsoides*)，每小時共捕獲2尾，佔總捕獲樣本數的44.45 %，其總捕獲重量則為每小時0.068公斤；其餘5個物種的單位漁獲尾數則皆為每小時0.5尾。本次採樣僅第一優勢物種之捕獲尾數較高，故於**圖2.10.1-3**列出此物種之尾叉長-體重分布圖，其餘物種之尾叉長 (部分魚種如無尾叉，則量取全長)及體重資訊，則列於**表2.10.1-2**中。由整體結果來看，黃帶圓腹鯡的尾叉長區間落在12.35-14.92 cm之間、體重範圍在25.01-44.73 g之間。而本次採樣作業並無捕獲到紅肉丫髻鮫。

114年11月20日之採樣時程為上午6時、開始進行刺網漁具施放，其位置範圍約在25°00´~25°01´N、121°00´~121°01´E之間，其網具施放深度為15-20 m左右，本次網具施放時間約2.5小時。本次採樣漁獲僅由於漁民協助，於進港後、在現場進行種類辨識、計數及量測重量。本次所得總漁獲量為每小時捕獲3.6尾，重量為每小時4.6公斤，共捕獲3科4種，其生物種類組成及各捕獲尾數等資料詳如**表2.10.1-3**。以每小時捕獲尾數結果來看，以鯔 (*Mugil cephalus*)為捕獲數量最高的魚種，為每小時捕獲2尾 (55.56 %)、每小時3公斤；第二優勢種為每小時捕獲0.8尾的鯧科魚類 (Stromateidae spp.) (22.22 %)，漁獲重量為每小時 1.2公斤；其餘2個物種皆為每小時捕獲0.4尾。而本次採樣作業則無採集到紅肉丫髻鮫。

綜合本季3次採樣結果來看，並無任何一個物種為3個月間皆有採集到；但若以其中任兩個月有採集到之物種來看，僅有中國鯧及鯧科魚類為9月及11月皆有採集到之物種。此外，在本次採樣結果中，沙拉真鯊 (*Carcharhinus sorrah*)、無斑圓尾鶴鱵 (*Strongylura leiura*)、雨傘旗魚 (*Istiophorus platypterus*)及中國鯧為首次在第4季被捕獲到之物種，但過去已有在其他季節捕獲到之紀錄，其中的雨傘旗魚更是歷年所有採樣以來，首次被捕獲到之魚種。由捕獲到的各魚種與其生態習性(如產卵期)、棲息環境 (如海底底質類型、離岸遠近等)或洄游行為等結果來看，真鯊科的魚種 (包含沙拉真鯊及寬尾斜齒鯊)是在熱帶地區的陸棚水域及沿近海水域中，數量最多且種類最多的鯊魚 (Musick et al., 2004)，其中的寬尾斜齒鯊通常會在夏季洄游至沿近岸水域產卵 (Chen et al., 2001)，因此在夏秋季常能在臺灣西北部沿岸海域採集到較多；而大口逆鉤鱵的主要產卵期則在9月到隔年1月之間(橫跨春、夏和秋季)，且通常會洄游至離岸較近的水域來進行產卵及育幼(Griffiths et al., 2005)，因此常在秋冬季時可捕獲到該魚種；而鯔則是在每年冬至過後，會洄游南下至台灣海域進行產卵，因此冬季時可捕獲到該魚種 (Lan et al., 2017)；多鱗四指馬鮁，主要棲息於砂泥底質之環境，其秋末至初春為主要的漁獲期，在冬季時尤其喜歡靠近岸水域棲息，亦為台灣西部海域的重要經濟漁獲物種之一 (Liao et al., 2017; Su et al., 2020)；鯧科魚類 (包含銀鯧、鐮鯧、中國鯧等)屬於多在夏~冬季時產卵，且會成群棲息於近沿岸海域 (Wang and Chen, 1995; Almatar et al., 2004; Kwak et al., 2008)，故常會在夏季至冬季期間能捕獲到較多，而該科魚類多喜好棲息環境為沿岸砂泥底質，亦與桃園沿岸海域之環境相似；而

其他捕獲到之魚類，如斑海鯰、海蘭德若鯵、大口逆鈎鯵等，也皆為臺灣西北部海域或全台周邊海域之常見種類，且與過去調查之當地漁民作業漁獲皆有相符。

表2.10.1-1本季刺網總捕獲科別、種類、單位尾數及單位總重量(114年09月22日)

物種	總尾數	單位尾數 (ind./hr)	單位重量 (kg/hr)
真鯊科 Carcharhinidae			
寬尾斜齒鯊 *Scoliodon laticaudus*	5	3.33	3
鯵科 Carangidae			
海蘭德若鯵 *Carangoides hedlandensis*	6	4	1
大口逆鈎鯵 *Scomberoides commersonnianus*	4	2.67	2
鯧科 Stromateidae			
中國鯧 *Pampus chinensis*	9	6	3.5
鯧科 Gen. spp.	2	1.33	3
總和	26	17.33	12.5
科數	3		
種數	5		

資料來源：114 年 09 月 22 日刺網現場採樣漁獲統計

表2.10.1-2本季刺網總捕獲科別、種類、單位尾數及單位總重量(114年10月14日)

物種	總尾數	單位尾數 (ind./hr)	尾叉長 (cm)	單位重量 (kg/hr)	體重 (g)
真鯊科 Carcharhinidae					
沙拉真鯊 *Carcharhinus sorrah*	1	0.5	57.45	0.767	1534
海鯰科 Ariidae					
斑海鯰 *Arius maculatus*	1	0.5	25.86	0.117	234.22
鶴鱵科 Belonidae					
無斑圓尾鶴鱵 *Strongylura leiura*	1	0.5	58.65	0.142	284.94
鯡科 Clupeidae					
黃帶圓腹鯡 *Dussumieria elopsoides*	4	2	12.35-14.92	0.068	25.01-44.73
旗魚科 Istiophoridae					
雨傘旗魚 *Istiophorus platypterus*	1	0.5	108.35	2.589	5178
鯖科 Scombridae					
高麗馬加鰆 *Scomberomorus koreanus*	1	0.5	35.95	0.234	468
總和	9	4.5		3.917	7834.9
科數	6				
種數	6				

資料來源：114 年 10 月 14 日刺網現場採樣漁獲統計


表2.10.1-3本季刺網總捕獲科別、種類、單位尾數及單位總重量(114年11月20日)

物種	總尾數	單位尾數 (ind./hr)	單位重量 (kg/hr)
鯔科 Mugilidae			
鯔 *Mugil cephalus*	5	2	3
馬鮁科 Polynemidae			
多鱗四指馬鮁 *Eleutheronema rhadinum*	1	0.4	0.24
鯧科 Stromateidae			
中國鯧 *Pampus chinensis*	1	0.4	0.16
鯧科 Gen. spp.	2	0.8	1.2
總和	9	3.6	4.6
科數	3		
種數	4		


資料來源：114 年 11 月 20 日刺網現場採樣漁獲統計




圖 2.10.1-1　　本季(10 月 14 日)之刺網採樣實際漁獲情況




雨傘旗魚 *Istiophorus platypterus*




高麗馬加鰆 *Scomberomorus koreanus*



無斑圓尾鶴鱵 *Strongylura leiura*



沙拉真鯊 *Carcharhinus sorrah*



斑海鯰 *Arius maculatus*



黃帶圓腹鯡 *Dussumieria elopsoides*

圖 2.10.1-2　　本季刺網捕獲魚類(114 年 10 月 14 日)




圖 2.10.1-3　　本季黃帶圓腹鯡之體長-體重分布圖(10 月 14 日)

2.10.2 漁業資源調查結果

桃園地區92～113年漁業從業人數隨著年別的推移而有所改變，大致可區分專職與兼職兩類，113年統計人數總計為2,232人，不論專兼職之類別，均是以主要從事沿岸漁業為主，沿岸漁業人數佔整體漁業從業人數的94.8 %(**表2.10.2-1**)，其中沿岸漁業從業人數於99年達到最高值(5,298人)，往後逐年下降，於104年開始出現小幅度回升(**圖2.10.2-1**)；其次為從事內陸漁撈的埤塘漁業，漁業人數僅佔整體漁業從業人數的4.8 %。魚苗部分之種類，僅出現野生烏魚苗與野生鰻魚苗兩種，其中烏魚苗產量自92年的9,565千尾一路下滑到98年的2,300千尾，隔年開始桃園地區就無捕撈烏魚苗之相關紀錄，可能與烏魚人工繁殖相關研究中烏魚苗量產技術研發成功，導致烏魚苗市場價格低靡，故漁民捕撈野生烏魚苗的意願降低，而鰻魚苗產量則在95年達到高峰(3,726千尾)後，產量開始減少，至113年，鰻魚苗產量僅剩24千尾(**表2.10.2-2**、**圖2.10.2-2**、**圖2.10.2-3**)。

桃園地區漁船總艘數於92年為759艘，113年已增加至774艘，其作業漁船多以動力漁筏(CTR)、動力舢舨(CTS)和未滿5噸之漁船(CT0)為主(**表2.10.2-3**及**圖2.10.2-4**)，其主要作業漁船在97年前以刺網船為最大宗(**圖2.10.2-5**)，從97年起刺網船數減少，而一支釣船數緩慢增加。漁業署為推動沿近海漁業資源復育，於106年訂定「刺網漁業轉型輔導措施」，提出輔導漁業執照登記為刺網漁業之漁船筏，以主營補助20萬元、兼營補助15萬元方式，辦理刺網漁業轉型成一支釣或曳繩釣漁業，故漁船數量自107年起以一支釣船為最多，其次為刺網船，其他漁具漁法則較少被漁民採用。

再由歷年產值產量分析顯示，近海漁業部分從 92 年逐漸增加，於 98 年達到高峰後，產量出現顯著起伏變化，於 105 年還有 124 噸之生產量，到了 113 年僅剩 4 噸(產值 1,940 千元)，而沿岸漁業之產量雖也有部分顯著變化之年份(98 年)，但整體平均來看屬於一穩定狀態，多維持於 600 噸上下，113 年產值為 235,091 千元(**表 2.10.2-4**、**圖 2.10.2-6**)。

表2.10.2-1　　桃園地區歷年漁業專職與兼業從業人數

	專職								
	沿岸漁業(人數)			近海漁業(人數)			內陸漁撈(人數)	內陸養殖(人數)	總計
年份	岸上人員	船員	小計	岸上人員	船員	小計			
92 年	-	324	324	-	-	-	-	-	1,561
93 年	472	755	1,227	-	412	412	-	10	1,649
94 年	463	751	1,214	-	410	410	-	93	1,717
95 年	681	750	1,431	-	379	379	-	109	1,919
96 年	1,174	2,788	3,962	-	764	764	-	20	4,746
97 年	1,414	1,618	3,032	-	764	764	-	20	3,816
98 年	1,407	1,633	3,040	-	854	854	-	20	3,914
99 年	1,413	1,635	3,048	-	858	858	-	22	3,928
100 年	600	739	1,339	-	444	444	-	10	1,793
101 年	706	773	1,479	-	386	386	-	9	1,874
102 年	594	922	1,516	-	430	430	-	13	1,959
103 年	500	1,586	2,086	-	224	224	-	-	2,310
104 年	252	920	1,172	-	-	-	-	2	1,174
105 年	208	889	1,097	-	-	-	-	2	1,099
106 年	-	1,055	1,055	-	-	-	-	2	1,057
107 年	-	1,058	1,058	-	-	-	-	2	1,060
108 年	-	577	577	-	-	-	-	-	577
109 年	-	623	623	-	-	-	-	-	623
110 年	-	643	643	-	-	-	-	-	643
111 年	-	655	655	-	-	-	-	-	655
112 年	-	662	662	-	-	-	-	7	669
113 年	-	650	650	-	-	-	-	7	657
	兼業								
	沿岸漁業(人數)			近海漁業(人數)			內陸漁撈(人數)	內陸養殖(人數)	總計
年份	岸上人員	船員	小計	岸上人員	船員	小計			
92 年	-	-	-	-	-	-	-	-	743
93 年	214	345	559	-	-	-	64	-	623
94 年	211	356	567	-	-	-	11	784	1,362
95 年	334	379	713	-	-	-	63	667	1,443
96 年	498	-	498	-	-	-	166	-	664
97 年	650	640	1,290	-	-	-	86	-	1,376
98 年	817	663	1,480	-	-	-	86	-	1,566
99 年	822	1,428	2,250	-	-	-	354	-	2,604
100 年	400	300	700	-	-	-	74	-	774
101 年	410	400	810	-	-	-	52	-	862
102 年	296	395	691	-	-	-	64	-	755
103 年	321	995	1,316	-	-	-	168	-	1,484
104 年	231	713	944	-	-	-	88	8	1,040
105 年	208	996	1,204	-	-	-	82	7	1,293
106 年	-	1,937	1,937	-	-	-	281	6	2,224
107 年	-	1,947	1,947	-	-	-	281	2	2,230
108 年	-	1,433	1,433	-	-	-	96	-	1,529
109 年	406	985	1,391	-	-	-	97	-	1,488
110 年	407	987	1,394	-	-	-	98	-	1,492
111 年	420	997	1,417	-	-	-	99	-	1,516
112 年	424	1028	1,452	-	-	-	109	-	1,561
113 年	430	1037	1,467	-	-	-	108	-	1,575

資料來源：92-113 年漁業統計年報




圖 2.10.2-1　　歷年漁業作業人數

表2.10.2-2　　桃園地區魚苗產量產值

年份	烏魚苗		鰻魚苗		總計	
	產量(千尾)	價值(千元)	產量(千尾)	價值(千元)	產量(千尾)	價值(千元)
92 年	9,565	2,713	386	4,873	9,951	7,586
93 年	8,040	2,178	1,278	25,926	9,318	28,104
94 年	3,345	1,234	3,058	103,758	6,403	104,992
95 年	2,565	1,041	3,726	43,593	6,291	44,634
96 年	2,150	1,110	1,115	28,830	3,265	29,940
97 年	3,000	6,550	823	34,441	3,823	40,991
98 年	2,300	2,760	250	9,750	2,550	12,510
99 年	-	-	34	1,179	34	1,179
100 年	-	-	12	829	12	829
101 年	-	-	4	-	4	-
102 年	-	-	1,704	119,280	1,704	119,280
103 年	-	-	9	450	9	450
104 年	-	-	12	1,248	12	1,248
105 年	-	-	12	1,200	12	1,200
106 年	-	-	9	736	9	736
107 年	-	-	53	8,687	53	8,687
108 年	-	-	64	2,948	64	2,948
109 年	-	-	20	1,038	20	1,038
110 年	-	-	40	2,054	40	2,054
111 年	-	-	10	590	10	590
112 年	-	-	5	310	5	310
113 年	-	-	24	1181	24	1181

資料來源：92-113 年漁業統計年報

表2.10.2-3　　桃園地區漁船規模與作業型態

年份	無動力舢舨(漁船數)	無動力漁筏(漁船數)				動力漁筏(漁船數)				
	一支釣	刺網	火誘網	一支釣	總計	刺網	火誘網	一支釣	延繩釣	總計
92	-	2	2	1	5	352	26	23	3	404
93	-	4	2	1	7	391	26	41	3	461
94	-	4	2	1	7	404	26	46	3	479
95	2	5	2	1	8	416	26	47	3	492
96	2	5	2	1	8	417	26	47	3	493
97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	2	-	-	3	3	299	-	54	-	353
101	2	-	-	3	3	293	-	54	-	347
102	2	-	-	2	2	290	-	48	1	339
103	2	-	-	2	2	306	-	45	1	352
104	3	-	-	2	2	308	-	51	-	359
105	3	1	-	2	3	317	-	55	-	372
106	3	-	-	2	2	311	-	56	-	367
107	3	-	-	2	2	291	-	61	2	354
108	3	-	-	2	2	287	-	62	2	351
109	2	-	-	2	2	283	-	63	3	349
110	2	-	-	1	1	263	-	83	3	349
111	2	-	-	2	2	212	-	133	3	348
112	3	-	-	2	2	212	-	133	3	348
113	3	-	-	2	2	210	-	127	3	340

年份	動力舢舨(漁船數)					漁船5噸以下(漁船數)				
	刺網類	其他網具類	延繩釣類	其他釣具類	總計	刺網類	其他網具類	延繩釣類	其他釣具類	總計
92	51	1	11	101	164	59	2	21	54	137
93	64	-	11	101	176	64	1	21	55	141
94	76	-	11	111	198	71	1	21	56	149
95	79	-	11	111	201	77	1	21	58	157
96	79	-	11	111	201	77	1	21	58	157
97	78	-	11	89	178	74	1	21	29	125
98	76	-	13	85	174	75	1	21	25	122
99	11	-	13	143	167	22	1	20	91	134
100	18	-	13	143	174	29	-	20	90	139
101	17	-	13	145	175	32	-	20	97	149
102	17	-	11	145	173	32	-	12	99	143
103	19	-	11	154	184	34	-	17	107	158
104	19	1	14	169	203	31	1	18	123	173
105	20	1	15	173	209	31	-	18	124	173
106	22	1	15	173	211	31	1	19	121	172
107	23	1	17	163	204	22	1	23	124	170
108	21	1	17	166	205	23	1	23	122	169
109	23	1	20	164	208	23	1	25	123	172
110	20	1	20	170	211	19	1	26	123	169
111	10	1	20	180	211	10	1	26	131	168
112	11	1	20	180	212	10	1	25	133	169
113	10	1	19	183	213	10	1	24	132	167

年份	漁船5噸以上，未滿10噸(漁船數)					漁船10噸以上，未滿20噸(漁船數)				
	刺網類	拖網類	延繩釣類	其他釣具類	總計	刺網類	延繩釣類	其他釣具類	其他	總計
92	10	-	2	10	25	11	2	2	6	21
93	11	-	2	10	26	11	2	2	6	21
94	15	-	2	10	30	15	2	2	6	25
95	15	-	2	11	31	15	2	2	6	25
96	15	-	2	11	31	15	2	2	6	25
97	16	-	2	2	23	11	2	2	6	21
98	15	-	2	6	26	12	2	1	7	22
99	6	-	2	15	26	9	2	10	7	28
100	6	1	2	14	23	8	2	9	-	19
101	6	1	2	14	23	6	2	9	-	17
102	5	1	3	13	22	6	1	-	-	18
103	5	-	3	12	20	6	3	9	-	18
104	5	-	3	13	21	7	3	9	-	19
105	5	-	4	13	22	7	2	9	-	18
106	5	-	4	12	21	7	2	9	-	18
107	4	-	5	11	20	5	3	10	-	18
108	4	-	5	11	20	5	3	10	-	18
109	4	-	4	11	19	5	3	10	-	18
110	4	-	4	11	19	5	2	10	-	17
111	1	-	4	14	19	5	2	11	-	18
112	1	-	4	14	19	5	3	11	-	19
113	1	-	4	15	20	5	3	11	-	19

年份	漁船20噸以上，未滿50噸(漁船數)				
	拖網類	刺網類	延繩釣類	其他	總計
92	1	-	1	1	3
93	1	-	1	1	3
94	1	-	1	1	3
95	1	-	1	1	3
96	1	-	1	1	3
97	-	-	-	-	-
98	-	-	-	-	-
99	-	-	-	-	-
100	-	-	-	-	-
101	-	-	1	-	1
102	1	-	-	-	2
103	2	-	4	-	6
104	2	1	8	-	11
105	2	1	7	-	10
106	2	1	7	-	10
107	2	1	7	-	10
108	2	1	7	-	10
109	2	1	7	-	10
110	2	1	7	-	10
111	1	2	7	-	10
112	1	2	7	-	10
113	1	2	7	-	10

註：97-99 年動力漁筏無資料

資料來源：92-113 年漁業統計年報




圖 2.10.2-2　　歷年魚苗產量




圖 2.10.2-3　　歷年魚苗產值





圖 2.10.2-4　　歷年動力漁船、筏



註：97-99 年缺動力漁筏之刺網資料，故刺網船數大幅減少

圖 2.10.2-5　　歷年漁業漁船數

表2.10.2-4　　桃園地區歷年漁業產值產量

年份	近海漁業			沿岸漁業		
	產量(公噸)	產值(千元)	平均價格(千元/公噸)	產量(公噸)	產值(千元)	平均價格(千元/公噸)
92	47	6,806	145	369	48,739	132
93	107	18,017	168	418	68,905	165
94	83	10,914	131	324	45,876	142
95	84	15,472	184	493	78,990	160
96	-	-	-	537	115,014	214
97	201	44,463	221	229	42,520	186
98	417	110,549	265	62	12,717	205
99	-	-	-	443	119,361	269
100	170	59,440	350	151	41,176	273
101	154	18,156	118	533	153,716	288
102	322	110,133	342	386	137,904	357
103	367	66,867	182	342	100,802	295
104	-	-	-	641	205,396	320
105	124	105,477	851	467	117,644	252
106	23	3,880	169	620	142,111	229
107	7	1,460	209	515	163,807	318
108	2	639	320	664	227,777	343
109	7	2,633	376	714	226,434	317
110	4	1,028	257	713	245,917	345
111	5	2,142	428	556	221,630	399
112	10	3,940	394	643	266,336	414
113	4	1,940	485	503	235,091	467

年份	內陸漁撈			內陸養殖		
	產量(公噸)	產值(千元)	平均價格(千元/公噸)	產量(公噸)	產值(千元)	平均價格(千元/公噸)
92	70	6,203	89	7,065	380,149	54
93	50	2,747	55	6,453	313,288	49
94	7	379	54	6,153	318,345	52
95	3	182	61	6,114	313,557	51
96	-	1	-	5,819	259,810	45
97	-	-	-	4,800	498,661	104
98	-	-	-	3,021	296,732	98
99	-	-	-	1,946	243,060	125
100	-	-	-	1,354	162,413	120
101	-	-	-	1,602	152,841	95
102	-	-	-	1,189	110,113	93
103	-	-	-	1,069	110,068	103
104	82	5,710	70	939	105,121	112
105	78	5,304	68	1,367	114,051	83
106	2612	111,823	43	1,281	101,481	79
107	3724	226,706	61	1,254	132,260	105
108	109	14,969	137	4,684	324,151	69
109	24	1,781	74	4,570	360,527	79
110	126	18,066	143	4,395	312,108	71
111	104	14,634	141	4,081	338,640	83
112	154	24,612	160	3,001	259,989	87
113	118	10,224	87	3,394	315,060	93

資料來源：92～113 年漁業統計年報




圖 2.10.2-6　　歷年漁業產量

本季在漁船數方面，竹圍地區之漁船筏數為424艘，主要以動力漁筏(CTR)和動力舢舨(CTS)為主，分別為210艘及126艘；而永安地區之漁船數為350艘，其中又以動力漁筏(CTR)、動力舢舨(CTS)及五噸以下(CT0)之漁船較多，分別為130艘、87艘及94艘 (**表2.10.2-5**)。在漁船筏作業型態方面，竹圍地區無動力舢舨主要作業型態為一支釣，無兼營；其動力漁筏(CTR)、動力舢舨(CTS)、五噸以下(CT0)、五噸以上未滿十噸 (CT1)、十噸以上未滿二十噸(CT2)漁船的主要作業型態常見有一支釣、刺網、延繩釣、流刺網，除動力漁筏(CTR)之外，其餘皆會互相兼營。動力漁筏(CTR)除了主要作業漁法外亦會兼營棒受網、焚寄網、捕魚苗等其他作業型態(**表2.10.2-6**)。在永安地區無動力漁船(包括無動力舢舨)主要作業型態為一支釣，兼營流刺網；其動力漁筏(CTR)、動力舢舨(CTS)、五噸以下(CT0)、五噸以上未滿十噸 (CT1)、十噸以上未滿二十噸(CT2)漁船的主要作業型態常見有一支釣、刺網、流刺網、延繩釣、底延繩釣、棒受網等，亦會相互兼營，其中十噸以上未滿二十噸(CT2)之作業漁船除了主要作業型態外，常常會隨漁期或漁獲魚種的改變而兼營2種以上不同作業型態之漁法。二十噸以上未滿五十噸(CT3)之主要作業型態為延繩釣、流刺網及單船拖網，並會兼營刺網、流刺網、籠具及一支釣。漁筏方面，無動力漁筏主要作業型態為一支釣，並無兼營其他漁法的情形；而動力漁筏除了主要作業漁法外，亦會兼營棒受網、焚寄網、籠具及捕魚苗等其他作業型態之漁法(**表2.10.2-7**)。

表2.10.2-5　　本季竹圍地區及永安地區漁船筏數

漁船噸級	竹圍地區(艘)	永安地區(艘)	合 計(艘)
動力漁筏(CTR)	210	130	340
無動力漁筏(CTY)	0	2	2
動力舢舨(CTS)	126	87	213
無動力舢舨(CTX)	2	1	3
五噸以下(CT0)	73	94	167
五噸以上未滿十噸(CT1)	8	12	20
十噸以上未滿二十噸(CT2)	5	14	19
二十噸以上未滿五十噸(CT3)	0	10	10
五十噸以上未滿一百噸(CT4)	0	0	0
一百噸以上未滿兩百噸(CT5)	0	0	0
兩百噸以上未滿五百噸(CT6)	0	0	0
五百噸以上未滿一仟噸(CT7)	0	0	0
一仟噸以上(CT8)	0	0	0
合　　計	424	350	774

資料來源：永安地區為中壢區漁會 114 年第 4 季統計值
竹圍地區為桃園區漁會 114 年第 4 季統計值

表2.10.2-6　　本季竹圍地區漁船筏之作業型態

噸級別	主漁業經營種類	兼漁業經營種類(1)	兼漁業經營種類(2)	兼漁業經營種類(3)
動力漁筏 (CTR)	一支釣	魴鱲	叉手網	
		刺網		
		流刺網		
	刺網	魴鱲	捕魚苗	
		一支釣	魴鱲	
			捕魚苗	
		捕魚苗	魴鱲	
		棒受網		
		焚寄網	捕魚苗	魴鱲
	延繩釣	一支釣	棒受網	
	流刺網	一支釣	捕魚苗	
		捕魚苗		
動力舢舨 (CTS)	一支釣	刺網		
		延繩釣		
		流刺網		
		捕魚苗		
	刺網	一支釣	捕魚苗	
	延繩釣	一支釣		
		刺網	一支釣	
		棒受網		
	流刺網	一支釣	籠具	
無動力舢舨 (CTX)	一支釣			
五噸未滿 (CT0)	一支釣	刺網		
		延繩釣		
		流刺網		
	刺網	一支釣	捕魚苗	
		焚寄網		
	延繩釣	一支釣		
		刺網	一支釣	
	流刺網	一支釣		
五噸以上未滿十噸 (CT1)	一支釣	流刺網		
	延繩釣	一支釣	籠具	
	流刺網	一支釣		
十噸以上未滿二十噸 (CT2)	一支釣			
	刺網	一支釣		
	延繩釣	一支釣		

資料來源：桃園區漁會 114 年第 4 季統計值

表2.10.2-7　　本季永安地區漁船筏之作業型態(1/2)

噸級別	主漁業經營種類	兼漁業經營種類(1)	兼漁業經營種類(2)	兼漁業經營種類(3)
動力漁筏 (CTR)	一支釣	魩鱙		
		刺網		
		籠具	延繩釣	
	刺網	魩鱙		
		一支釣	魩鱙	
			地曳網	
			延繩釣	
			籠具	魩鱙
				棒受網
		焚寄網		
		籠具	一支釣	捕魚苗
	流刺網	魩鱙		
		一支釣	魩鱙	籠具
		捕魚苗	魩鱙	
			籠具	
		棒受網	一支釣	籠具
		焚寄網		
		籠具		
無動力漁筏 (CTY)	一支釣			
動力舢舨 (CTS)	一支釣	刺網	延繩釣	
		流刺網		
		棒受網	流刺網	
		籠具		
	刺網	一支釣	籠具	
	延繩釣	一支釣	刺網	
	流刺網	一支釣		
	棒受網	一支釣		
無動力舢舨 (CTX)	一支釣	流刺網		
五噸未滿 (CT0)	一支釣	刺網		
		延繩釣	籠具	
		流刺網		
		籠具		
	刺網	一支釣		
	底延繩釣	流刺網		
	延繩釣	一支釣		
		刺網	一支釣	
		流刺網	一支釣	
		棒受網	一支釣	
	流刺網	一支釣		
	棒受網	一支釣	籠具	

表2.10.2-7　　本季永安地區漁船筏之作業型態(2/2)

噸級別	主漁業經營種類	兼漁業經營種類(1)	兼漁業經營種類(2)	兼漁業經營種類(3)
五噸以上未滿十噸 (CT1)	一支釣	刺網		
		延繩釣	籠具	
		流刺網		
		籠具	延繩釣	
	刺網	一支釣		
	延繩釣	一支釣	刺網	
	流刺網	一支釣		
十噸以上未滿二十噸 (CT2)	一支釣	刺網	棒受網	魩鱙
			籠具	魩鱙
		流刺網		
		棒受網	魩鱙	流刺網
		籠具		
	刺網	一支釣	棒受網	魩鱙
		棒受網	一支釣	
	底延繩釣	一支釣		
	流刺網	棒受網	籠具	魩鱙
二十噸以上未滿五十噸 (CT3)	延繩釣	刺網	一支釣	
			籠具	一支釣
	流刺網	籠具		
	單船拖網	刺網	籠具	
		流刺網	籠具	

資料來源：中壢區漁會 114 年第 4 季統計值

表2.10.2-8為本季竹圍地區各魚種供銷量及價格一覽表，由表中可知，在竹圍地區9～11月之供銷量分別為9,302.6公斤、7,036.4公斤和43,459.9公斤，其中又以日本真鱸、其他鯵和黑鯛之供銷量最多，分別為18,076.9公斤、6,507.8公斤和5,746.7公斤，其次為鯧魚、其他鯛、銀鯧、台灣馬加鰆、燕尾鯧和馬鮫科等種類，這些魚種之季別總供銷量皆在3,000公斤以上。至於月別供銷金額部份，本季供銷金額介於96～7,223,070元間變動。平均價格則以龍蝦科最高(1,579元/公斤)，其次為馬鮫科和銀鯧，平均單價為500元/公斤以上。整體而言，竹圍地區在9~11月當中其供銷量以11月最高(10月最低)，至於供銷金額同樣以11月最高(10月最低)。

表2.10.2-9為本季永安地區各魚種供銷量及價格一覽表。由表可知，永安地區9～11月之月別總供銷量分別為8,386公斤、5,454公斤和11,775公斤，其中以馬鮫科、其他石斑和紅甘鯵銷量最多，分別為13,296公斤、5,886公斤和2,000公斤，其

次為康氏馬加鰆和黃鰭鯛等種類，這些魚種之季別總供銷量皆在1,200公斤以上。至於月別供銷金額方面，本季供銷金額介於100,000～7,705,780元間變動。而平均價格則以銀鯧最高(1,000元/公斤)，其次為康氏馬加鰆、馬鮫科、鯷魚、其他石斑、紅甘鯵、黃鰭鯛和日本真鱸，平均單價為500元/公斤以上。由本季漁會供銷量之結果得知，本季竹圍的供銷量高於永安地區，總供銷多出34,183.9公斤(永安地區本季為25,615公斤，竹圍地區為59,798.9公斤)，且就漁獲供銷記錄表觀之，竹圍地區本季之漁獲種類與永安地區相較之下，竹圍地區多出虱目魚、黑鯛、其他鯛、白姑魚、其他笛鯛、點帶石斑、金錢魚、斑海鯰、海鱺、藍圓鯵、其他鯵、其他鰛、燕尾鯧、其他鯧、金梭魚科、鱵科、帶魚屬、鱔、其他鯡、花腹鯖、台灣馬加鰆、雨傘旗魚、其他鯊、魟類、單棘魨科、其他深海魚、花枝和龍蝦科。整體上，本季桃園地區產量最高的前五名依序為：日本真鱸 (18,277公斤)、馬鮫科 (16,380公斤)、其他鯵 (6,508公斤)、其他石斑 (5,886公斤)、黑鯛 (5,747公斤)；產值方面，依序為馬鮫科 (965萬元)、日本真鱸 (732萬元)、其他石斑 (298萬元)、鯷魚 (278萬元)、銀鯧 (268萬元)，本季總產量為8.5萬公斤，總產值為3,535萬元。

本季各標本戶之作業資訊如**表2.10.2-10**所示，前者是漁船噸級為動力漁筏(CTR)級之標本戶的作業情況，每艘船作業人數介於2～3人左右，後者則為漁船噸級在五噸以上未滿十噸(CT1)、十噸以上未滿二十噸(CT2)及二十噸以上未滿五十噸(CT3) 之標本戶的作業情況，每艘船作業人數介於3~6人左右。由**表2.10.2-11**及**表2.10.2-12**可看出，桃園地區之標本船本季之總作業天數以9月份較多，為90天，其次為11月的89天及10月的78天，至於作業漁法主要是刺網和一支釣為主，主要漁獲對象為烏魚、午仔和成仔丁等種類。總拍賣金額則介於2,927～472,090元間變動，其種類平均單價則介於57～897元/公斤間。

此外，本季標本戶之月別單位努力漁獲量(catch per unit effort, CPUE) 分別為5.3～128.6公斤/船天(9月)、4～129.3公斤/船天(10月)及5.2～136.8公斤/船天(11月)，而單位努力漁獲價值(income per unit effort, IPUE) 則在2,314～34,525元/船天(9月)、2,143~36,569元/船天(10月)及732~37,151元/船天(11月)間變動。由表可知，各標本戶各月份之作業天數與月別總漁獲量皆有所差異，單月CPUE最高相差達32倍之多。整體而言，本季標本戶以9月份之總作業天數較高(90船天)，月別平均CPUE最高為67.18公斤/船天(11月)。

根據漁船作業位置及CPUE可得知漁場大致位置，**圖2.10.2-8～圖2.10.2-10**為桃園地區114年9月至11月之CPUE分布圖，9月主要漁場位於O3和Q4，每小時平均產量為1.03公斤，10月主要漁場位於W10，每小時平均產量為1.22公斤，11月主要漁場位於W11和X8，每小時平均產量為2.37公斤。

為了解工業港區鄰近海域之漁獲狀況，將調查海域劃分成以下3區(如**圖2.10.2-11**所示)：1.北區-工業港區以北15公里內海域；2.南區-工業港區以北15公里內海域；3.參考區-竹圍漁港鄰近海域。**表2.10.2-14**為分區海域之作業情況及漁獲資料。**圖2.10.2-12**為本季分區海域漁獲量堆疊圖，11月為總漁獲量最高月份，約3,000公斤，10月約1,600公斤次之，9月為最低，其中南區在各月比例皆超過55％，為佔比最高的區域。由**圖2.10.2-13**月別CPUE圖來看，平均CPUE以北區1.77公斤/小時為最高，其次為南區1.68公斤/小時，參考區1.08公斤/小時為最低。

表2.10.2-8　　本季竹圍地區魚種供銷量及價格一覽表(1/2)

魚類名稱	供銷量(公斤)				供銷金額(元)				平均價格(元/公斤)			
	9 月	10 月	11 月	本季	9 月	10 月	11 月	本季	9 月	10 月	11 月	本季
日本真鱸	8.9	13.2	18,054.8	18,076.9	2,670	3,960	7,216,440	7,223,070	300	300	399.7	399.6
虱目魚		6.1		6.1		488		488		80		80
黑鯛	1		5,745.7	5,746.7	300		2,297,995	2,298,295	300		400	399.9
黃鰭鯛		1.9		1.9		665		665		350		350
其他鯛	36.1		3,470.9	3,507	5,646		694,560	700,206	156.4		200.1	199.7
白姑魚	5.9			5.9	628			628	106.4			106.4
鮸魚	145.8	85.6	4,385.3	4,616.7	69,628	33,876	2,174,075	2,277,579	477.6	395.7	495.8	493.3
其他笛鯛	3.7	36.8	3	43.5	1,110	10,530	900	12,540	300	286.1	300	288.3
點帶石斑	1,855.2	529.6	7.6	2,392.4	903,011	251,785	4,160	1,158,956	486.7	475.4	547.4	484.4
金錢魚	14.9	6.2	9.7	30.8	1,490	620	970	3,080	100	100	100	100
斑海鯰	10		27	37	100		270	370	10		10	10
海鱺	7			7	1,750			1,750	250			250
藍圓鯵	92			92	1,840			1,840	20			20
紅甘鯵	424.6	834.3	8.9	1,267.8	93,328	182,692	1,780	277,800	219.8	219	200	219.1
其他鯵	134.9	323.9	6,049	6,507.8	7,308	31,331	901,834	940,473	54.2	96.7	149.1	144.5
其他鰺		326.5	396.9	723.4		32,650	39,920	72,570		100	100.6	100.3
銀鯧	178	97.9	3,225.4	3,501.3	129,340	33,180	1,615,130	1,777,650	726.6	338.9	500.8	507.7
燕尾鯧	3,241.9	6.2		3,248.1	645,540	1,240		646,780	199.1	200		199.1
其他鯧		0.8		0.8		160		160		200		200
馬鮫科	1,148.9	298.5	1,636.3	3,083.7	573,250	143,280	1,229,770	1,946,300	499	480	751.6	631.2
金梭魚科			7	7			910	910			130	130
鰹科	44	52.1		96.1	1,428	1,563		2,991	32.5	30		31.1
帶魚屬		0.6	2.1	2.7		150	840	990		250	400	366.7
鱮	3.2			3.2	96			96	30			30

資料來源：114 年第 4 季桃園區漁會月報統計值　(漁獲種類俗名、中文名及學名請參照表 2.10.2-13)

表2.10.2-8　　本季竹圍地區魚種供銷量及價格一覽表(2/2)

魚類名稱	供銷量(公斤)				供銷金額(元)				平均價格(元/公斤)			
	9 月	10 月	11 月	本季	9 月	10 月	11 月	本季	9 月	10 月	11 月	本季
其他鯡	95.5	1,084	289	1,468.5	1,065	10,948	2,890	14,903	11.2	10.1	10	10.1
魩仔	200.0	40		240	40,000	8,000		48,000	200	200		200
花腹鯖	60.5			60.5	1,210			1,210	20			20
康氏馬加鰆	2.1	8.7	1.7	12.5	420	1,740	425	2,585	200	200	250	206.8
台灣馬加鰆	53.4	3,214.5	121.3	3,389.2	34,950	911,465	37,215	983,630	654.5	283.5	306.8	290.2
雨傘旗魚	53.2			53.2	1,596			1,596	30			30
其他鯊	1,378.2	41.2		1,419.4	40,376	1,236		41,612	29.3	30		29.3
魟類	20.6	3.2		23.8	262	96		358	12.7	30		15
單棘魨科	14.0			14	1,950			1,950	139.3			139.3
其他深海魚	64.8	24.6	18.3	107.7	6,887	4,910	3,395	15,192	106.3	199.6	185.5	141.1
花枝	1.3			1.3	260			260	200			200
龍蝦科	3.0			3	4,738			4,738	1,579.3			1,579.3
總計	9,302.6	7,036.4	43,459.9	59,798.9	2,572,177	1,666,565	16,223,479	20,462,221	276.5	236.8	373.3	342.2

資料來源：114 年第 4 季桃園區漁會月報統計值　(漁獲種類俗名、中文名及學名請參照表 2.10.2-13)

表2.10.2-9　　本季永安地區魚種供銷量及價格一覽表

魚類名稱	供銷量(公斤)				供銷金額(元)				平均價格(元/公斤)			
	9 月	10 月	11 月	本季	9 月	10 月	11 月	本季	9 月	10 月	11 月	本季
日本真鱸		200		200		100,000		100,000		500		500
黃鰭鯛	1,000	200		1,200	500,000	100,000		600,000	500	500		500
鯧魚	500		400	900	300,000		200,000	500,000	600		500	556
銀鯧	600		300	900	600,000		300,000	900,000	1,000		1,000	1,000
其他石斑	3,986	1,600	300	5,886	2,091,540	740,000	150,000	2,981,540	525	463	500	507
康氏馬加鰆	700	533		1,233	700,000	400,000		1,100,000	1,000	750		892
馬鮫科		2,921	10,375	13,296		1,460,780	6,245,000	7,705,780		500	602	580
紅甘鯵	1,600		400	2,000	800,000		200,000	1,000,000	500		500	500
總計	8,386	5,454	11,775	25,615	4,991,540	2,800,780	7,095,000	14,887,320	595	514	603	581

資料來源：114 年第 4 季中壢區漁會月報統計值 (漁獲種類俗名、中文名及學名請參照表 2.10.2-13)

表2.10.2-10　　本季標本戶之作業資訊一覽表(1/8)

標本戶	噸位	漁法	日期	作業區域	作業時數
朱船長	CT0	一支釣	114/09/03	V5	6
			114/09/06	X7	5
			114/09/07	W8	5
			114/09/08	U7	6
			114/09/10	S6	5
			114/09/14	T6	5
			114/09/20	V7	8
			114/09/25	W9	4
周船長	CT1	一支釣	114/09/01	V10	7
			114/09/02	V10	7
			114/09/03	X9	6
			114/09/04	W9	6
			114/09/05	W9	6
			114/09/07	W9	7
			114/09/11	W9	5
			114/09/12	X8	5
			114/09/13	W9	7
			114/09/14	W11	6
			114/09/15	V10	5
			114/09/16	X10	6
			114/09/17	W8	6
			114/09/18	X8	6
			114/09/20	W8	5
			114/09/25	W12	6
			114/09/27	W9	6
			114/09/28	V9	7
			114/09/30	W8	5
林船長(A)	CTR	刺網	114/09/02	Q5	6
			114/09/05	Q6	5
			114/09/09	V8	4
			114/09/10	P5	7
			114/09/22	U8	6
			114/09/23	V9	6
			114/09/24	V9	4

表2.10.2-10　　本季標本戶之作業資訊一覽表(2/8)

標本戶	噸位	漁法	日期	作業區域	作業時數
林船長(B)	CTR	其他	114/09/07	X8	10
			114/09/26	X7	12
			114/09/27	W7	10
張船長	CT2	其他	114/09/01	-	-
			114/09/02	-	-
			114/09/03	-	-
			114/09/13	-	-
			114/09/14	-	-
			114/09/15	-	-
			114/09/16	-	-
			114/09/17	-	-
			114/09/18	-	-
			114/09/19	-	-
			114/09/20	-	-
			114/09/29	-	-
			114/09/30	-	-
陳船長(A)	CTR	一支釣	114/09/01	D6	6
		刺網	114/09/11	F7	5
			114/09/16	J7	4
			114/09/28	F7	7
			114/09/29	E7	4
陳船長(B)	CTR	刺網	114/09/03	O3	4
			114/09/04	Q4	4
			114/09/05	R3	6
			114/09/10	N6	2
楊船長(A)	CT2	刺網	114/09/03	-	-
			114/09/05	-	-
			114/09/06	-	-
			114/09/12	-	-
			114/09/13	-	-
			114/09/14	-	-
			114/09/21	-	-
楊船長(B)	CT3	其他	114/09/02	-	-
			114/09/06	-	-
			114/09/12	-	-
			114/09/16	-	-
			114/09/24	-	-
			114/09/26	-	-
			114/09/27	-	-

表2.10.2-10　　本季標本戶之作業資訊一覽表(3/8)

標本戶	噸位	漁法	日期	作業區域	作業時數
鄭船長(B)	CTR	刺網	114/09/01	G7	4
			114/09/02	G7	12
			114/09/06	M3	4
			114/09/07	M4	3
鄭船長(A)	CTR	刺網	114/09/03	-	4
			114/09/09	-	4
			114/09/25	-	5
			114/09/26	-	3
			114/09/27	-	4
			114/09/28	-	6
			114/09/29	-	4
			114/09/30	-	4
謝船長	CT0	一支釣	114/09/06	-	3
			114/09/09	-	5
			114/09/12	-	5
			114/09/16	-	6
			114/09/19	-	5
朱船長	CT0	一支釣	114/10/01	V6	4
			114/10/02	V6	5
			114/10/03	X9	4
			114/10/04	U8	6
			114/10/07	Y4	5
			114/10/14	U8	6
周船長	CT1	一支釣	114/10/01	U9	7
			114/10/02	U9	6
			114/10/03	U9	7
			114/10/04	U9	6
			114/10/05	X7	7
			114/10/06	X9	4
			114/10/12	W8	6
			114/10/13	V8	5

表2.10.2-10　　本季標本戶之作業資訊一覽表(4/8)

標本戶	噸位	漁法	日期	作業區域	作業時數
林船長(A)	CTR	刺網	114/10/07	Q6	7
			114/10/08	Q5	8
			114/10/09	Q6	8
			114/10/10	Q6	9
			114/10/16	V8	5
			114/10/19	V8	8
			114/10/25	V8	4
			114/10/26	Q6	12
			114/10/27	V9	7
			114/10/28	V8	6
			114/10/29	V8	6
			114/10/31	V8	7
林船長(B)	CTR	其他	114/10/12	X7	12
			114/10/13	V5	12
張船長	CT2	刺網	114/10/12	-	-
			114/10/14	-	-
			114/10/19	-	-
			114/10/21	-	-
			114/10/25	-	-
			114/10/26	-	-
			114/10/28	-	-
			114/10/30	-	-
陳船長(A)	CTR	刺網	114/10/01	F7	12
			114/10/05	F7	3
			114/10/12	F7	4
陳船長(B)	CTR	刺網	114/10/05	N7	2
			114/10/15	N7	2
			114/10/16	P6	3
楊船長(A)	CT2	刺網	114/10/02	-	-
			114/10/03	-	-
			114/10/04	-	-
			114/10/05	-	-
			114/10/09	-	-
			114/10/10	-	-
			114/10/11	-	-
			114/10/14	-	-
			114/10/15	-	-
			114/10/31	-	-

表2.10.2-10　　本季標本戶之作業資訊一覽表(5/8)

標本戶	噸位	漁法	日期	作業區域	作業時數
楊船長(C)	CTR	刺網	114/10/07	W8	4
			114/10/08	Y8	4
			114/10/26	X8	4
			114/10/27	X10	4
			114/10/28	W10	4
			114/10/30	P6	3
			114/10/31	T5	3
楊船長(B)	CT3	其他	114/10/03	-	-
			114/10/10	-	-
			114/10/11	-	-
			114/10/16	-	-
			114/10/19	-	-
			114/10/25	-	-
			114/10/26	-	-
			114/10/28	-	-
			114/10/29	-	-
			114/10/30	-	-
鄭船長(B)	CTR	刺網	114/10/10	F7	11
			114/10/11	F7	2
			114/10/12	F7	9
鄭船長(A)	CTR	刺網	114/10/01	-	15
			114/10/02	-	22
			114/10/03	-	23
			114/10/11	-	25
謝船長	CT0	一支釣	114/10/03	-	5
			114/10/04	-	5
朱船長	CT0	一支釣	114/11/22	X10	5
			114/11/28	X10	4
			114/11/29	X10	6
			114/11/30	Y9	4
周船長	CT1	一支釣	114/11/07	V8	2
			114/11/08	W8	3
			114/11/24	W9	4
			114/11/30	W8	4

表2.10.2-10　　本季標本戶之作業資訊一覽表(6/8)

標本戶	噸位	漁法	日期	作業區域	作業時數
林船長(A)	CTR	刺網	114/11/01	V8	6
			114/11/03	V8	5
			114/11/04	V8	5
			114/11/05	V8	6
			114/11/06	V9	6
			114/11/07	V8	8
			114/11/08	Q5	8
			114/11/09	R5	8
			114/11/14	U8	7
			114/11/15	V9	6
			114/11/16	V9	5
			114/11/17	V9	6
			114/11/19	V7	9
			114/11/20	U8	8
			114/11/21	Q6	10
			114/11/23	Q6	9
			114/11/26	V8	5
			114/11/27	Q6	10
林船長(B)	CTR	其他	114/11/11	Y7	12
			114/11/24	X6	9
		刺網	114/11/30	V7	5
張船長	CT2	刺網	114/11/4	-	-
			114/11/5	-	-
			114/11/6	-	-
			114/11/7	-	-
			114/11/8	-	-
			114/11/11	-	-
			114/11/15	-	-
			114/11/16	-	-
			114/11/18	-	-
			114/11/20	-	-
			114/11/21	-	-
			114/11/22	-	-
			114/11/27	-	-

表2.10.2-10　　本季標本戶之作業資訊一覽表(7/8)

標本戶	噸位	漁法	日期	作業區域	作業時數
陳船長(A)	CTR	刺網	114/11/23	F7	11
			114/11/28	F7	12
			114/11/29	F7	17
			114/11/30	F7	5
陳船長(B)	CTR	刺網	114/11/23	K7	4
			114/11/28	K7	5
			114/11/29	G7	7
楊船長(A)	CT2	刺網	114/11/4	-	-
			114/11/7	-	-
			114/11/8	-	-
			114/11/11	-	-
			114/11/14	-	-
			114/11/15	-	-
			114/11/16	-	-
			114/11/18	-	-
			114/11/20	-	-
			114/11/22	-	-
			114/11/23	-	-
			114/11/25	-	-
			114/11/27	-	-
			114/11/28	-	-
楊船長(C)	CTR	刺網	114/11/5	W10	4
			114/11/6	X9	4
			114/11/20	W11	2
			114/11/21	V9	3
			114/11/22	X8	3
			114/11/23	X10	3
			114/11/28	W7	3
			114/11/29	V9	3
楊船長(B)	CT3	其他	114/11/5	-	-
			114/11/6	-	-
			114/11/7	-	-
			114/11/8	-	-
			114/11/9	-	-
			114/11/15	-	-
			114/11/20	-	-
			114/11/21	-	-
			114/11/22	-	-
			114/11/25	-	-

表2.10.2-10　　本季標本戶之作業資訊一覽表(8/8)

標本戶	噸位	漁法	日期	作業區域	作業時數
鄭船長(B)	CTR	刺網	114/11/29	L8	13
			114/11/30	K7	12
鄭船長(A)	CTR	刺網	114/11/28	-	8
			114/11/29	-	11
			114/11/30	-	5
謝船長	CT0	一支釣	114/11/25	-	6
			114/11/28	-	7
			114/11/30	-	7

註 1：作業時間及區域有部分標本戶未填寫

註 2：作業區域請參照圖 2.10.2-7

資料來源：114 年第 4 季本計畫問卷調查

表2.10.2-11　　本季竹圍地區標本戶作業資訊及漁獲一覽表

月別	標本戶	作業天數	作業漁法	主要漁獲種類	漁獲量(公斤)	總拍賣金額(元)	平均單價(元/公斤)	CPUE(公斤/船天)	IPUE(元/船天)
9 月	陳船長(A)	5	一支釣、刺網	成仔丁、午仔	67.5	13,577	201	13.5	2,715
	陳船長(B)	4	刺網	黑鯧	244.2	138,100	566	61.1	34,525
	鄭船長(B)	4	刺網	黑鯧、成仔丁	49	22,816	466	12.3	5,704
	鄭船長(A)	8	刺網	午仔、加志	52.4	20,542	392	6.5	2,568
10 月	陳船長(A)	3	刺網	成仔丁、午仔	31.5	7,140	227	10.5	2,380
	陳船長(B)	3	刺網	午仔	14.8	7,405	500	4.9	2,468
	鄭船長(B)	3	刺網	鱸魚、午仔、成仔丁	113.3	41,060	362	37.8	13,687
	鄭船長(A)	4	刺網	帕頭、午仔	16	8,814	552	4	2,203
11 月	陳船長(A)	4	刺網	午仔、烏魚	64.2	53,317	830	16.1	13,329
	陳船長(B)	3	刺網	午仔	231.3	101,283	438	77.1	33,761
	鄭船長(B)	2	刺網	午仔	29.9	26,860	897	15	13,430
	鄭船長(A)	3	刺網	午仔、鯷	65.6	35,400	540	21.9	11,800

註：漁獲種類俗名、中文名及學名請參照表 2.10.2-13

資料來源：114 年第 4 季本計畫問卷調查

表2.10.2-12　　本季永安地區標本戶作業資訊及漁獲一覽表(1/2)

月別	標本戶	作業天數	作業漁法	主要漁獲種類	漁獲量(公斤)	總拍賣金額(元)	平均單價(元/公斤)	CPUE(公斤/船天)	IPUE(元/船天)
9 月	朱船長	8	一支釣	石斑、黑格	77	33,104	430	9.6	4,138
	周船長	19	一支釣	石斑、成仔丁	161.9	47,659	294	8.5	2,508
	林船長(A)	7	刺網	尖鯊、斗鯧	274.8	106,300	387	39.3	15,186
	林船長(B)	3	其他	尖鯊、土魠	385.8	21,950	57	128.6	7,317
	張船長	13	其他	鎖管	424.8	177,000	417	32.7	13,615
	楊船長(A)	7	刺網	鯊、斗鯧	620.9	103,279	166	88.7	14,754
	楊船長(B)	7	其他	鯊、白北	605.7	42,087	69	86.5	6,012
	謝船長	5	一支釣	石斑	26.4	11,570	438	5.3	2,314
10 月	朱船長	6	一支釣	石斑、盤仔	64.1	24,601	384	10.7	4,100
	周船長	8	一支釣	成仔丁、石斑	75.6	17,147	227	9.5	2,143
	林船長(A)	12	刺網	白北、旗子	801.7	361,405	451	66.8	30,117
	林船長(B)	2	其他	土魠	100.8	43,925	436	50.4	21,963
	張船長	8	刺網	烏魚、力魚	488.4	132,318	271	61	16,540
	楊船長(A)	10	刺網	馬加、斗鯧	583.8	273,909	469	58.4	27,391
	楊船長(B)	10	其他	烏魚、鯊	1,293.4	365,688	283	129.3	36,569
	楊船長(C)	7	刺網	烏魚、七星	450.4	160,215	356	64.3	22,888
	謝船長	2	一支釣	石斑	10.8	5,200	481	5.4	2,600

表2.10.2-12　　本季永安地區標本戶作業資訊及漁獲一覽表(2/2)

月別	標本戶	作業天數	作業漁法	主要漁獲種類	漁獲量(公斤)	總拍賣金額(元)	平均單價(元/公斤)	CPUE(公斤/船天)	IPUE(元/船天)
11 月	朱船長	4	一支釣	金鯧、石斑	42.3	19,683	465	10.6	4,921
	周船長	4	一支釣	春子、石斑	20.8	2,927	141	5.2	732
	林船長(A)	18	刺網	烏魚、旗子	1,314.9	472,090	359	73.1	26,227
	林船長(B)	3	其它、刺網	白口、土魠	119.4	34,700	291	39.8	11,567
	張船長	13	刺網	烏魚、力魚	679.4	208,978	308	52.3	16,075
	楊船長(A)	14	刺網	烏魚、力魚	1,698.5	399,196	235	121.3	28,514
	楊船長(B)	10	其他	烏魚、午仔	587.0	208,357	355	58.7	20,836
	楊船長(C)	8	刺網	烏魚、午仔	1,094.5	297,211	272	136.8	37,151
	謝船長	3	一支釣	紅甘	31.0	8,141	263	10.3	2,714

註：漁獲種類俗名、中文名及學名請參照表 2.10.2-13
資料來源：114 年第 4 季本計畫問卷調查

表2.10.2-13　　本計畫調查發現之魚種俗名、中文名及學名對照表

俗名	中文名	學名
銅鏡	海蘭德若鯵	*Carangoides hedlandensis*
黑鯧	烏鯧	*Parastromateus niger*
白鯧、正鯧、支子	銀鯧	*Pampus argenteus*
暗鯧、黑鰭	鐮鯧	*Pampus echinogaster*
斗鯧	中國鯧	*Pampus chinensis*
白北、白腹仔	台灣馬加鰆	*Scomberomorus guttatus*
土魠	康氏馬加鰆	*Scomberomorus commerson*
馬加	中華鰆	*Scomberomorus sinensis*
	日本馬加鰆	*Scomberomorus niphonius*
	鰆	*Scomberomorus commerson*
透抽、小卷、中卷	真鎖管	*Loligo edulis Hoyle*
黑口、烏喉	黑域	*Atrobucca nibe*
白口、帕頭、黃順	白姑魚	*Pennahia argentatus*
春子	鱗鰭叫姑魚	*Johnius distinctus*
海鱷仔	海鱷	*Rachycentron canadum*
鯪魚	鯪魚	*Miichthys miiuy*
打鐵婆	川紋笛鯛	*Lutjanus sebae*
	松鯛	*Lobotes surinamensis*
正鯛、 加臘、嘉鱲	嘉鱲	*Pagrus major*
黃魚、黃瓜、黃花魚	大黃魚	*Larimichthys crocea*
海鯰	泰來海鯰	*Arius thalassinus*
	內爾海鯰	*Arius nella*
剝皮魚	七帶短角單棘鮭	*Thamnaconus septentrionalis*
	密斑短角單棘鮭	*Thamnaconus tessellatus*
	單角革單棘鮭	*Aluterus monoceros*
	短角單棘鮭	*Thamnaconus modestus*
	絨鱗副單棘鮭	*Paramonacanthus sulcatus*
	圓腹短角單棘鮭	*Thamnaconus hypargyreus*
	擬短角單棘鮭	*Thamnaconus modestoides*
黑鯛、烏格、黑格、厚唇	黑棘鯛	*Acanthopagrus schlegelii*
	澳洲黑鯛	*Acanthopagrus australis*
臭肉鱊	黃帶圓腹鯡	*Dussumieria elopsoides*
青鱗仔、鱊仔	黃小沙丁魚	*Sardinella lemuru*
午仔魚	小口馬鮁	*Polydactylus microstomus*
	五絲馬鮁	*Polydactylus plebeius*
	六指馬鮁	*Polydactylus sextarius*
	六絲馬鮁	*Polydactylus sexfilis*
	四指馬鮁	*Eleutheronema tetradactylum*
	多鱗四指馬鮁	*Eleutheronema rhadinum*
變身苦	金錢魚	*Scatophagus argus*
石斑 、過魚、黃斑	白線光腭鱸	*Anyperodon leucogrammicus*

俗名	中文名	學名
	玳瑁石斑魚	*Epinephelus quoyanus*
	瑪拉巴石斑魚	*Epinephelus malabaricus*
	藍點石斑魚	*Epinephelus coeruleopunctatus*
	點帶石斑魚	*Epinephelus coioides*
	鑲點石斑魚	*Epinephelus amblycephalus*
	七帶石斑魚	*Epinephelus septemfasciatus*
	青石斑魚	*Epinephelus awoara*
	吻斑石斑魚	*Epinephelus spilotoceps*
鱠	日本長鱸	*Liopropoma japonicum*
	東方鱸	*Niphon spinosus*
	條紋長鱸	*Liopropoma susumi*
赤筆仔	五線笛鯛	*Lutjanus quinquelineatus*
	月尾笛鯛	*Lutjanus lunulatus*
	火斑笛鯛	*Lutjanus fulviflamma*
	正笛鯛	*Lutjanus lutjanus*
赤鯊	赤鯊	*Dentex tumifrons*
花身仔	花身鯚	*Terapon jarbua*
	條紋鯚	*Terapon theraps*
龍尖	太平洋黃尾龍占	*Lethrinus atkinsoni*
	半帶龍占	*Lethrinus semicinctus*
	正龍占	*Lethrinus haematopterus*
	白鱲	*Gymnocranius griseus*
	尖吻龍占	*Lethrinus olivaceus*
	長身白鱲	*Gymnocranius elongatus*
	烏帽龍占	*Lethrinus lentjan*
	真白鱲	*Gymnocranius euanus*
	單斑龍占	*Lethrinus harak*
毛口	黃鯽	*Setipinna tenuifilis*
突鼻仔	芝蕪稜鯷	*Thryssa chefuensis*
牛舌	舌鰨科	*Cynoglossus arel*
烏魚	鯔	*Mugil cephalus*
紅甘	紅甘鯵	*Seriola dumerili*
白力、力魚	長鰳	*Ilisha elongata*
花飛、青輝	花腹鯖	*Scomber australasicus*
	白腹鯖	*Scomber japonicus*
白魚、白帶魚	白帶魚	*Trichiurus lepturus*
	南海帶魚	*Trichiurus nanhaiensis*
	日本帶魚	*Trichiurus japonicus*
黑毛	瓜子鱲	*Girella punctata*
	黃帶瓜子鱲	*Girella mezina*
	小鱗瓜子鱲	*Girella leonina*
鮸仔魚、甘仔魚	吉打副葉鯵	*Alepes djedaba*
	六帶鯵	*Caranx sexfasciatus*

俗名	中文名	學名
	甲若鰺	*Carangoides armatus*
	黃帶擬鰺	*Pseudocaranx dentex*
	巴布亞鰺	*Caranx papuensis*
大目瓜仔、大目巴攏，大目孔	脂眼凹肩鰺	*Selar crumenophthalmus*
七星	大口逆鉤鰺	*Scomberoides commersonnianus*
鐵甲	大甲鰺	*Megalaspis cordyla*
巴攏	藍圓鰺	*Decapterus maruadsi*
金槍、金鰛、紅杉、黃鱲鰺	布氏鰛鰺	*Trachinotus blochii*
銅盤	圓白鰛	*Ephippus orbis*
梅子魚	小黃花魚	*Larimichthys crocea*
飛黑虎	棘鬼頭刀	*Coryphaena equiselis*
飛烏	黑鰭鬚唇飛魚	*Cheilopogon cyanopterus*
青旗	無斑圓尾鶴鱵	*Strongylura leiura*
	扁鶴鱵	*Ablennes hians*
水針	斑鱵	*Hemiramphus far*
長印魚	長印魚	*Echeneis naucrates*
海鯇	大海鯇	*Megalops cyprinoides*
臭肚	褐臭肚魚	*Siganus fuscescens*
鯊	直齒真鯊	*Carcharhinus brevipinna*
	沙拉真鯊	*Carcharhinus sorrah*
	寬尾斜齒鯊	*Scoliodon laticaudus*
魴仔	南方龍紋鱝	*Rhynchobatus australiae*
成仔丁	斑海鯰	*Arius maculatus*
黃鰭鯛	黃鰭棘鯛	*Acanthopagrus latus*
肉魚、肉鯽仔	刺鰛	*Psenopsis anomala*
煙仔規、規仔	棕斑兔頭鮐	*Lagocephalus spadiceus*
	光兔頭鮐	*Lagocephalus inermis*
	月氏兔頭鮐	*Lagocephalus lunaris*
石鱸	星雞魚	*Pomadasys kaakan*
空阿	日本竹莢魚	*Trachurus japonicus*
厚殼	臀斑髭鯛	*Hapalogenys analis*

表2.10.2-14　　本季分區海域之作業情況及漁獲資料

月份	區域	作業漁船數	作業時數	漁獲量(公斤)	CPUE(公斤/小時)
9	北區	3	157	385	2.45
	南區	4	969	759	0.78
	參考區	2	82	83	1.01
	未知	5	-	1763	-
10	北區	5	401	589	1.47
	南區	5	709	919	1.30
	參考區	2	244	145	0.59
	未知	5	-	2392	-
11	北區	1	297	413	1.39
	南區	5	736	2179	2.96
	參考區	3	197	325	1.65
	未知	5	-	3062	-

註：部分標本戶未填作業區域及時間。

資料來源：114 年第 4 季本計畫問卷調查。




圖 2.10.2-7　　標本戶問卷調查作業海域位置圖




圖 2.10.2-8　　114 年 9 月桃園地區每單位努力漁獲量(CPUE)分布




圖 2.10.2-9　　114 年 10 月桃園地區每單位努力漁獲量(CPUE)分布




圖 2.10.2-10　114 年 11 月桃園地區每單位努力漁獲量(CPUE)分布




圖 2.10.2-11　分區海域範圍




圖 2.10.2-12　本季分區海域漁獲量堆疊圖




圖 2.10.2-13　本季分區海域月別 CPUE

2.11 礁體懸浮固體監測

2.11.1 每日漂沙監測

本季 10 - 12 月份(10/01 - 12/31)之逐時懸浮漂沙濃度監測資料詳見**附錄五**，測量方法為光學濁度計，懸浮漂沙濃度逐時資料(濃度單位： mg/L)。因漂沙監測儀器擺設位置設在潮間帶上，故會受到潮汐的影響導致退潮時期儀器會露出水面，所以在退潮時期儀器無法測得資料。符號「-」表示儀器出水面，「*」表示設備維修或維護無測值。

G2 區與保護區座標如下：

- G2 區 (25.036624,121.048518)
- 保護區(北永續利用區) (25.019278,121.032357)

圖 2.11.1-1 於 10 - 12 月份監測期間之資料顯示，本季 G2 區及保護區皆未發生懸浮固體濃度持續 300 小時大於 100 mg/L 的情形。G2 區最長區間為 2 小時(12/25 13:00 至 12/25 14:00)；保護區最長區間為 20 小時(10/23 02:00 至 10/23 22:00)。




圖 2.11.1-1　　漂沙濃度逐時資料時序列圖

2.11.2 海域空間濁度變化監測

一、ADCP 掃測軌跡及座標轉換

依據本案環境監測計畫，於工業區附近淺水海域空間上規劃 10 條以上沿著海岸與垂直海岸的測線，然隨著工程推進，棧橋與沉箱施作影響原規劃觀測航線，考量未來工業港位置及觀測時之安全因素，進行測線調整，並保持 10 條測線以上，相關內容詳見 1.8.2 節說明。

114 年 11 月 30 日之 ADCP 掃測軌跡如圖 2.11.2-1，兩台 ADCP 分別自 P01 至 P12 點及自 P12 至 P28 點沿測線掃測，各航程約在一小時至一個半小時完成整段航程的掃測，並連續觀測 12 小時，其掃測軌跡分別以紅色及藍色表示。




圖 2.11.2-1　　ADCP 掃測軌跡(114/11/30)

本報告將原 WGS84 座標係下之掃測軌跡轉換至 UTM 平面座標係並順時針旋轉約 45°，新的座標係如圖 2.11.2-2。




圖 2.11.2-2　　坐標系統示意圖

二、 流速流向特性

(一)流速剖面

工業港周遭潮流方向以漲潮流向西南，退潮流向東北，並以東西方向較為主導，故本報告大致以東西向分量作為討論。各測線的沿岸方向(東西向)流速分量剖面如圖 2.11.2-3，包括 14 條垂直於海岸的測線及 3 條平行於海岸的測線。

圖中橫軸為距離，縱軸為水深，顏色代表流速大小。下方小圖左至右依序為當天施測路徑、第三座液化天然氣接收站建港及圍堤造地新建工程，海氣象監測網之永安漁港潮位資料，以及當前水深。另以紅色區段表示當前施測的時段。

下圖依序為漲退潮期間各測線剖面流速變化，因應測點的採樣時間不同以及提前轉潮的情況下，退潮以 6 時至 12 時，漲潮以 3 時至 6 時及 12 時至 16 時作為觀測區間。

(1) 本次觀測各測線之東西向流速，整體平均為 0.03 m/s，漲潮時平均流速為 -0.14m/s，退潮時平均流速為 0.18 m/s。

(2) 依現有工業港建物影響潮流流速流向於本季測量涵蓋工業港範圍斷面測線情形如下：

(3) 漲潮時，涵蓋工業港範圍(X 座標 600~1200 公尺)之測線其東西向平均流速為-0.07m/s；涵蓋棧橋範圍(X 座標-400~0 公尺)之測線其整體東西向平均流速為-0.18m/s。

i. 退潮時，涵蓋工業港範圍(X 座標 600~1200 公尺)之測線其東西向平均流速為 0.12m/s；涵蓋棧橋範圍(X 座標-400~0 公尺)之測線其整體平均東西向流速為 0.20m/s。




圖 2.11.2-3 各測線漲退潮流速剖面(1/4)




圖 2.11.2-3 各測線漲退潮流速剖面(2/4)




圖 2.11.2-3 各測線漲退潮流速剖面(3/4)




圖 2.11.2-3 各測線漲退潮流速剖面(4/4)

(二)平均流場

平面流場如圖 2.11.2-4 與 2.11.2-5。圖中橫軸為沿岸方向，以最南側點位為零點，縱軸為向離岸方向，以最近岸之點位為-500 公尺，顏色代表流速大小，箭頭代表流向，下方小圖為第三座液化天然氣接收站建港及圍堤造地新建工程，海氣象監測網之永安漁港潮位資料，以紅色區段表示當前施測的時間。

平面流場是經由兩台 ADCP 測量後之結果所組成，因受限於船速關係，合成同一流場圖所需的觀測時間約為一小時至一個半小時。下圖各左側圖示為本次 114 年 11 月觀測之流場圖。

圖 2.11.2-4 右側為 109 年 11 月觀測結果做比對，此階段為工業港工程初期，建物尚未完全興建，故僅作為最初背景參考之流速。


圖 2.11.2-5 右側為 114 年 5 月觀測結果，用來對比不同季節的流速情形，且觀測時間之工業港工程建物進度與本次觀測週期相鄰。


透過上述的背景資訊說明本季 114 年 11 月空間流場情形:


(1) 全區整體流速平均為 0.19m/s，漲潮整體平均為 0.17 m/s，退潮整體平均為 0.19m/s。
(2) 漲潮時，西南向的水團因圍堤影響使工業港內流速降低，外圍水深較深的區域流速較快，港內平均流速為 0.04m/s，部分則經棧橋區流入港區。
(3) 退潮時，東北向的水團部分流入棧橋區，於棧橋下方進行水體交換，棧橋區平均流速為 0.37m/s，工業港內受建物影響，水體交換有限，流速偏慢。


114 第四季觀測
2025/11/30


109 第四季觀測
2020/11/19

































圖 2.11.2-4　　平均流場圖 114/11 與 109/11 同季節施工前後觀測比較


114 第四季觀測
2025/11/30
















114 第二季觀測
2025/05/15














圖 2.11.2-5　　平均流場圖，114/11 與 114/05 跨季節的觀測比較

三、懸浮固體濃度剖面

船拖 ADCP 掃測時記錄了不同水深處的回聲強度，經由 1.8.2 節所述之方法，根據回歸曲線(圖 2.11.2-6)轉換得懸浮固體濃度，其剖面如圖 2.11.2-7。圖中顏色代表濃度的高低，其他部分的意義同圖 2.11.2-3。




圖 2.11.2-6　　回歸曲線

根據 114 年 11 月觀測結果分析，懸浮濃度主要來源為底床再懸浮。底床再懸浮是根據 Van Rijn(1984)提出之海流流速門檻u_α^{cr}，代表著泥砂被海流帶起並運送至它處之臨界起動海流流速，臨界流速的值並不是固定的，其計算方式如式 2-1。

$$u_\alpha^{cr} = 0.19(d_{50})^{0.1}\log_{10}\left(\frac{4h}{d_{90}}\right) \qquad for \qquad 0.1 \le d_{50} \le 0.5mm \quad (2\text{-}1)$$

d_{90} 為 90%的質量顆粒由小於此粒徑大小之顆粒所組成，d_{50} 為中值粒徑，h 為水深。

下圖 2.11.2-7 依序為漲退潮期間各測線剖面懸浮濃度變化，因應測點的採樣時間不同以及提前轉潮的情況下，退潮以 6 時至 12 時，漲潮以 3 時至 6 時及 12 時至 16 時作為觀測區間。

本節以各測線斷面為依據，並以圖 2.11.2-2 工業港範圍以及涵蓋棧橋(淺水區)的範圍，各自分為以下的範圍，涵蓋工業港範圍(X 座標 600~1200 公尺)以及涵蓋棧橋範圍(X 座標-400~0 公尺)。

(1) 本季各測線之平均懸浮固體濃度，整體平均為 16.9 mg/L，漲潮時為 15.6 mg/L，退潮時為 18.0 mg/L。

(2) 依照現有工業港建物，本季測量涵蓋工業港範圍斷面測線之懸浮固體濃度情形如下：

i. 漲潮時，涵蓋工業港範圍之測線平均懸浮固體濃度為 12.0 mg/ L；涵蓋棧橋範圍之測線平均懸浮固體濃度為 17.7 mg/ L。

ii. 退潮時，涵蓋工業港範圍之測線平均懸浮固體濃度為 12.8 mg/ L；涵蓋棧橋範圍之測線平均懸浮固體濃度為 26.9 mg/ L。




圖 2.11.2-7 懸浮固體濃度剖面(1/3)






圖 2.11.2-7 懸浮固體濃度剖面(2/3)


漲潮 退潮


P21P22







P23P24







P25P26







P27P28





P04P05








圖 2.11.2-7　　懸浮固體濃度剖面(3/3)

圖 2.11.2-8 說明平均流場以及平均懸浮固體濃度分佈的情形，受兩艘船速限制影響，平均每小時至每一個半小時產生一次流場分佈圖。平均懸浮固體濃度於空間上變化以全域整體為 14.7 mg/L，漲退潮時段平均濃度分別為 14.0 mg/L 及 14.9 mg/L。工業港範圍內(X:600~1200,Y:2500~3500) 平均濃度為 6.3 mg/L，漲退潮時段平均濃度分別為 5.9 mg/L 及 6.8 mg/L。淺水區範圍 (X:-400~0,Y:3500~4000) 平均濃度為 26.4 mg/L，漲退潮時段平均濃度分別為 18.3 mg/L 及 31.1 mg/L。

平均流場　　平均懸浮固體濃度




圖 2.11.2-8 平均流場與平均懸浮固體濃度(1/2)




圖 2.11.2-8　　平均流場與平均懸浮固體濃度(2/2)

四、水樣懸浮固體濃度

本次懸浮固體採樣於 114 年 11 月 30 日執行，於每條垂直海岸的測線之中點分別採集表層、中層及底層之水體，於採水樣的相同時間空間有 ADCP 同步進行觀測，水體採樣為人工採樣，取漲退潮轉潮前各一段時間(10:00~14:00)，目的是為了當作當日的水體濃度的參照值。

測量得到的水體樣本懸浮固體濃度如圖 2.11.2-9 及表 2.11.2-1 所示。圖中橫軸為採樣站點名，縱軸為懸浮固體濃度。由圖表可知：

(1) 本次水體採樣濃度無明顯分層，整體漲潮平均濃度為 28.8mg/L；整體退潮平均濃度為 29.7mg/L。

(2) 本次採水於漲潮時 DT09 及 DT12 底層有較高的懸浮固體濃度為 78.7 mg/L 及 79.9 mg/L，本次水樣採取之懸浮固體濃度較今年第二季略高。




圖 2.11.2-9 水樣懸浮固體濃度，左圖為漲潮時段，右圖退潮時段。藍線為表層海水，紅線為中層海水，綠線為底層海水。

表 2.11.2-1 表層、中層及底層水體樣本懸浮固體濃度

點名	描述	濃度 [mg/L]			潮時
		表層	中層	底層	
DT01	P05P06 中點	19.1	23.5	23.2	漲潮
DT02	P07P08 中點	18.8	25.0	24.6	漲潮
DT03	P09P10 中點	21.4	21.9	23.7	漲潮
DT04	P11P12 中點	22.3	25.6	22.1	漲潮
DT05	P13P14 中點	20.1	25.1	22.2	漲潮
DT06	P15P16 中點	18.9	24.5	22.8	漲潮
DT07	P17P18 中點	21.3	25.3	22.6	漲潮
DT08	P19P20 中點	18.2	24.3	26.4	漲潮
DT09	P21P22 中點	28.4	34.1	78.7	漲潮
DT10	P23P24 中點	38.5	48.7	57.3	漲潮
DT11	P25P26 中點	23.6	39.0	40.6	漲潮
DT12	P27P28 中點	27.0	42.8	79.9	漲潮
DT13	P03P04 中點	23.1	22.5	22.4	漲潮
DT01	P05P06 中點	31.6	54.0	47.9	退潮
DT02	P07P08 中點	26.1	31.4	55.0	退潮
DT03	P09P10 中點	23.8	30.5	56.4	退潮
DT04	P11P12 中點	20.5	28.4	47.3	退潮
DT05	P13P14 中點	24.4	44.3	50.2	退潮
DT06	P15P16 中點	25.4	31.8	34.4	退潮
DT07	P17P18 中點	24.3	27.0	31.5	退潮
DT08	P19P20 中點	24.4	29.7	29.9	退潮
DT09	P21P22 中點	24.0	25.7	29.6	退潮
DT10	P23P24 中點	22.7	26.1	29.5	退潮
DT11	P25P26 中點	21.6	23.0	22.0	退潮
DT12	P27P28 中點	17.0	21.6	22.6	退潮
DT13	P03P04 中點	22.6	23.8	25.1	退潮

註：將濃度>70mg/L 以紅字標示

五、懸浮固體通量估算

不同測線之懸浮固體通量隨潮汐的變化情況如圖 2.11.2-10 垂直海岸的測線，以向東北通量為正值，向西南通量為負值；平行海岸的測線，以向外海通量為正值，向岸通量為負值。懸浮固體通量大小與當時流速流向以及背景懸浮固體濃度有關，流速流向通常由潮汐所主導。一般而言，漲潮期間之通量為負值，退潮期間之通量為正值，通量大小及方向會因漲退潮時間而有所延遲。

(1) 垂直海岸測線之懸浮固體通量其最大值可達 27.9mg/m^2/s，平均通量為 1.1 mg/m^2/s，平行海岸測線最大值-16.5 mg/m^2/s，平均通量為-1.5 mg/m^2/s。

(2) 目前幾次觀測下來，因外圍海提已逐漸完工，港內流速已逐漸趨緩，因此懸浮固體通量並無顯著變化。




圖 2.11.2-10 不同測線之懸浮固體通量隨潮汐的變化。左圖為垂直海岸測線之懸浮固體通量；右圖為平行海岸測線之懸浮固體通量

懸浮固體通量的空間變化情況如圖 2.11.2-11，並以表 2.11.2-2 紀錄各測線之淨通量值，各測線長度不同，面積也不盡相同，因此以下數據會以平均淨通量來說明比較。圖中藍線為各時段平均資料，紅線為平滑結果，右下角為測線位置圖。

(1) 受外圍圍堤影響流速及懸浮固體變化較小，通量變化並不明顯，但仍受到優勢流影響，通量傳輸於漲退潮間有所變化，並受冬季趨勢流影響，亦有東北向西南運輸之現象，各測線以 P05P06 最大有 64.2g/s 淨通量變化，此測線是距離工業港最遠之測線。

(2) 各測線受工業港圍堤範圍影響，愈靠近工業港則懸浮固體通量逐漸減小，主因為工業港內流速降低導致通量下降。以本次 P25P26 及 P27P28 測線而言平均僅有不到 0.1 g/s 之通量變化。

表 2.11.2-2 各測線淨通量

P01P02	P03P04	P05P06	P07P08	P09P10	P11P12
13.4g/s	17.2g/s	64.2g/s	39.7g/s	23.9g/s	9.0g/s
P13P14	P15P16	P17P18	P19P20	P21P22	P23P24
4.6g/s	-5.6g/s	7.4g/s	1.0g/s	-6.6g/s	-1.4g/s
P25P26	P27P28	P04P05	P08P25	P03P06	
<-0.1g/s	<0.1g/s	-5.5g/s	16.4g/s	29.6g/s	




圖 2.11.2-11 懸浮固體通量的空間變化情況(1/2)




圖 2.11.2-11 懸浮固體通量的空間變化情況(2/2)

2.12 辦理海域地形水深監測

114 年 10 月颱風季節後現場作業項目及施作期程如**表 2.12-1** 所示，陸域地形於 114 年 10 月 7 日~10 月 16 日間完成，海域地形於 114 年 10 月 4 日~10 月 13 日間完成。監測地點北起大堀溪出海北岸，南至永安漁港以南 2 公里，東起海岸線 EL.+2m 處，西至水深-35m 處。

表2.12-1 114年10月颱風季節後陸域及海域地形測量期程

類別	項目	工作期程
陸域地形	颱風季節後 陸域地形測量	114 年 10 月 7 日、 114 年 10 月 14 日、 114 年 10 月 15 日、 114 年 10 月 16 日。
海域地形	颱風季節後 海域地形測量	114 年 10 月 4 日、 114 年 10 月 5 日、 114 年 10 月 12 日、 114 年 10 月 13 日。

114 年觀音溪河口河道斷面監測作業施作期程如**表 2.12-1** 所示，於 114 年 12 月 1 日間完成。

表2.12-1 114年觀音溪河口河道斷面監測作業期程

類別	項目	工作期程
海域地形	114 年第 4 季 觀音溪河口河道斷面監測作業	114 年 12 月 1 日

2.12.1 陸域地形測量調查成果

114 年颱風季節後陸域地形測量作業，於 114 年 10 月 7 日開始施測，至 114 年 10 月 16 日止完成作業，現場調查作業相片如**圖 2.12.1-2** 所示。

作業人員分別採用 RTK 及全站式電子經緯儀進行規劃測線上地形測量工作，現場施測點位共有 6,309 點，完成之施測點位如**圖 2.12.1-1** 所示。相關分析將與海域地形測量調查成果一併討論。




圖 2.12.1-1　　114 年 10 月颱風季節後陸域施測點位圖



圖 2.12.1-2　　陸域地形調查現場作業相片

2.12.2 海域地形測量調查成果

114 年颱風季節後海域地形測量作業，於 114 年 10 月 4 日開始施測，至 114 年 10 月 13 日止完成作業，現場作業相片如**圖 2.12.2-1** 所示。

現場工作船以約 10 公里/小時左右的速度施測，每秒以電腦擷取 1 筆水深地形資料，沿測線上約每 3 公尺即有 1 測點，完成之施測航跡如**圖 2.12.2-2** 所示。


	
儀器架設	資料收錄
	
校正板校驗	聲速量測
	
GPS 率定	潮位站設置 (SBE 39)
	
觀塘施工區現場施工情形	觀塘施工區現場施工情形

圖 2.12.2-1　　海域地形測量現場作業相片




圖 2.12.2-2　　114 年 10 月颱風季節後海域施測航跡圖

將陸域測量部分之數值地形資料與海域水深測量資料合併繪製全區地形圖，114 年 10 月颱風季節後水深地形等深線如**圖 2.12.2-3**，水深地形影像如**圖 2.12.2-4** 所示，AutoCAD 格式地形圖如**圖 2.12.2-5** 所示。




圖 2.12.2-3　　114 年 10 月颱風季節後水深地形等深線圖




圖 2.12.2-4　　114 年 10 月颱風季節後地形水深影像圖




圖 2.12.2-5　　114 年 10 月颱風季節後 CAD 格式地形圖

現依水深測量規劃測線選取 9 個斷面進行斷面水深變化探討及坡降分析，斷面水深分析之分析網格採 10 公尺，分析斷面位置圖如**圖 2.12.2-6** 所示，施測斷面位置控制點座標如**表 2.12.2-1** 所示，各斷面 114 年 10 月颱風季節後底床高程變化圖如**圖 2.12.2-7** 所示。

施測區域附近之海域地形之等深線呈扇形之分佈，其走向由西南西向逐漸轉為西南向，再轉為南南西向，呈現弧形曲線，而等高線及等深線之分佈間隔極為均勻，顯示其坡度極為穩定，變化較少，其於離岸方向之坡度約為 0.95%，水深斷面里程及坡降分析如**表 2.12.2-2～表 2.12.2-3** 所示。

施測海域水深 0m 以上之平均坡度約為 2.52%，水深 0~-10m 間平均坡度約為 1.11%，水深-10~-20m 間平均坡度約為 0.92%，水深-20~-30m 間平均坡度約 0.92%；水深-30m 離海岸線 2,849~4,020 公尺間，由底床高程變化斷面 S04 (塘尾海濱) 以南底床坡度有漸緩趨勢，全斷面之坡降由 1.13%漸緩至 0.78%。

表2.12.2-1　　分析斷面控制點坐標

斷面編號	近岸端點		離岸端點		方位角(度)	備註
	X(E)	Y(N)	X(E)	Y(N)		
S01	259561.58	2772460.00	257916.75	2775770.00	333.58	大堀溪口南側
S02	258607.08	2771700.00	256751.68	2774970.00	330.43	白玉海濱
S03	257290.00	2770808.25	255129.03	2774040.00	326.23	觀音溪口南側
S04	255827.30	2770450.00	253780.00	2773126.96	322.59	塘尾海濱
S05	254460.00	2769232.58	252133.17	2771810.00	317.93	電廠進出水口間
S06	253430.00	2767903.61	250830.00	2770648.00	316.55	海岸保護工程段
S07	252489.96	2766360.00	249590.00	2769065.20	313.01	新屋溪口南方
S08	251720.00	2764981.95	248540.00	2767637.22	309.86	永安漁港北側
S09	251456.31	2763388.87	247980.00	2766272.62	309.68	笨港海濱

表2.12.2-2　　114年10月各分析斷面主要水深斷面里程

高程／斷面	近岸端里程	近岸端高程	0m	-5m	-10m	-20m	-30m	離岸端里程	離岸端高程
S01	44.67	0.41	171.25	664.15	969.64	1994.69	3216.13	3696.16	-33.72
S02	14.35	1.68	49.20	449.18	910.29	1984.21	3261.55	3759.71	-34.94
S03	0.00	1.56	132.21	700.37	1090.25	2187.97	3296.52	3887.67	-32.52
S04	44.94	3.12	110.66	631.84	865.30	1616.28	-	3370.10	-34.44
S05	23.47	2.38	268.32	560.60	905.78	1808.65	2849.41	3458.88	-35.34
S06	43.62	0.63	64.19	554.20	1106.67	2115.59	3165.59	3780.43	-35.34
S07	58.64	-0.37	-	726.49	1178.45	2442.30	3324.26	3965.84	-35.50
S08	28.16	-0.18	-	521.52	986.30	2640.55	3640.67	4142.81	-35.44
S09	0.00	-0.09	-	919.11	1294.30	2773.29	4020.23	4516.72	-35.44

單位：公尺

表2.12.2-3　　114年10月斷面坡度表

範圍 / 斷面	全斷面	0m 以上	0m ~-5m	0m ~-10m	-10m ~-20m	-20m ~-30m
S01	0.93	0.32	1.01	1.25	0.98	0.82
S02	0.98	4.82	1.25	1.16	0.93	0.78
S03	0.88	1.18	0.88	1.04	0.91	0.90
S04	1.13	4.74	0.96	1.33	1.33	0.91
S05	1.10	0.97	1.71	1.57	1.11	0.96
S06	0.96	3.06	1.02	0.96	0.99	0.95
S07	0.90	-	0.69	0.88	0.79	1.13
S08	0.86	-	0.98	1.04	0.60	1.00
S09	0.78	-	0.53	0.77	0.68	0.80
平均	0.95	2.52	1.00	1.11	0.92	0.92

單位：%




圖 2.12.2-6　　分析斷面位置圖




圖 2.12.2-7　　114 年 10 月斷面底床高程變化圖

2.12.3 觀音溪河口河道斷面監測作業

一、現場調查成果

觀音溪河口河道斷面監測作業採用 RTK 及全測站式電子經緯儀進行規劃測線上測量工作。現場測量係先以 RTK 進行控制點檢測，經檢核無誤後，再進行沙灘地形測量；堤防部分使用全測站經緯儀進行測量。

114 年 12 月 1 日為 114 年第 2 次現場施測，現場作業相片如**圖 2.12.3-1** 所示，RTK 及全測站共有 1,094 個測點，施測點位位置如**圖 2.12.3-2** 所示。觀音溪河口地形等高線如**圖 2.12.3-3** 所示，現場施測往外海方向測至高程-1.0m 以下。

<table>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>沙椿高程(RTK 量測_A 點)</td><td>RTK 基站(DT03)</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>全站儀量測(TS22-1)</td><td>全站儀河道測量</td></tr>
<tr><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>RTK 測量</td><td>RTK 控制點檢核(TS22)</td></tr>
<tr><td colspan="2">  </td></tr>
<tr><td colspan="2">俯瞰全景</td></tr>
</table>

圖 2.12.3-1　觀音溪河口河道斷面監測現場作業相片(114 年 12 月 1 日)




圖 2.12.3-2　　觀音溪河口地形施測點位圖(114 年 12 月 1 日)




圖 2.12.3-3　　觀音溪河口地形等高線圖(114 年 12 月 1 日)

二、河道中心線底床高程

114 年 12 月觀音溪河道中心線如**圖 2.12.3-4** 所示，觀音溪河道於海堤範圍內(里程 125 公尺內)流向為 320 度，於離海堤開口後逐漸轉往西北西向(298~314 度)流動，河道里程 125~205 公尺間逐漸轉往西北西向(298~314 度)流動，里程 205~275 公尺間河道轉往西南西向(251~266 度)流動，里程 275~283 公尺間河道轉往西北向(288 度)流動，里程 383~320 公尺間河道轉往西北向(319 度)於淺灘流出。

114 年 12 月觀音溪河道中心線的底床高程變化如**圖 2.12.3-5** 所示，從陸側高程+1.09m(便橋外側)到外海高程為+0.67m(中心線里程 320 公尺)，全斷面平均坡降為 1/748，於里程 300 公尺以外河道已不明顯，略呈漫水狀態；全斷面底床高程最高處位於里程 158 公尺處，高程為+1.38m，現場施測當日該處河道仍有溪水通過，里程 300 公尺內皆可明顯辨識河道位置。

三、斷面底床高程分析

觀音溪河口斷面分析位置如**圖 2.12.3-6** 所示，離海堤 350 公尺內之斷面底床高程變化如**圖 2.12.3-7**~**圖 2.12.3-11** 所示，現場施測 RTK 共執行 24 個斷面，經監測結果分析，斷面 13(SEC13)往下游方向後之斷面(SEC14~SEC24)河道位置已無法明顯辨識，繪製、分析觀音溪河口斷面高程時仍以斷面 1~斷面 15(SEC01~SEC15)之高程變化進行呈現。

河道順兩岸堤防往西北向流出(SEC01~SEC06、里程 0~125 公尺)，SEC01~SEC04(里程 0~75 公尺)河道寬度小於 30 公尺，SEC05~SEC06 為河道主槽寬度最為明顯及寬闊之河道段，河道寬度介於 40~60 公尺，於高程+3m 以上寬度均可達 35 公尺，於高程+2.5m 以上可維持在 25 公尺寬度。

SEC07(里程 150 公尺)河道寬度約為 40 公尺，底床最低高程約為+1.2m；SEC08(里程 175 公尺)河道寬度約為 55 公尺，底床最低高程約為+1.2m；SEC09(里程 200 公尺)河道寬度約為 50 公尺，底床最低高程約為+1.1m。

SEC10(里程 225 公尺)河道寬度約為 75 公尺，底床最低高程約為+1.0m；SEC11(里程 250 公尺)河道寬度約為 50 公尺，底床最低高程約為+0.8m；SEC12(里程 275 公尺)河道已不甚明顯，底床最低高程約為+0.7m，之後溪水呈擴散方式向北北西方流出。




圖 2.12.3-4　　觀音溪河道中心線圖(114 年 12 月 1 日)




圖 2.12.3-5　　觀音溪河道中心線底床高程變化圖(114 年 12 月 1 日)




圖 2.12.3-6　　觀音溪河口斷面分析位置圖




圖 2.12.3-7　觀音溪河口斷面底床高程變化圖(SEC01~SEC03)




圖 2.12.3-8　觀音溪河口斷面底床高程變化圖(SEC04~SEC06)




圖 2.12.3-9　觀音溪河口斷面底床高程變化圖(SEC07~SEC09)




圖 2.12.3-10　觀音溪河口斷面底床高程變化圖(SEC010~SEC12)




圖 2.12.3-11　觀音溪河口斷面底床高程變化圖(SEC13~SEC15)

2.13 辦理海域地形地貌調查

桃園市潮間帶裸露的藻礁為台灣相當具有特色的海岸地形景觀。其主要分佈範圍乃從觀音區大堀溪口以南至新屋區永安漁港北側之間，南北長約為 12 公里。藻礁乃由珊瑚藻經年累月所形成，此特殊的地質環境成為自然野生生物棲息地，使得藻礁具有保護與教育研究的價值。然而不少生態調查報告指出桃園海岸的藻礁生物分佈受海沙覆蓋，使得生態棲息地轉變成沙岸棲地。海沙覆蓋的成因可能來自於季節性變化，以及海岸人工結構物阻隔海流所影響。因目前觀塘工業區正在施工興建工業港，我們對於觀新藻礁保護區、大潭藻礁、白玉藻礁及鄰近的藻礁海岸，受海沙覆蓋變動的影響並不清楚，因此本工項每季使用無人機空拍桃園海岸，將空拍影像拼接成正射影像，探討海沙覆蓋的變化。

2.13.1 高解析度影像地形地貌攝影

一、114 年第四季空拍成果

本季完成 114 年秋季(10 月)及冬季(12 月)全區空拍，將 114 年第四季調查時間彙整於**表 2.13.1-1**。

本計畫使用 Pix4Dmapper 進行影像拼接，專案報表相關內容節錄至**附錄九**。**圖 2.13.1-1** 至**圖 2.13.1-3** 為 114 年秋季(10 月)現場空拍輸出成果，其中黑色框起範圍為分區邊界。**圖 2.13.1-4** 為 114 年秋季(10 月)空拍 A1~A12 全區空拍拼接結果。本次秋季空拍圖資地面解析度，每一像素介於 3.36 至 3.57 公分之間，分區地面解析度列於**表 2.13.1-2**。

圖 2.13.1-5 至**圖 2.13.1-7** 為 114 年冬季(12 月)現場空拍輸出成果，其中黑色框起範圍為分區邊界。**圖 2.13.1-8** 為 114 年冬季(12 月)空拍 A1~A12 全區空拍拼接結果。本次冬季空拍圖資地面解析度，每一像素介於 3.29 至 3.50 公分之間，分區地面解析度列於**表 2.13.1-3**。

二、空拍輸出成果

圖 2.13.1-1~圖 2.13.1-3 及圖 2.13.1-5~圖 2.13.1-7 為 A1 至 A12 空拍輸出成果。圖中黑線範圍為低潮位控制區域，由竹圍潮位站所定義的平均低潮線(退潮水位低於 TWVD＝-1.46 m)及各分區邊界所圈起之範圍所界定。黃線圈起範圍則為非沙區域。**圖 2.13.1-4 及圖 2.13.1-8** 為全區空拍輸出成果，圖中有標示調查區域內結構物的名稱，包含永安漁港北堤、台電進水口、台電出水口、東鼎公司人工結構物及 G1 北側結構物，以利後續報告討論使用。分區地面解析度列於**表 2.13.1-2 及表 2.13.1-3**。

本季調查成果各區覆沙情形及特性整理如下：


(1). 觀新藻礁生態系野生動物保護區(分區 A1~A6)：覆沙區域集中在永安漁港北堤北側(A1)、河口地區(A4)及大潭電廠進水口南側(A6)。

(2). 觀塘工業區區域(A7~A9)：G3 全區覆沙(A7)，G2 陸側覆沙(A8)，G1 陸側範圍與 G1 區北堤防覆沙(A9)

(3). 白玉藻礁(A10~A12)：觀音海水域場幾乎全區覆沙(A10)，A11 陸側覆沙，A12 控制面積南側陸側及北側大堀溪出海口覆沙。


表2.13.1-1　　114年第四季調查時間整理表

代表季節	調查月份	調查日期
秋	10 月	114 年 10 月 6 日
冬	12 月	114 年 12 月 8 日




註：圖中低潮位控制區域(黑線)、非沙區域(黃線)

圖 2.13.1-1　　114 年秋季(10 月)A1~A4 空拍輸出成果



註：圖中低潮位控制區域(黑線)、非沙區域(黃線)

圖 2.13.1-2　　114 年秋季(10 月)A5~A8 空拍輸出成果



註：圖中低潮位控制區域(黑線)、非沙區域(黃線)

圖 2.13.1-3　　114 年秋季(10 月)A9~A12 空拍輸出成果





圖 2.13.1-4　　114 年秋季(10 月)A1~ A12 空拍資料輸出全部成果


表2.13.1-2　　114年秋季(10月)A1~A12空拍資料解析度

分區	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
公分/像素	3.57			3.57			3.50	3.50		3.36		






註：圖中低潮位控制區域(黑線)、非沙區域(黃線)

圖 2.13.1-5　　114 年冬季(12 月)A1~A4 空拍輸出成果



註：圖中低潮位控制區域(黑線)、非沙區域(黃線)

圖 2.13.1-6　　114 年冬季(12 月)A5~A8 空拍輸出成果

A9	A10
	
A11	A12
	

註：圖中低潮位控制區域(黑線)、非沙區域(黃線)

圖 2.13.1-7　　114 年冬季(12 月)A9~A12 空拍輸出成果




圖 2.13.1-8　　114 年冬季(12 月)A1~A12 空拍資料輸出全部成果

表2.13.1-3　　114年冬季(12月)A1~A12空拍資料解析度

分區	A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12
公分/像素	3.45			3.50			3.40	3.44		3.29		

第三章　檢討與建議

3.1 監測結果檢討與因應對策

3.1.1 異常狀況紀錄及因應對策

本季執行空氣品質、噪音振動、營建噪音、交通流量、低頻噪音、河口水質/底泥、海域水質/底泥、海域/河口生態、漁業經濟、礁體懸浮固體、海域地形地貌等監測工作。114第3季及本季異常環境監測結果與因應對策，詳見**表3.1-1**、**表3.1-2**。

表3.1-1　上季(114年第3季)監測之異常狀況及處理情形


異常狀況	因應對策與效果
河口水質 大堀溪河口:生化需氧量 37.5 mg/L，懸浮固體 242.0 mg/L，銅 0.0388 mg/L 不符合丁類水質標準；觀音溪河口:大腸桿菌群 200,000 CFU/100mL 不符合丙類水質標準;新屋溪河口:大腸桿菌群 390,000 CFU/100mL，生化需氧量 4.2 mg/L，懸浮固體 43.3 mg/L 不符合丙類水質標準；社子溪河口: 大腸桿菌群 420,000 CFU/100mL，生化需氧量 4.5 mg/L，懸浮固體 185 mg/L，氨氮 0.35 mg/L，銅 0.11000 mg/L，鉛 0.0311 mg/L 不符合丙類水質標準	本次調查結果顯示主要為大腸桿菌群、懸浮固體、生化需氧量、氨氮及銅鉛等測項超過所屬標準，其污染項目與生活污水關聯較大，故其水質現況與上游污染源有關聯，後續持續監測。 部分河口之底泥鋅、銅、鎳及砷金屬濃度分布於底泥品質指標下限值和上限值之間，推測應為上游工業廢水貢獻而累積於底泥中。經蒐集桃園市政府 107-113 年鄰近河口點位之監測資料進行比對，底泥重金屬濃度分布趨勢與本計畫大致相符。且歷次底泥監測結果超標項目變化不大，故超標情形應為背景狀況，後續將持續監測。
河口底泥 大堀溪河口：銅 131.0 mg/kg、鋅 380 mg/kg、鎳 35.8 mg/kg 介於底泥品質指標下限值和上限值之間。 觀音溪河口: 鎳 26.6 mg/kg、砷 13.5 mg/kg 介於底泥品質指標下限值和上限值之間。 新屋溪河口: 銅 95.8 mg/kg、鋅 173 mg/kg、鎳 30.0 mg/kg 介於底泥品質指標下限值和上限值之間。	

表3.1-2 本季(114年第4季)監測之異常狀況及處理情形

異常狀況	因應對策與效果
河口水質 觀音溪河口:大腸桿菌群 75,000 CFU/100mL，氨氮 3.40 mg/L 不符合丙類水質標準。 新屋溪河口:氨氮 2.14 mg/L 不符合丙類水質標準。 社子溪河口:大腸桿菌群 62,000 CFU/100mL，氨氮 3.22 mg/L 不符合丙類水質標準。	本次調查結果顯示主要為大腸桿菌群及氨氮等測項超過所屬標準，其污染項目與生活污水關聯較大，故其水質現況與上游污染源有關聯，後續持續監測。 部分河口之底泥鋅、銅、鎳及砷金屬濃度分布於底泥品質指標下限值和上限值之間，推測應為上游工業廢水貢獻而累積於底泥中。經蒐集桃園市政府 107-113 年鄰近河口點位之監測資料進行比對，底泥重金屬濃度分布趨勢與本計畫大致相符。且歷次底泥監測結果超標項目變化不大，故超標情形應為背景狀況，後續將持續監測。
河口底泥 大堀溪河口：銅 126.0 mg/kg、鋅 351 mg/kg 及鎳 37.2 mg/kg 介於底泥品質指標下限值和上限值之間。 觀音溪河口：鎳 30.1 mg/kg 及砷 17.80 mg/kg 介於底泥品質指標下限值和上限值之間。 小飯壢溪河口：鋅 179 mg/kg 介於底泥品質指標下限值和上限值之間。 新屋溪河口：銅 72.8 mg/kg 及鎳 30.8 mg/kg 介於底泥品質指標下限值和上限值之間。 社子溪河口：銅 52.0 mg/kg 介於底泥品質指標下限值和上限值之間	


3.1.2 空氣品質歷次監測結果分析

本季 SO_2、NO、NO_2、CO、$PM_{2.5}$ 測值較去年同季(113Q4)測值高；與復工前環差階段(104 年 5 月)監測數據比較，本季 SO_2、THC 測值與復工前測值高。雖本工程已趨近完工狀態，但本季粒狀物測值仍高於前季，推測觀音區受東北季風與背風側效應影響，風速低導致環境擴散條件差，污染物容易滯留累積，另觀察鄰近新屋氣象站顯示，從 8 至 10 月降雨天數少，也可能因為濕沉降效果差間接導致粒狀物數值偏高。但整體而言，粒狀物測值仍在歷史高低值區間，氣狀物測值也遠低於法規標準。歷次空氣品質監測成果彙整於**圖 3.1.2-1～12**。




註：「空氣品質標準(101)」係指 101 年 05 月 14 日公告版本。

圖 3.1.2-1　　TSP 監測結果分析圖




註：「空氣品質標準(101)」係指 101 年 05 月 14 日公告版本；「空氣品質標準(109)」係指 109 年 09 月 18 日公告之最新版本；「空氣品質標準(113)」係指 113 年 09 月 30 日公告之最新版本。

圖 3.1.2-2　　PM_{10} 監測結果分析圖




註：「空氣品質標準(101)」係指 101 年 05 月 14 日公告版本；「空氣品質標準(113)」係指 113 年 09 月 30 日公告之最新版本。

圖 3.1.2-3　　$PM_{2.5}$ 監測結果分析圖



註：「空氣品質標準(101)」係指 101 年 05 月 14 日公告版本；「空氣品質標準(109)」係指 109 年 09 月 18 日公告之最新版本；「空氣品質標準(113)」係指 113 年 09 月 30 日公告之最新版本。

圖 3.1.2-4　　SO_2 最大小時平均值監測結果分析圖



註：「空氣品質標準(101)」係指 101 年 05 月 14 日公告版本。

圖 3.1.2-5　　SO_2 日平均值監測結果分析圖






圖 3.1.2-6　　NO 最大小時平均值監測結果分析圖



註：「空氣品質標準(101)」係指 101 年 05 月 14 日公告版本；「空氣品質標準(109)」係指 109 年 09 月 18 日公告之最新版本。

圖 3.1.2-7　　NO_2 最大小時平均值監測結果分析圖



註：「空氣品質標準(101)」係指 101 年 05 月 14 日公告版本；「空氣品質標準(113)」係指 113 年 09 月 30 日公告之最新版本。

圖 3.1.2-8　　CO 最大小時平均值監測結果分析圖




圖 3.1.2-9　　CO 最大 8 小時平均值監測結果分析圖




圖 3.1.2-10　　THC 監測結果分析圖




圖 3.1.2-11　　雨中 pH 監測結果分析圖





圖 3.1.2-12　　鹽份(氯鹽)監測結果分析圖


3.1.3 噪音振動歷次監測結果分析

噪音部分，本季三站平均假日 $L_{晚}$噪音測值高於去年同一季(113Q4)測值；與復工前環差階段(104 年 6 月)監測數據比較，本季三站平均假日 $L_{晚}$與非假日 $L_{夜}$噪音測值則高於復工前監測。振動部分，本季非假日、假日振動測值相同於去年同一季(113Q4)測值，並低於日本標準管制規定；與復工前環差階段(104 年 6 月)監測數據比較，本季假日與非假日三站平均振動皆低於復工前測值，往後將持續辦理監測監控噪音振動變化情形。



註：復工前資料來源為 105 年 02 月「桃園市觀塘工業區開發計畫正式環境監測報告書」。

圖 3.1.3-1　　歷次噪音監測結果分析圖



註：復工前資料來源為 105 年 02 月「桃園市觀塘工業區開發計畫正式環境監測報告書」。

圖 3.1.3-2　　歷次振動監測結果分析圖

3.1.4 營建噪音歷次監測結果分析

歷次營建噪音監測結果如**圖3.1.4-1**所示。營建噪音於復工前及環評階段並未進行調查，本季監測結果L_{eq}工業港工區周界1、工業港工區周界2高於上一季結果，並且皆符合日間第二類營建工程噪音管制標準，未來將持續監控營建噪音變化情形。





圖 3.1.4-1　　歷次營建噪音監測結果分析圖

3.1.5 低頻噪音歷次監測結果分析

歷次低頻噪音監測結果如**圖3.1.5-1**所示，低頻噪音部分，本季假日低頻$L_{eq,LF}$日與非假日$L_{eq,LF}$夜低於去年同一季(113Q4)測值；與108年至113年移動平均值比較，假日與非假日低頻皆低於移動平均值。



註：復工前資料來源為 105 年 02 月「桃園市觀塘工業區開發計畫正式環境監測報告書」。

圖 3.1.5-1　　歷次低頻噪音監測結果分析圖

3.1.6 交通流量歷次監測結果分析

歷次交通量監測結果如**圖3.1.6-1～圖3.1.6-2**所示，歷次交通尖峰流量及服務水準資料詳見**附錄八**。本季假日與非假日各站路口同於去年同一季(113Q4)服務水準，本季各路口皆維持在A的服務水準；與復工前環差階段(104年5月)監測數據比較，各站皆維持在A級服務水準。觀察各路口與路段108至113年移動平均值比較，東明國小路段車流量相較於其他路段測值有下降趨勢，由該路段唯一相距工區較遠的新屋區，本案工區主要進出路口仍以台61與台66為準，故東明國小影響較小。其餘大潭國小、觀音橋、坑尾活動中心等路段皆鄰近工區，故有可能因台61與台66、台15與台66兩路口車輛導流導致車流量上升。近年兩路口車流量的上升，推測桃園機場與聯外交通旅客量的成長、沿海休閒旅遊發展(永安或竹圍漁港)、產業與通勤需求持續成長(桃園科技園區、工業廠房與物流中心)或台66部分路段改善工項影響車流等因素。整體而言，本季各監測點位車流狀況皆屬順暢，未因工區工程造成壅塞之情事發生。




圖 3.1.6-1　　歷次路口交通量監測結果分析圖




圖 3.1.6-2　　歷次路段交通量監測結果分析圖

3.1.7 河口水質、底泥

一、河口水質

河口水質歷次監測結果表，請詳**附錄八表 10**；歷次監測結果比較請詳**圖 3.1.7-1**。

(一) 透明度

施工期間歷季河口之透明度範圍 0.07~0.80 m，本季透明度範圍為 0.44~0.67 m，施工期間歷季平均值 0.47 m，監測結果與去年同季(113Q4)測值高。

(二) 水溫

施工期間歷季河口之水溫範圍 13.10~34.8℃，本季水溫範圍為 27.3~31.4℃，施工期間歷季平均值 25.9℃，監測結果與去年同季(113Q4)高。

(三) 鹽度

施工期間歷季河口之鹽度範圍 0.1~22.4 psu，本季鹽度範圍為 0.3~4.0psu，施工期間歷季平均值 1.5 psu，監測結果較去年同季(113Q4)測值高。

(四) 酸鹼值(pH)

施工期間歷季河口之酸鹼值範圍 6.1~8.6，本季酸鹼值(pH)範圍為 7.1~7.9，歷季平均值 7.6，監測結果皆符合陸域地面水體水質標準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(五) 溶氧量(DO)

施工期間歷季河口之溶氧量範圍 2.4~9.9 mg/L，本季溶氧量範圍為 5.4~6.5 mg/L，歷季平均值 6.5 mg/L，監測結果皆符合陸域地面水體水質標準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(六) 生化需氧量(BOD_5)

施工期間歷季河口之 BOD_5 範圍<2.0~43.6 mg/L，本季 BOD_5 範圍為 0.9~4.1 mg/L，歷季平均值 7.9 mg/L，監測結果皆符合陸域地面水體水質標準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(七) 油脂

施工期間歷季河口之油脂範圍<0.5~8.0 mg/L，本季油脂範圍為 1.3~3.9 mg/L，歷季平均值 3.1 mg/L，本季油脂測值較去年同季(113Q4)測值低，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(八) 懸浮固體(SS)

施工期間歷季河口之懸浮固體範圍<2.5~242.0 mg/L，本季河口懸浮固體範圍為 6.6~15.1mg/L，歷季平均值 31.3 mg/L，監測結果皆符合陸域地面水體水質標準，相較於去年同季懸浮固體(113Q4)測值低，監測結果皆符合陸域地面水體水質標準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(九) 導電度

施工期間歷季河口之導電度範圍 184~35,600 mg/L，本季導電度範圍為 539~7,370 mg/L，歷季平均值 2,768 mg/L，本季導電度測值較去年同季(113Q4)測值高，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(十) 總磷

施工期間歷季河口之總磷範圍 0.055~1.510 mg/L，本季總磷範圍為 0.210~1.160 mg/L，僅小飯壢溪低於歷季平均值 0.457 mg/L，推測生活污水、化肥、有機磷農藥等皆有可能造成水體污染，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(十一) 正磷酸鹽

施工期間歷季河口之正磷酸鹽範圍 0.031~1.390 mg/L，本季正磷酸鹽範圍為 0.223~1.20 mg/L，僅小飯壢溪低於歷季平均值 0.351 mg/L，推測生活污水、化肥、有機磷農藥等皆有可能造成水體污染，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(十二) 氨氮

施工期間歷季河口之氨氮範圍<0.05~28.40 mg/L，本季氨氮範圍為 0.07~10.6 mg/L，施工期間歷季平均值為 2.23 mg/L，觀音溪口、新屋溪口社子溪口不符合丙類水質標準，推測為事業廢水及生活污水貢獻之影響。

(十三) 硝酸鹽

施工期間歷季河口之硝酸鹽範圍 0.41~23.70 mg/L，本季硝酸鹽範圍為 2.11~17.10 mg/L，本季硝酸鹽測值較去年同季(113Q4)測值高，大堀溪口、小飯壢溪口及新屋溪口測值高於歷季平均值 7.92 mg/L，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(十四) 硝酸鹽氮

施工期間歷季河口之硝酸鹽氮範圍 0.090~23.60 mg/L，本季硝酸鹽氮範圍為 0.48~3.88 mg/L，本季硝酸鹽氮測值較去年同季(113Q4)測值高，大堀溪口及新屋溪口測值高於歷季平均值 2.08 mg/L，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(十五) 大腸桿菌群

施工期間歷季河口之大腸桿菌群範圍<10~950,000 CFU/100mL，本季大腸桿菌群範圍為 600~75,000 CFU/100mL，施工期間歷季平均值53,236 CFU/100mL，觀音溪口及社子溪口不符合丙類水質標準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(十六) 葉綠素 a

施工期間歷季河口之葉綠素 a 範圍 0.6~94.0 μg/L，本季葉綠素 a 範圍為 5.50~23.8 μg/L，施工期間歷季平均值為 11.5 μg/L，本季葉綠素 a 測值較去年同季(113Q4)測值低，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(十七) 矽酸鹽

施工期間歷季河口之矽酸鹽範圍 2.15~86.70 mg/L，本季矽酸鹽範圍為 12.7~22.70 mg/L，施工期間歷季平均值為 13.6 mg/L，本季矽酸鹽測值較去年同季(113Q4)測值高，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(十八) 氰化物

施工階段並無監測。

(十九) 酚類

歷年施工階段則及本季檢測值皆為 ND，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(二十) 化學需氧量

施工期間歷季河口之化學需氧量範圍 ND~105.0 mg/L，本季化學需氧量範圍為 26.1~62.8 mg/L，施工期間歷季平均值為 34.3 mg/L，本季化學需氧量測值較去年同季(113Q4)測值高，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(二十一) 鎘

施工期間歷季河口之鎘範圍 ND~0.00027 mg/L，本季鎘範圍皆為 ND，皆符合地面水體保護人體健康相關環境基準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(二十二) 銅

施工期間歷季河口之銅範圍<0.0200~0.11000 mg/L，本季銅範圍為<0.00200~0.01910 mg/L，皆符合地面水體保護人體健康相關環境基準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(二十三) 六價鉻

施工期間歷季河口之六價鉻範圍 ND~<0.01 mg/L，本季六價鉻濃度範圍皆為 ND，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(二十四) 鎳

施工期間歷季河口之鎳範圍為<0.00500~0.03970 mg/L，本季鎳範圍

為 0.0017~0.0225 mg/L，皆符合地面水體保護人體健康相關環境基準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(二十五) 總汞(汞)

施工期間歷季河口之總汞(汞)範圍為 ND~0.0002 mg/L，本季總汞(汞)為 ND，皆符合地面水體保護人體健康相關環境基準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(二十六) 鉛

施工期間歷季河口之鉛範圍為 0.0003~0.0311g/L，本季鉛範圍為 0.00041~0.00098 mg/L，皆符合地面水體保護人體健康相關環境基準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(二十七) 鋅

施工期間歷季河口之鋅範圍為<0.0400~0.2980 mg/L，本季鋅範圍為 0.00885~0.02740 mg/L，皆符合地面水體保護人體健康相關環境基準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(二十八) 鐵

施工期間歷季河口之鐵範圍為 0.224~13.40 mg/L，本季鐵範圍為 0.485~0.858 mg/L，本季各河口皆低於歷季平均值為 1.24mg/L，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

二、河口底泥

河口底泥歷次監測結果表，請詳**附錄八表 11**；河口底泥歷次監測結果比較請詳**圖 3.1.7-2**。施工階段 114 年第 4 季監測結果顯示，大堀溪河口：銅、鋅及鎳介於底泥品質指標下限值和上限值之間，其餘測項符合底泥品質指標下限值。觀音溪河口:鎳及砷介於底泥品質指標下限值和上限值之間，其餘測項符合底泥品質指標下限值。小飯壢溪河口: 鋅介於底泥品質指標下限值和上限值之間，其餘測項符合底泥品質指標下限值。新屋溪河口: 銅及鎳介於底泥品質指標下限值和上限值之間，其餘測項符合底泥品質指標下限值。社子溪河口: 銅介於底泥品質指標下限值和上限值之間，其餘測項符合底泥品質指標下限值。






圖 3.1.7-1　　歷次河口水質監測結果分析圖(1/9)








圖 3.1.7-1　　歷次河口水質監測結果分析圖(2/9)






圖 3.1.7-1　　歷次河口水質監測結果分析圖(3/9)








圖 3.1.7-1　　歷次河口水質監測結果分析圖(4/9)




圖 3.1.7-1　　歷次河口水質監測結果分析圖(5/9)




圖 3.1.7-1　　歷次河口水質監測結果分析圖(6/9)




圖 3.1.7-1　　歷次河口水質監測結果分析圖(7/9)





圖 3.1.7-1　　歷次河口水質監測結果分析圖(8/9)






圖 3.1.7-1　　歷次河口水質監測結果分析圖(9/9)




圖 3.1.7-2　　歷次河口底泥監測結果分析圖(1/3)




圖 3.1.7-2　　歷次河口底泥監測結果分析圖(2/3)




圖 3.1.7-2　　歷次河口底泥監測結果分析圖(3/3)

3.1.8 海域水質、底泥

一、海域水質

海域水質歷次監測結果表請詳**附錄八表 12**，歷次監測結果比較請詳**圖 3.1.8-1**。

(一) 透明度

施工期間歷季海域透明度範圍為 0.2~12.0 m，本季各站間測結果為 0.5~2.0 m，本季透明度低於去年同季(113Q4)，低於歷季平均值 2.7 m，

建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(二) 水溫

施工期間歷季海域水溫範圍為 15.7~ 33.6℃，本季溫度範圍為29.1~29.8℃，測值高於去年同季(113Q4)及歷季平均值 25.2℃，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(三) 鹽度

施工期間歷季海域鹽度範圍為 28.22~34.90 psu，本季鹽度範圍為31.39~32.41 psu，測值低於去年同季(113Q4)及歷季平均值 32.55 psu，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(四) 酸鹼值(pH)

施工期間歷季海域酸鹼值(pH)範圍為 7.6~8.5，本季酸鹼值(pH)範圍為 8.1~8.3，歷次數據符合乙類海域海洋環境品質標準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(五) 溶氧量(DO)

施工期間歷季海域溶氧量範圍為 5.54~8.26 mg/L，本季溶氧量範圍為 6.06~7.45 mg/L，本季溶氧量略高於去年同季(113Q4)，歷次數據符合乙類海域海洋環境品質標準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(六) 油脂

施工期間歷季海域油脂範圍為<0.5~5.6 mg/L，本季油脂範圍為<0.5~1.9 mg/L，本季油脂低於去年同季(113Q4)，歷次數據符合乙類海域海洋環境品質標準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(七) 正磷酸鹽

施工期間歷季海域正磷酸鹽範圍為 ND~0.243 mg/L，本季正磷酸鹽範圍為<0.020~0.0400 mg/L，本季正磷酸鹽低於去年同季(113Q4) 及歷季平均值 0.0398 mg/L，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(八) 硝酸鹽

施工期間歷季海域硝酸鹽範圍為 ND~1.95 mg/L，本季硝酸鹽範圍為 ND<0.035~0.22 mg/L，本季硝酸鹽略高於去年同季(113Q4)，但低於歷季平均值 0.238 mg/L，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(九) 酚類

施工期間歷季及本季海域酚類濃度範圍皆為 ND，歷次數據符合乙類海域海洋環境品質標準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(十) 矽酸鹽

施工期間歷季海域矽酸鹽範圍為 ND~3.51 mg/L，本季矽酸鹽範圍為 0.261~0.576 mg/L，本季矽酸鹽高於去年同季(113Q4)及歷季平均值

0.379 mg/L，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(十一) 葉綠素 a

施工期間歷季海域葉綠素 a 範圍為<0.1~73.7 μg/L，本季葉綠素 a 範圍為 0.5~1.7 μg/L，本季葉綠素低於去年同季(113Q4)及歷季平均值 1.13 μg/L，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(十二) 鋅

施工期間歷季海域鋅濃度範圍為<0.1~53.6 μg/L，本季鋅濃度範圍為 0.5~14.8 μg/L，本季鋅濃度高於去年同季(113Q4)，本次數據符合乙類海域海洋環境品質標準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(十三) 銅

施工期間歷季海域銅濃度範圍為 ND~5.9 μg/L，本季銅濃度範圍為 0.2~1.9 μg/L，本季銅濃度高於去年同季(113Q4)，本次數據符合乙類海域海洋環境品質標準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(十四) 鉛

施工期間歷季海域鉛濃度範圍為 ND~3.3 μg/L，本季鉛濃度範圍為 ND~1.0 μg/L，本季鉛濃度高於去年同季(113Q4)，本次數據符合乙類海域海洋環境品質標準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(十五) 鎘

施工期間歷季海域鎘濃度範圍為 ND~2.5 μg/L，本季鎘濃度範圍為 ND~<0.1 μg/L，符合乙類海域海洋環境品質標準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(十六) 汞

施工期間歷季海域汞濃度範圍為 ND~3.1 μg/L，本季汞濃度範圍皆為 ND，符合乙類海域海洋環境品質標準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(十七) 鎳

施工期間歷季海域鎳濃度範圍為 ND~3.9 μg/L，本季鎳濃度範圍 ND~0.2 μg/L，本季鎳濃度同於去年同季(113Q4)，符合乙類海域海洋環質標準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(十八) 六價鉻

施工期間歷季海域六價鉻濃度範圍為 ND~<10 μg/L，本季六價鉻濃度範圍皆為 ND，符合乙類海域海洋環境品質標準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(十九) 鐵

施工期間歷季海域鐵濃度範圍為<0.4~31.3 μg/L，本季鐵濃度範圍

為 1.1~16.1 μg/L，本季鐵濃度高於去年同季(113Q4)與歷季平均值 1.73 μg/L，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

(二十) 懸浮固體

施工期間歷季海域懸浮固體範圍為 2.7~96.9 mg/L，本季各站間測結果為 6.4~22.1 mg/L，皆未超出警戒值，測值低於去年同季(113Q4)，建議持續辦理監測並評估其變化情形。


(二十一) 生化需氧量

施工期間歷季海域生化需氧量範圍為<0.1~2.3 mg/L，本季生化需氧量濃度為<0.1~0.8 mg/L，符合乙類海域海洋環境品質標準，建議持續辦理監測並評估其變化情形。

二、海域底泥

海域水質歷次監測結果表，請詳**附錄八表 15**，歷次監測結果比較請詳**圖 3.1.8-2**。114 年度第四季海域底泥濃度分別為，**鎘**各測站濃度 0.43~ 1.85 mg/Kg，本季各測站皆高於基線濃度 0.14 mg/Kg。**鉛**濃度範圍介於 17.6~32.4 mg/Kg，本季測站僅 4C、5A 及 5B 低於基線濃度 19.9 mg/Kg，其餘高於基線濃度。**鉻**濃度範圍介於 18.9~22.9 mg/Kg，本季各測站皆低於基線濃度 24.8 mg/Kg。**砷**濃度範圍介於 15.7~57.2 mg/Kg，本季測站僅 5B 低於基線濃度 16.1 mg/Kg，其餘皆高於基線濃度。**汞**各測站濃度皆為 ND<0.0296 mg/Kg，各測站皆低於基線濃度 0.02 mg/Kg。**銅**濃度範圍介於 6.15~16.8 mg/Kg，本季各測站皆低於基線濃度 21.4 mg/Kg。**鋅**濃度範圍介於 81.3~96.2 mg/Kg，本季各測站皆低於基線濃度 96.7 mg/Kg。**鎳**濃度範圍介於 21.2~25.4 mg/Kg，本季測站僅 2B、4C、5A 及 5B 低於基線濃度 22.5 mg/Kg，其餘皆高於監測基線濃度。


綜理來說，本季(114Q4)底泥與前季(114Q3)底泥相比，前季底泥**鋅**在 1A、1B、2A、2B、3A 及 4A 點與底泥**鉻**在 1A、1B、2A 及 4A 點位濃度有上升之趨勢，本季濃度已下降至低於基線濃度。而底泥**鎘** 1A、1B、1C、2A、2C、3A、3B、3C 及 4B 點位與底泥**砷** 1A、1B、1C、2A、2B 及 3C 點位濃度有上升趨勢，其餘各站之金屬濃度範圍皆相似，無異常升高趨勢。工區內廢水皆委託合格業者處理無異常排放狀況，後續將持續監測。





註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M

圖 3.1.8-1　　歷次海域水質監測結果分析圖(1/20)








註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口
註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M


圖 3.1.8-1　　歷次海域水質監測結果分析圖(2/20)





註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M

圖 3.1.8-1　　歷次海域水質監測結果分析圖(3/20)








註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口
註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M


圖 3.1.8-1　　歷次海域水質監測結果分析圖(4/20)





註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M

圖 3.1.8-1　　歷次海域水質監測結果分析圖(5/20)








註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口
註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M


圖 3.1.8-1　　歷次海域水質監測結果分析圖(6/20)





註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M

圖 3.1.8-1　　歷次海域水質監測結果分析圖(7/20)








註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口
註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M


圖 3.1.8-1　　歷次海域水質監測結果分析圖(8/20)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M


圖 3.1.8-1　　歷次海域水質監測結果分析圖(9/20)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口


註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M

圖 3.1.8-1　　歷次海域水質監測結果分析圖(10/20)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口
註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M


圖 3.1.8-1　　歷次海域水質監測結果分析圖(11/20)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M


圖 3.1.8-1　　歷次海域水質監測結果分析圖(12/20)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口


註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M


圖 3.1.8-1　　歷次海域水質監測結果分析圖(15/20)




註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口
註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M

圖 3.1.8-1　　歷次海域水質監測結果分析圖(14/20)








註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口
註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M


圖 3.1.8-1　　歷次海域水質監測結果分析圖(15/20)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M


圖 3.1.8-1　　歷次海域水質監測結果分析圖(16/20)





註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M

圖 3.1.8-1　　歷次海域水質監測結果分析圖(17/20)










註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M

圖 3.1.8-1　　歷次海域水質監測結果分析圖(18/20)








註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口


註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M

圖 3.1.8-1　　歷次海域水質監測結果分析圖(19/20)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口
註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M


圖 3.1.8-1　　歷次海域水質監測結果分析圖(20/20)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M


圖 3.1.8-2　　歷次海域底泥監測結果分析圖(1/3)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M

圖 3.1.8-2　　歷次海域底泥監測結果分析圖(2/3)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M

圖 3.1.8-2　　歷次海域底泥監測結果分析圖(3/3)

3.1.9 海域生態

一、浮游植物

本季(114年10月)於海域五條測線15測站三個深度所採穫之浮游植物豐度，三個水層豐度沒有顯著差異（ANOVA, $F = 0.715$, $p = 0.495$）。五條測線間浮游植物豐度有顯著差異（ANOVA, $F = 4.331$, $p = 0.005$），其中測線5顯著高於測線2-4。本季矽藻豐度佔了總豐度98%以上、其他藻合佔約2%。本季豐度介於8,000至101,200 cells/L之間，平均為31,964 ± 19,399 cells/L，復工前之平均豐度為11,417 cells/L (104年6月)，本季較復工前為高。與上一季(114年7月) 平均豐度36,320 ± 24,790 cells/L比較，本季豐度為其相當。與去年同季113年10月平均豐度59,289 ± 29,602 cells/L比較，本季豐度為其0.5倍。

歷次優勢物種比較方面，由**表 3.1.9-3** 可得知，自 108 年以來，矽藻之海鏈藻屬、角毛藻屬及盒形藻屬，以及藍綠菌之束毛藻屬經常為最優勢的種類，有明顯季節性，但年間變化並不明顯。如 108 年第 3 季豐度最高的藍綠菌束毛藻屬高達 46%，108 年第 4 季則完全沒有發現，而 109 年第 1 季平均再高達 57%，109 年第 2 季又完全沒有發現，109 年第 3 季為 33%，109 年 11 月又高達 57%，110 年第 1 季又完全沒有發現，110 年 5 月又高達 89%，110 年 8 月、10 月、及 111 年 2 月又完全沒有發現，113 年 2 月佔了 23%，4 月佔了 31%，7 月仍佔了 24%，10 月又完全沒有發現。其變動明顯，出現似為春夏秋高而冬低，有明顯季節性。

本季鄰近工業區的測站 3A 平均豐度為 42,133 ± 14,546 cells/L，為臨近測站 2A 及 4A 豐度的 1.5 倍，與 1A 豐度相近，為 5A 豐度的 0.7 倍，差別都不大。本計畫採得之浮游植物是台灣西海岸海域普遍出現的種類。原環說書記錄水層浮游植物細胞數含量為 6,824 ~ 99,264 cells/L，104 年 6 月復工前調查記錄為 7,256 ~ 90,780 cells/L，108 年開工後歷季浮游植物細胞數如**表 3.1.9-2** 所示，而本季為 8,000 至 101,200 cells/L，浮游植物細胞數含量介於過去所調查的豐度之間**(表 3.1.9-2)**。

本季浮游植物平均豐度為31,964 ± 19,399 cells/L，總計發現之物種數為38。與歷次平均豐度及歷次平均物種數比較**(圖3.1.9-2)**，各季豐度一般上在第二及第三季較長期平均高，而其他季節都低於長期平均。各季發現的種類變動不大，長期平均約38種，沒有一定的季節變動趨勢。

表3.1.9-1　　歷季海域生態-植物性浮游生物物種數結果比較表(1/2)

季別＼測站		1A			1B			1C			2A			2B			2C			3A			3B			3C		
		表	中	底	表	中	底	表	中	底	表	中	底	表	中	底	表	中	底	表	中	底	表	中	底	表	中	底
物種數																												
復工前	104 年 6 月	10	9	8	9	8	12	7	11	4	8	9	8	12	8	5	10	5	9	9	5	9	6	7	4	8	2	6
施工期間	108Q1	16	15	11	13	10	13	11	17	14	11	13	10	16	13	12	14	16	11	13	9	7	11	13	9	13	13	13
	108Q2	9	8	13	9	5	7	8	7	7	13	9	5	6	8	9	6	8	9	6	6	9	20	8	8	13	7	10
	108Q3	10	19	11	20	14	14	16	14	14	11	20	14	13	15	15	17	10	11	19	17	17	13	15	11	13	14	14
	108Q4	17	11	9	14	9	8	10	12	10	13	12	11	15	12	10	13	11	9	17	10	10	11	9	9	10	9	10
	109Q1	10	9	9	11	10	10	13	9	7	15	10	7	15	11	7	16	7	6	18	12	8	15	13	6	18	7	8
	109Q2	23	17	13	18	17	12	17	15	14	21	14	13	20	14	14	13	14	14	20	15	12	22	14	12	12	14	12
	109Q3	17	9	7	13	9	6	11	12	9	16	11	8	12	12	6	11	12	10	17	8	5	12	10	11	10	11	9
	109Q4	17	11	13	16	15	13	16	15	8	13	14	13	18	13	12	16	14	10	14	15	12	13	15	13	13	12	10
	110Q1	11	21	11	10	9	14	13	7	14	10	11	21	11	10	9	14	13	7	14	10	11	21	11	10	9	14	13
	110Q2	13	8	11	10	13	9	19	11	12	16	13	14	17	16	15	17	10	10	17	10	13	14	6	10	14	9	14
	110Q3	16	15	12	19	12	12	16	12	11	16	12	11	23	10	11	14	14	13	19	11	10	14	12	14	17	9	12
	110Q4	16	9	9	11	11	7	9	14	12	10	10	6	9	11	10	11	13	7	10	12	10	10	11	9	9	9	8
	111Q1	18	19	17	18	16	15	16	18	17	22	20	15	22	17	16	19	19	19	17	17	19	19	17	17	21	16	12
	111Q2	19	11	10	17	13	10	10	13	12	14	10	6	15	8	10	13	9	10	18	10	11	13	6	7	12	9	9
	111Q3	13	12	12	18	9	10	17	9	9	12	13	9	14	12	10	19	9	10	18	9	10	16	12	10	17	11	10
	111Q4	8	12	11	9	12	10	14	11	8	14	12	12	15	9	11	13	13	12	17	13	12	12	14	11	19	13	12
	112Q1	15	18	17	16	17	17	15	19	19	16	14	15	17	16	15	21	18	17	16	16	16	13	14	16	15	16	16
	112Q2	13	6	13	16	12	10	16	13	13	14	14	7	17	13	12	20	10	10	14	12	12	14	14	10	16	15	11
	112Q3	9	11	9	9	9	8	9	9	7	11	9	7	11	10	9	12	9	6	7	14	7	10	10	10	8	11	9
	112Q4	13	17	13	19	10	12	15	13	15	14	11	12	17	13	11	18	12	14	15	13	12	17	15	12	23	14	12
	113Q1	14	13	7	9	10	10	10	11	8	12	10	5	10	14	9	11	12	6	13	10	8	12	7	10	9	13	8
	113Q2	16	9	10	13	6	10	20	6	8	22	8	8	13	7	7	14	8	9	8	9	8	11	8	9	9	9	9
	113Q3	22	14	15	11	13	13	14	13	12	16	14	14	15	12	12	17	14	14	20	13	13	19	12	10	13	10	11
	113Q4	20	10	10	19	10	10	16	9	9	15	15	10	20	12	11	19	13	10	15	17	10	17	13	9	21	10	10
	114Q1	22	13	16	18	13	11	15	10	12	23	15	10	19	10	9	17	10	8	23	12	13	23	10	10	21	10	10
	114Q2	22	15	13	19	13	13	19	17	11	22	13	11	16	14	12	21	13	12	16	15	13	23	14	12	17	15	13
	114Q3	18	11	9	18	13	9	19	11	9	16	17	11	20	5	7	14	11	6	17	12	9	16	7	6	17	8	8
	114Q4	**16**	**13**	**9**	**14**	**11**	**12**	**11**	**15**	**9**	**15**	**10**	**10**	**7**	**12**	**12**	**10**	**8**	**12**	**11**	**12**	**12**	**11**	**8**	**8**	**6**	**10**	**7**
歷次平均		38																										

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.9-1　　歷季海域生態-植物性浮游生物物種數結果比較表(2/2)

季別＼測站		4A			4B			4C			5A			5B			5C			所有測線
		表	中	底	表	中	底	表	中	底	表	中	底	表	中	底	表	中	底	
物種數																				
復工前	104 年 6 月	3	7	5	10	3	4	5	2	4	3	3	6	5	3	3	6	3	5	12
施工期間	108Q1	17	13	8	13	14	12	9	14	11	11	12	10	10	13	10	10	13	10	44
	108Q2	5	6	7	8	11	7	5	9	8	9	7	8	6	11	8	5	10	8	30
	108Q3	14	20	15	12	16	15	12	14	12	14	19	17	8	15	13	12	12	11	37
	108Q4	12	10	17	11	9	8	12	9	13	11	12	16	10	8	8	9	10	12	41
	109Q1	14	9	6	13	6	7	11	8	5	15	11	9	15	13	7	14	11	11	40
	109Q2	18	14	13	17	14	14	17	17	14	20	18	15	16	17	11	15	15	12	41
	109Q3	14	9	8	10	10	8	9	8	8	9	10	9	12	9	8	9	12	9	33
	109Q4	14	14	11	20	15	15	16	15	13	12	13	11	15	15	11	17	13	12	42
	110Q1	15	12	12	13	13	11	15	12	10	18	15	12	15	13	10	15	13	13	34
	110Q2	17	6	7	18	8	10	12	7	7	14	6	8	14	11	5	15	9	8	34
	110Q3	18	12	11	15	11	10	15	10	10	12	12	13	14	13	11	9	12	14	38
	110Q4	9	12	9	7	11	9	8	9	6	7	12	11	9	13	12	6	10	10	30
	111Q1	21	19	14	19	19	15	19	17	16	22	19	14	19	15	12	18	15	13	38
	111Q2	10	6	6	9	5	7	8	6	6	9	8	8	10	8	6	6	9	8	43
	111Q3	11	12	8	15	7	10	10	5	6	19	9	7	13	7	5	11	8	10	40
	111Q4	17	14	8	10	10	12	10	13	10	14	14	8	11	12	8	11	11	10	34
	112Q1	13	16	15	15	17	15	20	17	18	13	16	12	12	17	16	11	20	19	42
	112Q2	15	12	12	14	10	10	14	13	11	15	10	8	11	12	9	12	10	9	15
	112Q3	8	6	7	6	10	9	5	7	5	5	11	7	7	9	7	4	9	8	33
	112Q4	17	16	12	24	13	9	20	12	11	8	18	13	12	10	9	8	12	11	43
	113Q1	13	11	9	10	10	11	12	12	8	10	5	8	11	9	7	14	8	11	31
	113Q2	10	11	9	9	6	7	13	9	13	12	9	8	12	8	8	12	8	12	32
	113Q3	16	13	13	11	10	14	9	8	12	11	9	11	14	12	10	14	9	10	37
	113Q4	17	15	11	29	12	12	24	13	12	14	11	10	15	10	11	13	11	12	43
	114Q1	21	11	10	21	10	10	17	10	9	20	11	8	12	11	9	8	10	9	43
	114Q2	19	15	12	20	12	13	17	15	11	8	15	13	20	11	13	21	12	14	40
	114Q3	19	12	8	13	9	8	14	7	6	21	14	9	21	10	11	9	9	9	45
	114Q4	**13**	**9**	**5**	**11**	**6**	**6**	**9**	**10**	**7**	**17**	**10**	**10**	**9**	**10**	**5**	**15**	**8**	**6**	**38**
歷次平均		38																		

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.9-2　　歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較表(1/5)

季別＼測站		1A			1B			1C		
		表	中	底	表	中	底	表	中	底
細胞數/公升										
復工前 104.06		9,120	6,460	5,320	7,980	2,280	5,320	91,200	141,360	9,120
施工期間	108Q1	146,400	78,400	44,000	224,800	101,600	68,800	57,600	87,200	50,400
	108Q2	79,200	84,800	62,400	76,800	79,200	70,400	160,800	107,200	102,400
	108Q3	451,200	772,800	459,200	746,400	863,200	273,600	484,800	390,400	306,400
	108Q4	81,600	63,200	59,200	136,000	69,600	48,800	52,800	28,000	19,200
	109Q1	76,800	129,600	98,400	53,600	60,000	46,400	108,800	106,400	32,000
	109Q2	690,400	502,400	354,400	436,000	420,000	400,000	192,800	247,200	217,600
	109Q3	208,000	187,200	161,600	184,800	316,800	255,200	843,200	620,800	284,000
	109Q4	215,200	296,000	203,200	854,800	386,800	228,400	179,200	168,400	76,400
	110Q1	95,200	114,000	83,600	267,600	125,600	91,600	207,200	141,600	128,000
	110Q2	52800	37,600	25200	10,400	46,800	54,400	78,400	56,000	42,400
	110Q3	159,200	128,800	195,200	156,000	364,000	297,600	269,600	371,200	152,800
	110Q4	20,800	6,800	5,200	23,200	13,600	5,200	27,200	38,400	38,000
	111Q1	226,400	364,400	308,400	494,400	470,000	391,600	366,400	382,800	408,800
	111Q2	188,800	88,000	53,200	36,400	58,000	49,200	74,000	54,400	46,000
	111Q3	583,600	464,800	496,800	541,600	732,800	660,000	355,200	604,800	560,400
	111Q4	88,800	72,000	71,200	105,600	140,000	66,800	90,000	114,400	95,200
	112Q1	89,600	88,000	86,400	106,400	76,000	81,600	76,000	86,400	89,600
	112Q2	15,600	16,000	17,200	31,200	20,000	21,200	56,400	28,800	19,600
	112Q3	17,600	78,400	40,000	44,800	61,600	58,400	17,600	37,600	70,400
	112Q4	72,000	60,800	48,000	108,800	56,000	55,200	159,200	124,000	84,800
	113Q1	29,200	33,600	11,800	55,200	103,200	38,600	42,400	98,600	38,600
	113Q2	15,200	24,800	21,600	11,200	22,400	18,000	23,600	26,800	12,800
	113Q3	97,600	117,200	49,200	46,400	44,400	48,800	212,400	152,400	21,600
	113Q4	92,800	38,000	44,000	79,200	39,600	36,000	39,200	30,800	28,400
	114Q1	98,800	74,000	47,200	70,800	46,800	32,800	60,800	39,600	34,000
	114Q2	72,000	48,400	41,200	51,200	53,600	50,400	52,400	61,600	50,800
	114Q3	63,600	36,000	20,000	49,200	53,200	13,600	31,200	30,400	27,600
	114Q4	**21,200**	**64,400**	**40,000**	**33,200**	**34,000**	**27,200**	**16,800**	**36,800**	**25,600**
歷次平均		177,612								

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.9-2　　歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較表(2/5)

季別＼測站		2A			2B			2C		
		表	中	底	表	中	底	表	中	底
細胞數/公升										
復工前 104.06		4,560	6,080	6,080	45,600	3,800	3,420	10,260	12,920	13,680
施工期間	108Q1	62,400	33,600	17,600	159,200	53,600	39,200	146,400	74,400	51,200
	108Q2	169,600	117,600	68,000	68,000	104,000	85,600	174,400	117,600	97,600
	108Q3	603,200	301,600	207,200	564,800	595,200	552,800	1192,800	643,200	480,800
	108Q4	70,400	93,600	52,800	100,000	96,800	75,200	42,400	40,800	20,800
	109Q1	271,200	195,200	134,400	145,600	78,400	53,600	155,200	104,000	80,000
	109Q2	295,200	349,600	212,800	322,400	205,600	160,800	158,400	201,600	170,400
	109Q3	226,400	124,000	144,800	457,600	367,200	156,800	1,533,600	858,400	272,800
	109Q4	115,600	72,800	82,400	165,200	182,400	134,800	202,000	119,200	89,200
	110Q1	48,800	87,600	66,400	100,800	90,000	76,800	147,200	118,400	110,000
	110Q2	20,800	24,800	22,800	34,000	24,000	30,800	72,000	33,600	37,200
	110Q3	788,000	640,000	564,000	671,200	529,600	355,200	186,400	387,200	297,600
	110Q4	19,600	14,800	6,000	27,600	25,600	25,200	24,400	35,200	20,000
	111Q1	288,000	370,400	421,600	266,000	366,000	356,000	371,600	491,600	335,200
	111Q2	21,600	40,400	33,200	49,600	31,200	31,200	39,200	40,400	20,400
	111Q3	253,200	401,600	453,200	125,200	293,200	398,400	222,800	167,200	277,600
	111Q4	55,200	71,600	73,600	113,200	116,400	82,400	40,800	103,200	90,400
	112Q1	97,600	98,400	95,200	78,400	73,600	76,800	73,600	75,200	63,200
	112Q2	20,400	16,000	13,600	30,400	18,800	20,400	49,600	22,000	18,800
	112Q3	65,600	36,800	27,200	99,200	86,400	35,200	24,000	60,000	34,400
	112Q4	53,600	56,000	60,000	60,800	48,800	54,400	115,200	48,800	53,600
	113Q1	53,600	26,800	19,400	83,200	101,200	28,600	193,600	116,000	37,200
	113Q2	14,800	26,200	14,000	15,800	18,400	20,000	23,600	28,000	17,400
	113Q3	38,400	61,200	39,200	35,200	57,200	38,000	27,600	42,000	18,800
	113Q4	52,000	45,200	29,600	52,800	51,600	42,800	104,000	50,400	26,800
	114Q1	114,400	52,000	29,600	78,000	22,400	21,600	124,000	20,400	20,400
	114Q2	59,200	50,400	45,200	52,400	52,000	37,600	39,600	49,200	44,000
	114Q3	37,600	26,800	24,800	47,600	4,400	18,800	37,600	30,800	16,000
	114Q4	**27,600**	**23,600**	**28,000**	**11,600**	**24,800**	**27,600**	**21,200**	**23,200**	**18,000**
歷次平均		177,612								

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.9-2　　歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較表(3/5)

測站 / 季別		3A			3B			3C		
		表	中	底	表	表	中	底	中	表
細胞數/公升										
復工 104.06		9,120	3,420	7,600	7,600	3,420	1,520	15,960	1,140	2,280
施工期間	108Q1	108,000	30,400	24,000	72,000	71,200	52,800	47,200	56,000	62,400
	108Q2	131,200	146,400	112,800	177,600	114,400	87,200	99,200	114,400	84,000
	108Q3	1526,400	1,334,400	1,228,000	715,200	816,000	547,200	1,798,400	1,400,000	684,000
	108Q4	60,800	82,400	69,600	130,400	94,400	72,000	54,400	41,600	39,200
	109Q1	974,400	220,000	115,200	934,400	753,600	72,800	955,200	589,600	87,200
	109Q2	284,000	169,600	136,000	321,600	228,800	152,800	203,200	224,000	176,000
	109Q3	268,800	148,800	212,800	198,400	347,200	485,600	213,600	770,400	397,600
	109Q4	314,400	197,200	177,600	394,400	217,600	120,400	120,000	128,800	90,000
	110Q1	98,000	63,200	89,200	105,600	119,200	78,800	140,000	158,800	124,800
	110Q2	36,000	35,200	26,000	26,000	109,600	28,400	25,200	37,200	25,600
	110Q3	127,200	348,000	316,000	399,200	442,400	490,400	448,000	492,000	554,400
	110Q4	55,600	29,600	24,400	100,000	48,000	11,200	87,200	56,800	27,600
	111Q1	313,200	518,000	456,800	520,400	504,800	473,600	746,000	508,400	486,400
	111Q2	30,400	68,400	29,600	36,000	30,400	21,600	44,400	29,600	26,400
	111Q3	190,400	196,400	278,800	132,800	182,800	235,200	141,600	170,800	245,200
	111Q4	103,200	128,000	98,000	68,800	93,600	81,600	90,400	140,800	129,200
	112Q1	97,600	97,600	94,400	42,400	59,200	64,800	56,000	57,600	63,200
	112Q2	44,400	24,800	28,400	24,000	27,600	20,400	144,400	89,600	92,400
	112Q3	9,600	52,800	29,600	25,600	98,400	49,600	16,000	57,600	46,400
	112Q4	44,800	42,400	49,600	64,000	53,600	48,800	172,800	121,600	46,400
	113Q1	37,800	31,400	27,000	52,400	26,000	19,800	54,600	104,800	45,000
	113Q2	9,400	16,600	12,800	25,800	22,400	17,400	36,600	24,000	21,600
	113Q3	59,200	65,600	39,200	62,000	40,400	32,000	67,600	80,000	33,200
	113Q4	51,200	52,800	32,800	46,400	72,000	43,200	66,800	42,000	47,200
	114Q1	104,000	34,800	23,200	120,800	42,800	26,800	115,200	29,600	25,200
	114Q2	58,000	54,400	42,000	101,600	66,400	59,600	48,000	45,200	42,000
	114Q3	24,800	40,400	38,400	30,400	10,000	7,200	37,600	22,800	21,200
	114Q4	**35,600**	**32,000**	**58,800**	**24,800**	**21,200**	**20,800**	**8,000**	**13,200**	**18,000**
歷次平均		177,612								

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.9-2　　歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較表(4/5)

測站 / 季別		4A			4B			4C		
		表	中	底	表	中	底	表	中	底
細胞數/公升										
復工前 104.06		2,660	3,420	1,900	3,800	1,900	5,700	1,900	760	4,940
施工期間	108Q1	329,600	35,200	24,000	62,400	75,200	63,200	38,400	64,800	50,400
	108Q2	50,400	44,800	96,800	288,800	147,200	116,800	160,000	125,600	80,800
	108Q3	644,000	420,000	361,600	534,400	496,000	423,200	964,000	566,400	524,800
	108Q4	116,000	110,400	90,400	129,600	90,400	81,600	48,000	30,400	27,200
	109Q1	118,400	152,800	88,800	944,800	172,000	52,000	2,152,000	635,200	80,000
	109Q2	363,200	189,600	140,800	248,000	204,800	170,400	345,600	252,800	250,400
	109Q3	364,800	722,400	603,200	224,800	415,200	271,200	493,600	673,600	351,200
	109Q4	263,200	346,400	200,400	182,400	104,400	101,600	485,200	76,400	143,600
	110Q1	218,800	114,000	86,000	177,200	168,800	129,600	307,600	196,400	150,800
	110Q2	576,400	294,400	240,400	7,438,000	382,800	289,600	22,400	189,600	57,600
	110Q3	981,600	1,186,400	820,000	874,400	982,400	848,800	774,400	807,200	716,800
	110Q4	57,600	40,400	30,400	32,800	26,800	26,800	86,400	45,200	38,400
	111Q1	598,400	714,800	666,000	692,400	772,000	512,000	859,200	568,800	569,600
	111Q2	46,800	39,200	33,600	20,400	34,000	16,400	14,000	21,600	21,200
	111Q3	120,800	127,600	202,400	116,400	158,400	198,800	302,000	179,200	324,000
	111Q4	144,800	54,000	41,200	39,200	36,000	43,600	50,000	35,200	33,200
	112Q1	64,800	83,200	87,200	60,800	62,400	68,000	92,000	72,800	80,800
	112Q2	32,400	36,000	23,600	19,200	40,000	38,400	138,400	101,200	88,400
	112Q3	20,800	40,000	28,800	16,000	50,400	52,000	25,600	77,600	35,200
	112Q4	96,800	69,600	64,800	148,000	200,800	80,000	90,400	146,400	49,600
	113Q1	56,200	32,200	14,600	26,300	15,200	26,200	78,000	65,000	30,800
	113Q2	26,800	28,600	18,000	21,000	27,600	16,200	30,200	18,400	18,000
	113Q3	116,400	43,200	32,000	62,400	56,000	36,800	19,600	36,000	30,400
	113Q4	116,400	96,000	48,400	182,800	94,000	56,800	89,200	74,400	40,800
	114Q1	102,000	40,800	34,400	102,400	24,000	22,400	83,600	22,400	17,600
	114Q2	84,400	65,200	55,200	66,000	58,400	53,200	38,000	35,600	41,600
	114Q3	138,400	37,600	37,600	52,800	44,800	32,800	41,200	34,000	28,400
	114Q4	**32,000**	**23,200**	**26,800**	**31,600**	**22,000**	**26,400**	**40,400**	**15,600**	**16,000**
歷次平均		177,612								

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.9-2　　歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較表(5/5)

季別＼測站		5A			5B			5C			所有測線
		表	中	底	表	中	底	表	中	底	
細胞數/公升											
復工前 104.06		7,980	2,660	2,280	3,420	1,140	19,760	6,080	4,560	2,280	11,417
施工期間	108Q1	35,200	48,800	40,800	60,000	118,400	55,200	841,600	176,000	47,200	93,049
	108Q2	753,600	176,800	144,000	413,600	300,800	128,800	273,600	284,800	120,000	146,667
	108Q3	,1184,800	1,329,600	1,084,800	361,600	401,600	347,200	662,400	491,200	452,800	693,102
	108Q4	218,400	128,800	104,000	71,200	70,400	41,600	31,200	34,400	32,000	72,267
	109Q1	221,600	192,800	124,800	717,600	489,600	99,200	535,200	747,200	128,000	317,422
	109Q2	440,000	401,600	446,400	591,200	483,200	415,200	446,400	391,200	326,400	300,907
	109Q3	2,196,800	1,319,200	1,099,200	1,596,000	1,123,200	780,800	511,200	719,200	547,200	539,093
	109Q4	130,800	135,200	153,600	798,000	258,800	122,800	577,600	377,600	132,800	224,960
	110Q1	270,000	155,200	134,800	225,200	190,400	165,600	310,800	216,400	201,200	144,373
	110Q2	38,800	147,200	127,600	243,200	37,200	43,600	68,000	39,600	31,600	251,582
	110Q3	996,000	909,600	812,800	670,400	731,200	704,000	1,072,000	821,600	248,000	557,529
	110Q4	60,800	45,600	42,800	41,200	40,400	34,000	42,400	54,400	49,200	35,840
	111Q1	880,800	708,800	610,400	1414,000	964,400	864,800	954,400	737,600	569,200	552,551
	111Q2	316,00	60,000	38,800	13,600	20,400	23,200	11,200	18,800	20,000	39,040
	111Q3	348,800	265,600	290,800	212,800	404,400	320,000	775,600	526,800	218,000	321,307
	111Q4	44,000	43,200	34,000	46,000	51,200	27,600	73,600	56,400	43,600	76,027
	112Q1	55,200	61,600	73,600	66,400	69,600	61,600	25,600	63,200	72,000	74,791
	112Q2	111,200	105,200	102,400	186,000	153,200	104,800	127,200	114,400	18,000	54,933
	112Q3	4,000	50,400	41,600	52,800	67,200	33,600	11,200	36,800	34,400	43,538
	112Q4	148,000	60,000	34,400	161,600	40,000	47,200	66,400	40,800	61,600	79,342
	113Q1	22,200	17,600	6,400	49,400	25,600	22,200	26,000	31,400	34,200	46,424
	113Q2	129,600	33,400	20,200	56,000	50,400	18,200	31,400	39,600	16,200	25,356
	113Q3	55,200	47,200	32,000	37,200	34,400	29,200	44,400	47,200	36,000	53,831
	113Q4	89,200	40,800	42,800	100,800	50,400	43,200	71,600	46,800	46,000	59,289
	114Q1	101,200	25,200	17,200	48,000	30,400	19,600	27,200	15,600	20,000	50,311
	114Q2	17,600	39,200	38,000	65,200	36,800	41,200	60,000	40,400	44,400	51,307
	114Q3	47,600	35,600	27,600	131,600	37,600	20,400	31,200	30,800	22,400	36,320
	114Q4	**99,600**	**21,600**	**50,400**	**46,400**	**51,600**	**22,400**	**101,200**	**21,200**	**52,800**	**31,964**
歷次平均		177,612									

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.9-3　　歷季海域生態-植物性浮游生物優勢物種比較表(1/2)

季別 \ 優勢種		中文名	學名
施工期間	108Q1	束毛藻屬	*Trichodesmium* spp.
		海鏈藻屬	*Thalassiosira* spp.
		無明顯第三優勢種	
	108Q2	角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
		盒形藻屬	*Biddulphia* spp.
		無明顯第三優勢種	
	108Q3	束毛藻屬	*Trichodesmium* spp.
		角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
		無明顯第三優勢種	
	108Q4	盒形藻屬	*Biddulphia* spp.
		海鏈藻屬	*Thalassiosira* spp.
		無明顯第三優勢種	
	109Q1	束毛藻屬	*Trichodesmium* spp.
		盒形藻屬	*Biddulphia* spp.
		無明顯第三優勢種	
	109Q2	角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
		盒形藻屬	*Biddulphia* spp.
		無明顯第三優勢種	
	109Q3	角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
		束毛藻屬	*Trichodesmium* spp.
		無明顯第三優勢種	
	109Q4	束毛藻屬	*Trichodesmium* spp.
		角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
		無明顯第三優勢種	
	110Q1	角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
		中肋骨條藻	*Skeletonema costatum*
		無明顯第三優勢種	
	110Q2	束毛藻屬	*Trichodesmium* spp.
		角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
		無明顯第三優勢種	
	110Q3	角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
		擬星桿藻屬	*Asterionellopsis* spp.
		海鏈藻屬	*Thalassiosira* spp.
	110Q4	海鏈藻屬	*Thalassiosira* spp.
		盒形藻屬	*Biddulphia* spp.
		根管藻屬	*Rhizosolenia* spp.
	111Q1	角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
		海鏈藻屬	*Thalassiosira* spp.
		無明顯第三優勢種	
	111Q2	盒形藻屬	*Biddulphia* spp.
		角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
		小環藻屬	*Cyclotella* spp.

註 1：spp.意同屬複數種，sp.意同屬單種。

註 2：粗體表示本季數據。

表3.1.9-3　　歷季海域生態-植物性浮游生物優勢物種比較表(2/2)

季別 \ 優勢種		中文名	學名
施工期間	111Q3	角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
		海鏈藻屬	*Thalassiosira* spp.
		盒形藻屬	*Biddulphia* spp.
	111Q4	角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
		海鏈藻屬	*Thalassiosira* spp.
		盒形藻屬	*Biddulphia* spp.
	112Q1	圓篩藻屬	*Coscinodiscus* spp.
		小環藻屬	*Cyclotella* spp.
		角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
	112Q2	角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
		海鏈藻屬	*Thalassiosira* spp.
		小環藻屬	*Cyclotella* spp.
	112Q3	角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
		輻桿藻屬	*Bacteriastrum* spp.
		束毛藻屬	*Trichodesmium* spp.
	112Q4	束毛藻屬	*Trichodesmium* spp.
		角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
		海鏈藻屬	*Thalassiosira* spp.
	113Q1	角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
		海鏈藻屬	*Thalassiosira* spp.
		中肋骨條藻	*Skeletonema costatum*
	113Q2	束毛藻屬	*Trichodesmium* spp.
		角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
		海鏈藻屬	*Thalassiosira* spp.
	113Q3	束毛藻屬	*Trichodesmium* spp.
		角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
		盒形藻屬	*Biddulphia* spp.
	113Q4	盒形藻屬	*Biddulphia* spp.
		海鏈藻屬	*Thalassiosira* spp.
		角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
	114Q1	海鏈藻屬	*Thalassiosira* spp.
		圓石藻屬	*Emiliania* spp.
		圓篩藻屬	*Coscinodiscus* spp.
	114Q2	海鏈藻屬	*Thalassiosira* spp.
		盒形藻屬	*Biddulphia* spp.
		角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
	114Q3	角毛藻屬	*Chaetoceros* spp.
		盒形藻屬	*Biddulphia* spp.
		海鏈藻屬	*Thalassiosira* spp.
	114Q4	**海鏈藻屬**	***Thalassiosira* spp.**
		角毛藻屬	***Chaetoceros* spp.**
		盒形藻屬	***Biddulphia* spp.**

註 1：spp.意同屬複數種，sp.意同屬單種。

註 2：粗體表示本季數據。




圖 3.1.9-1　　歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較圖(1/15)




圖 3.1.9-1　　歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較圖(2/15)




圖 3.1.9-1　　歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較圖(3/15)




圖 3.1.9-1　　歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較圖(4/15)




圖 3.1.9-1　　歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較圖(5/15)




圖 3.1.9-1　　歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較圖(6/15)




圖 3.1.9-1　　歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較圖(7/15)




圖 3.1.9-1　　歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較圖(8/15)




圖 3.1.9-1　　歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較圖(9/15)




圖 3.1.9-1　　歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較圖(10/15)




圖 3.1.9-1　　歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較圖(11/15)




圖 3.1.9-1　　歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較圖(12/15)




圖 3.1.9-1　　歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較圖(13/15)




圖 3.1.9-1　　歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較圖(14/15)




圖 3.1.9-1　　歷季海域生態-植物性浮游生物數量結果比較圖(15/15)




圖 3.1.9-2　　歷次海域生態-植物性浮游生物平均種類及平均豐度數(cells/L)比較圖

二、浮游動物

本季(114 年 10 月)共發現浮游動物 24 大類，低於復工前的 27 大類(104 年 6 月)，各測站記錄到的大類數介於 15~22 大類之間，高於復工前的 11~21 大類；如與前一季(26 大類)相比，本季大類數略低，前一季的大類數介於 16~24 大類之間，與本季差別不大；去年同季發現 24 大類，與本季相當，且各站發現的大類數介於 16~23 大類之間，與本季差別不大；此外，本海域歷年平均發現 26 大類的浮游動物，屬於物種數豐富的海域(**表 3.1.9-4、圖 3.1.9-3~4**)。

本季各測站的豐度介於 55,277 ind./1,000 m^3~190,841 ind./1,000 m^3 之間，較復工前(120,416 ind./1,000 m^3~3,130,067 ind./1,000 m^3)低許多；而上一季各測站的豐度介於 58,041 ind./1,000 m^3~212,664 ind./1,000 m^3 之間，略高於本季；如與去年同季相比，去年各測站的豐度變化(47,404 ind./1,000 m^3~208,975 ind./1,000 m^3)較本季高些；此外，本海域歷年平均豐度為 106,133 ind./1,000 m^3，而本季有部分測站的豐度低於歷年平均(**表 3.1.9-4、圖 3.1.9-3~4**)。

以歷季的各優勢大類來看，此海域的第一優勢大類多為哲水蚤，第二優勢大類多為劍水蚤，偶而會是藤壺幼生和毛顎類，本季則是劍水蚤，而第三優勢大類以藤壺幼生、毛顎類、猛水蚤、橈足類幼生和蟹類幼生較常出現，本季則是藤壺幼生(**表 3.1.9-5**)。

如以鄰近工業區的測站(3A)為分界，右邊海域(1A 與 2A)以及左邊海域(4A 與 5A)的浮游動物豐度，本季不論在群集分析結果或是統計分析來看，均無顯著不同；而在主要優勢大類方面，鄰近工業區的 3A 測站前三優勢大類分別為哲水蚤、劍水蚤和藤壺幼生，而此三大類的浮游動物，同時也是 1A、2A、4A 和 5A 的前幾優勢大類，顯見這些測站的浮游動物種類組成亦無明顯差異。

此外，觀塘海域本季浮游動前六優勢大類分別為哲水蚤（相對豐度 48.74%）、劍水蚤（相對豐度 15.85%）、藤壺幼生（相對豐度 7.58%）、猛水蚤（相對豐度 6.41%）、蝦類幼生（相對豐度 5.51%）及橈足類幼生（相對豐度 3.13%），這些物種也是台灣西南海域常常發現的浮游動物。

本研究發現觀塘海域屬於沙質沉積型海域環境，附近又有多條河川流入，所以很容易受到自然環境變化、陸源水及排放水等因子而產生物化性的擾動及影響，進而影響棲息其中之浮游動物類群組成及數量的消長。

表3.1.9-4　　歷季海域生態-動物性浮游生物結果比較表(1/3)

季別＼測站		1A	1B	1C	2A	2B	2C	3A	3B	3C	4A	4B	4C	5A	5B	5C	所有測線
物種數																	
復工前(104.06)		15	17	21	15	18	21	17	21	16	11	12	17	17	10	14	27
施工期間	108Q1	17	18	16	11	13	15	15	12	12	16	10	11	15	12	13	21
	108Q2	13	18	16	12	16	16	13	17	20	16	15	17	15	17	18	22
	108Q3	15	16	15	14	14	15	16	14	17	17	15	20	13	15	19	22
	108Q4	13	19	14	18	18	17	17	15	16	17	17	17	14	20	16	26
	109Q1	15	16	12	13	17	13	15	14	14	13	19	15	15	12	12	22
	109Q2	19	16	17	19	24	15	22	18	20	16	14	19	24	23	21	28
	109Q3	20	22	19	20	14	19	18	20	23	22	18	19	20	19	18	28
	109Q4	26	20	20	21	22	18	20	21	24	25	24	23	25	25	22	30
	110Q1	20	25	24	17	19	16	20	22	21	18	19	18	20	21	23	31
	110Q2	22	20	22	17	21	24	21	20	22	20	20	22	21	26	23	30
	110Q3	18	25	23	17	19	22	21	19	16	26	25	21	17	23	24	29
	110Q4	16	19	23	15	17	19	18	17	20	17	18	19	18	16	19	28
	111Q1	18	19	16	19	17	17	20	16	15	21	18	19	23	21	22	26
	111Q2	22	16	19	25	20	22	19	18	19	20	17	19	23	19	20	27
	111Q3	17	21	21	20	23	19	20	20	21	19	20	22	19	22	19	27
	111Q4	18	19	16	21	15	17	17	19	17	20	16	18	18	16	16	23
	112Q1	15	16	18	19	13	15	19	16	17	16	17	17	20	19	18	22
	112Q2	13	15	17	18	13	16	15	15	15	17	17	19	17	19	21	22
	112Q3	14	16	17	17	20	18	16	15	19	16	21	20	18	20	23	24
	112Q4	16	19	18	16	16	18	15	17	16	19	20	21	19	20	22	24
	113Q1	23	19	17	21	20	18	20	19	19	23	24	20	21	18	20	27
	113Q2	20	18	22	19	21	21	22	20	21	23	23	23	21	25	22	28
	113Q3	16	22	18	18	20	23	19	19	17	17	18	20	23	22	20	26
	113Q4	16	18	17	17	19	17	18	17	21	17	18	20	23	21	20	24
	114Q1	16	17	16	16	17	18	15	17	20	16	17	21	18	16	19	23
	114Q2	17	16	20	21	19	17	15	18	22	18	20	19	21	24	20	24
	114Q3	17	21	18	18	17	22	21	23	17	16	18	17	23	24	20	26
	114Q4	**15**	**16**	**20**	**18**	**16**	**22**	**19**	**17**	**19**	**16**	**17**	**18**	**22**	**21**	**19**	**24**
歷次平均		26															

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.9-4　　歷季海域生態-動物性浮游生物結果比較表(2/3)

測站 / 季別		1A	1B	1C	2A	2B	2C	3A	3B
數量(細胞數/公升)									
復工前(104.06)		286,436	375,207	378,964	601,968	659,659	2,157,587	1,638,906	2,167,820
施工期間	108Q1	71,259	123,130	112,840	58,401	98,894	40,288	44,924	34,373
	108Q2	73,014	121,604	81,170	77,358	83,541	92,112	67,177	119,887
	108Q3	91,066	103,983	82,305	73,854	81,768	145,615	120,368	68,058
	108Q4	39,564	69,881	40,487	65,583	84,358	58,223	62,779	62,789
	109Q1	105,312	163,881	41,854	136,318	214,783	57,164	115,825	63,384
	109Q2	215,376	135,981	91,813	121,601	240,427	93,981	265,112	139,360
	109Q3	181,542	196,592	81,130	115,570	53,390	119,642	66,861	109,281
	109Q4	102,170	62,388	54,950	66,858	51,370	39,814	52,700	71,678
	110Q1	71,984	125,884	105,192	56,211	82,554	46,901	93,343	92,352
	110Q2	98,331	48,872	71,973	31,187	60,484	101,942	67,315	65,073
	110Q3	157,946	325,870	222,189	123,639	192,970	244,301	230,760	173,705
	110Q4	73,375	43,722	35,423	103,669	74,546	31,688	41,641	54,131
	111Q1	77,189	117,875	76,971	121,378	104,783	115,623	123,929	63,798
	111Q2	187,441	55,539	116,009	257,417	204,536	220,052	90,234	92,834
	111Q3	39,977	77,335	81,469	56,327	150,228	73,860	84,847	78,557
	111Q4	54,166	73,031	42,620	84,339	44,777	62,424	65,811	66,310
	112Q1	29,953	36,349	44,354	77,182	28,877	55,346	81,204	64,799
	112Q2	36,730	42,588	52,726	46,257	44,373	37,634	31,163	38,811
	112Q3	49,964	59,547	68,002	78,979	146,628	80,074	50,767	70,318
	112Q4	66,422	120,976	73,910	65,035	51,116	101,020	50,171	81,016
	113Q1	197,471	93,675	58,158	135,188	123,180	79,054	158,567	126,271
	113Q2	139,959	85,529	208,129	127,542	135,795	155,575	141,765	144,040
	113Q3	74,000	178,734	96,484	113,951	141,668	272,978	103,534	103,803
	113Q4	47,404	76,195	69,852	61,600	83,690	76,780	121,996	69,793
	114Q1	50,424	62,800	54,855	83,771	61,106	61,136	45,077	69,475
	114Q2	100,629	90,807	130,364	217,785	103,114	65,812	69,563	85,297
	114Q3	88,120	130,406	77,279	79,981	108,431	128,316	116,831	156,258
	114Q4	**65,577**	**79,607**	**106,632**	**97,113**	**55,277**	**149,413**	**88,633**	**87,859**
歷次平均		106,133							

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。.

表3.1.9-4　　歷季海域生態-動物性浮游生物結果比較表(3/3)

季別＼測站		3C	4A	4B	4C	5A	5B	5C	所有測線
數量(細胞數/公升)									
復工前(104.06)		277,482	561,207	995,976	3,130,067	1,040,147	120,416	1,181,524	1,038,224
施工期間	108Q1	67,670	35,729	25,754	24,772	32,312	14,517	54,813	55,978
	108Q2	292,728	111,699	84,985	173,776	140,003	134,140	124,270	118,498
	108Q3	118,440	170,554	74,315	217,164	53,642	83,857	110,532	106,368
	108Q4	47,005	62,470	80,472	40,820	55,180	84,015	59,655	60,885
	109Q1	56,106	59,732	243,849	100,563	72,234	50,960	104,013	105,732
	109Q2	181,150	103,058	77,187	140,493	285,993	326,638	175,770	172,929
	109Q3	304,570	126,519	74,769	112,704	172,973	101,530	127,406	129,632
	109Q4	69,210	78,650	70,321	72,696	83,291	91,281	68,118	69,033
	110Q1	95,832	69,073	64,346	54,865	71,492	99,706	83,385	80,875
	110Q2	61,052	59,011	50,456	77,582	82,353	161,291	76,085	74,200
	110Q3	97,133	315,427	257,122	159,841	119,177	207,365	206,609	202,270
	110Q4	38,242	35,526	68,235	34,456	51,424	60,694	52,879	53,310
	111Q1	63,993	172,263	99,049	117,015	191,775	138,621	116,521	113,386
	111Q2	118,983	131,337	100,672	122,851	232,985	116,627	143,874	146,093
	111Q3	63,151	54,873	77,472	117,400	59,366	98,934	78,357	79,477
	111Q4	58,217	70,439	54,751	56,258	70,506	60,807	61,553	61,734
	112Q1	104,245	90,944	85,892	76,708	101,512	118,062	73,821	71,283
	112Q2	28,119	57,914	60,546	160,191	88,402	142,858	151,123	67,962
	112Q3	97,470	78,454	146,520	168,671	166,882	123,821	330,077	114,411
	112Q4	66,216	93,454	115,966	102,152	80,977	102,448	173,954	89,656
	113Q1	137,650	152,415	170,761	105,080	123,464	77,875	85,159	121,598
	113Q2	198,538	253,717	239,868	229,016	211,752	292,140	293,421	190,452
	113Q3	110,936	93,578	129,608	164,519	279,115	214,534	182,240	150,645
	113Q4	126,267	97,864	102,002	174,128	208,975	202,401	155,886	111,656
	114Q1	97,962	42,251	59,325	275,006	98,328	71,547	114,275	83,156
	114Q2	124,564	81,283	135,752	104,880	144,151	240,778	161,436	123,748
	114Q3	91,172	73,764	81,375	58,041	137,444	212,664	120,713	110,720
	114Q4	**92,289**	**93,349**	**105,999**	**90,685**	**164,051**	**190,841**	**123,246**	**106,038**
歷次平均		106,133							

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.9-5　　歷季海域生態-動物性浮游動物優勢大類比較表(1/2)


季別＼優勢種		中文名	學名
施工期間	108Q1	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		藤壺幼生	Barnacle nauplius
	108Q2	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		毛顎類	Chaetognatha
	108Q3	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		猛水蚤	Harpacticoida
	108Q4	哲水蚤	Calanoida
		藤壺幼生	Barnacle nauplius
		橈足類幼生	Copepoda nauplius
	109Q1	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		藤壺幼生	Barnacle nauplius
	109Q2	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		毛顎類	Chaetognatha
	109Q3	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		毛顎類	Chaetognatha
	109Q4	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		蟹類幼生	Crab zoea
	110Q1	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		橈足類幼生	Copepoda nauplius
	110Q2	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		螢蝦類	Lucifera
	110Q3	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		管水母	Siphonophora
	110Q4	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		管水母	Siphonophora
	111Q1	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		管水母	Siphonophora
	111Q2	哲水蚤	Calanoida
		管水母	Siphonophora
		劍水蚤	Cyclopoida

註：粗體表示本季數據。

表3.1.9-5　　歷季海域生態-動物性浮游動物優勢大類比較表(2/2)

季別＼優勢種		中文名	學名
施工期間	111Q3	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		翼足類	Pteropoda
	111Q4	哲水蚤	Calanoida
		尾蟲類	Appendicularia
		劍水蚤	Cyclopoida
	112Q1	哲水蚤	Calanoida
		橈足類幼生	Copepoda nauplius
		劍水蚤	Cyclopoida
	112Q2	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		橈足類幼生	Copepoda nauplius
	112Q3	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		蝦類幼生	Shrimp larva
	112Q4	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		管水母	Siphonophora
	113Q1	哲水蚤	Calanoida
		橈足類幼生	Copepoda nauplius
		劍水蚤	Cyclopoida
	113Q2	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		蟹類幼生	Crab zoea
	113Q3	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		橈足類幼生	Copepoda nauplius
	113Q4	哲水蚤	Calanoida
		毛顎類	Chaetognatha
		劍水蚤	Cyclopoida
	114Q1	哲水蚤	Calanoida
		橈足類幼生	Copepoda nauplius
		劍水蚤	Cyclopoida
	114Q2	哲水蚤	Calanoida
		毛顎類	Chaetognatha
		劍水蚤	Cyclopoida
	114Q3	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		毛顎類	Chaetognatha
	114Q4	**哲水蚤**	**Calanoida**
		劍水蚤	**Cyclopoida**
		藤壺幼生	**Barnacle nauplius**


註：粗體表示本季數據。



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M


圖 3.1.9-3　　歷季海域生態-動物性浮游生物數量結果比較圖(1/5)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M


圖 3.1.9-3　　歷季海域生態-動物性浮游生物數量結果比較圖(2/5)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M


圖 3.1.9-3　　歷季海域生態-動物性浮游生物數量結果比較圖(3/5)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M

圖 3.1.9-3　　歷季海域生態-動物性浮游生物數量結果比較圖(4/5)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M

圖 3.1.9-3　　歷季海域生態-動物性浮游生物數量結果比較圖(5/5)




圖 3.1.9-4　　歷次海域生態-動物性浮游生物平均種類數及平均豐度(ind./1000m^3)比較圖

三、底棲生物

本季(114年10月)底棲生物物種數以軟體動物佔最多(45.79%)，其次為節肢動物(23.68%)；生物個體隻數以軟體動物最多(52.26%)，其次為節肢動物(20.76%)；本季捕獲優勢種同樣以小型的底棲生物為主，軟體動物優勢種為殼菜蛤、櫻蛤、織紋螺、象牙貝、抱蛤、簾蛤等，節肢動物有長臂蝦、藤壺、端足目、對蝦、寄居蟹等，刺胞動物門優勢種有檜葉螅、圓錐珊瑚、羽螅等，星蟲動物的優勢種為盾管星蟲**(表2.8.3-1、圖2.8.3-2~3)**，上述物種為臺灣西部海域泥沙地普遍出現之種類，食性多為攝食水體中藻類、懸浮物或砂泥底質中的有機碎屑，屬於濾食者(Filter/Suspension feeder)、清除者(Scavenger)與食碎屑者(Deposit feeder)的角色；此外，因調查區域鄰近藻礁環境以及偶有採獲鵝卵石塊，會出現西部海域軟底質較不常見之生物相，多為附著性生物如水螅、珊瑚等，且亦有機會採集到棲息在硬底質環境或是藏匿在多孔隙環境之生物，如多毛類、端足類、殼菜蛤、陽隧足、瓷蟹等；歷次採樣並未捕獲稀有種或獨特種。

本季調查(190種3,410隻生物個體)捕獲物種數及個體隻數皆高於復工前(9種212隻生物個體)；由108~114年歷次調查可看出本季調查物種數190種高於歷年同季物種數108年(150種)、109年(148種)、110年(141種)、112年(177種)、113年(169種)，物種數低於111年(196種)；本季生物個體數歷次調查高於108年(1,704)、109年(1,976個體)、110年(2,812個體)、111年(2,266個體)、112年(3,078個體)、113年(2,509個體)；施工期間歷次平均的物種數為163種，生物個體隻數為2,488隻，本季捕獲物種及生物個體數皆高於歷次平均 **(表 3.1.9-6~7、圖 3.1.9-5~6)**。

表3.1.9-6　　歷季海域生態-底棲生物結果比較表(1/2)

季別＼測站		1A	1B	1C	2A	2B	2C	3A	3B	3C	4A	4B	4C	5A	5B	5C	所有測線
物種數																	
復工前(104.06)		5	3	4	5	7	3	4	2	3	3	1	3	3	1	4	9
施工期間	108Q1	11	18	22	24	13	9	5	21	4	13	6	4	11	13	10	72
	108Q2	27	15	16	50	6	25	28	23	27	28	25	18	16	26	47	157
	108Q3	13	48	22	32	54	33	32	18	18	17	77	29	38	74	46	181
	108Q4	34	25	15	25	14	17	39	42	11	19	29	5	51	23	14	150
	109Q1	13	37	19	10	12	21	12	20	12	23	16	29	36	24	16	113
	109Q2	8	17	18	10	16	27	20	13	15	22	26	14	25	29	51	127
	109Q3	49	35	38	57	10	23	52	11	17	21	19	21	44	2	7	168
	109Q4	21	27	21	27	21	21	19	31	22	25	13	47	37	37	31	148
	110Q1	10	3	10	38	25	12	14	22	6	24	24	45	41	19	25	135
	110Q2	9	19	19	40	22	7	49	24	8	18	29	24	32	34	10	146
	110Q3	52	14	17	44	20	19	21	36	14	33	19	38	33	21	11	155
	110Q4	39	31	16	19	18	18	5	36	28	37	23	30	22	29	9	141
	111Q1	55	18	8	42	21	12	25	12	7	16	13	13	30	17	20	145
	111Q2	48	13	30	10	17	24	23	4	18	23	7	74	33	25	25	176
	111Q3	37	37	29	57	32	9	27	35	23	19	26	51	50	41	27	201
	111Q4	26	13	12	22	35	13	45	33	29	35	34	52	51	30	24	196
	112Q1	48	41	18	24	8	35	20	28	14	19	31	38	23	20	12	168
	112Q2	0	4	14	46	19	18	22	21	16	25	29	50	41	30	16	166
	112Q3	46	28	17	28	35	32	26	15	25	33	40	35	35	59	79	212
	112Q4	38	14	11	32	21	20	17	16	16	18	15	58	44	38	28	177
	113Q1	22	8	9	20	24	16	21	20	6	22	18	8	32	47	43	146
	113Q2	44	34	14	17	24	10	21	49	15	21	52	67	32	44	30	205
	113Q3	11	19	12	13	18	22	26	28	21	11	21	57	33	27	26	170
	113Q4	47	16	18	25	27	19	10	37	23	24	20	54	27	34	28	169
	114Q1	10	12	17	10	11	10	20	9	19	16	18	86	16	18	35	163
	114Q2	30	16	20	25	17	17	33	13	9	20	17	77	29	47	22	165
	114Q3	64	40	18	38	28	7	38	30	11	26	90	49	27	28	57	224
	114Q4	**27**	**35**	**25**	**47**	**16**	**20**	**29**	**18**	**35**	**56**	**44**	**39**	**27**	**41**	**46**	**190**
歷次平均		163															

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.9-6　　歷季海域生態-底棲生物結果比較表(2/2)

測站 / 季別		1A	1B	1C	2A	2B	2C	3A	3B	3C	4A	4B	4C	5A	5B	5C	所有測線
個體數																	
復工前 (104.06)		35	10	15	19	25	13	19	10	4	14	7	3	12	9	17	212
施工期間	108Q1	28	43	194	338	58	98	10	175	14	57	15	17	204	92	38	1,381
	108Q2	99	71	148	303	30	473	181	207	239	129	190	44	90	87	464	2,755
	108Q3	33	163	100	169	243	123	165	144	58	133	1,272	86	276	1,099	219	4,283
	108Q4	206	34	87	148	59	60	143	221	50	65	54	5	486	54	32	1,704
	109Q1	55	400	153	19	27	80	35	68	24	99	39	96	182	59	40	1,376
	109Q2	29	36	283	42	39	138	353	28	77	73	367	97	62	146	231	2,001
	109Q3	212	176	1179	424	11	437	203	37	37	76	43	119	417	2	12	3,385
	109Q4	76	130	111	182	63	120	45	115	155	68	16	167	530	93	105	1,976
	110Q1	35	20	30	278	135	35	43	46	203	85	62	119	677	61	71	1,900
	110Q2	36	73	146	259	55	21	357	85	16	35	70	37	194	106	26	1,516
	110Q3	474	58	69	476	68	48	124	138	41	197	138	236	256	72	22	2,417
	110Q4	155	99	69	33	136	54	10	183	973	196	137	213	343	199	12	2,812
	111Q1	548	50	12	287	193	134	105	33	21	28	68	45	341	100	40	2,005
	111Q2	579	50	133	20	59	79	33	5	516	108	14	392	218	141	175	2,522
	111Q3	94	83	92	448	65	16	86	207	104	59	123	457	634	240	303	3,011
	111Q4	72	26	22	67	216	64	170	79	79	114	192	528	477	91	69	2,266
	112Q1	263	174	92	134	10	156	65	82	37	167	80	193	63	113	25	1,654
	112Q2	0	7	67	286	44	60	109	88	52	94	94	97	497	140	56	1,691
	112Q3	124	68	61	76	100	213	107	24	215	61	173	329	327	638	615	3,131
	112Q4	235	25	308	144	97	142	52	47	347	38	51	532	597	256	207	3,078
	113Q1	58	18	119	145	309	109	176	98	16	57	60	12	1,478	688	232	3,575
	113Q2	303	89	57	69	258	35	126	184	38	67	189	373	805	305	226	3,124
	113Q3	12	35	84	19	48	195	74	105	57	18	75	281	182	129	110	1,424
	113Q4	194	37	125	68	114	517	21	209	71	51	46	369	390	184	113	2,509
	114Q1	16	64	42	23	39	28	94	18	442	196	39	439	48	67	189	1,744
	114Q2	157	29	461	65	35	143	221	55	19	45	30	458	607	820	53	3,198
	114Q3	677	141	114	111	102	11	133	146	17	59	949	354	197	212	602	3,825
	114Q4	**177**	**125**	**134**	**206**	**45**	**225**	**193**	**43**	**597**	**273**	**194**	**417**	**170**	**442**	**169**	**3,410**
歷次平均		2,488															

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.9-7　　歷季海域生態-底棲生物優勢物種比較表(1/3)

季別＼優勢種		中文名	學名
施工期間	108Q1	頂管象牙貝	*Episiphon virgula*
		珊瑚蜊	*Gregariella coralliophaga*
		糠蝦科	Mysidae sp**.**
	108Q2	頂管象牙貝	*Episiphon virgula*
		端足類	Amphipoda sp.
		光滑象牙貝	*Laevidentalium coruscum*
	108Q3	端足類	Amphipoda sp.
		水螅	Sertulariidae sp.
		海羊齒目	Comatulida sp.
	108Q4	端足類	Amphipoda sp.
		小塔織紋螺	*Nassarius teretiusculus*
		小亮櫻蛤	*Nitidotellina minuta*
	109Q1	糠蝦科	Mysidae sp**.**
		端足類	Amphipoda sp.
		無明顯第三優勢種	
	109Q2	糠蝦科	Mysidae sp**.**
		羽螅科	Aglaopheniidae sp.
		端足類	Amphipoda sp.
	109Q3	胖象牙貝	*Gadila anguidens*
		頂管象牙貝	*Episiphon virgula*
		端足類	Amphipoda sp.
	109Q4	彩虹蝠螺	*Umbonium vestiarium*
		珊瑚蜊	*Gregariella coralliophaga*
		多鱗蟲科	Polynoidae sp.
	110Q1	珊瑚蜊	*Gregariella coralliophaga*
		糠蝦科	Mysidae sp.
		小亮櫻蛤	*Nitidotellina minuta*
	110Q2	修長細螯蝦	*Leptochela gracilis*
		多鱗蟲科	Polynoidae sp.
		頂管象牙貝	*Episiphon virgula*
	110Q3	修長細螯蝦	*Leptochela gracilis*
		海羊齒目	Comatulida sp.
		多鱗蟲科	Polynoidae sp.
	110Q4	珊瑚蜊	*Gregariella coralliophaga*
		尖頂織紋螺	*Nassarius succinctus*
		檜葉螅科	Sertulariidae sp.

註 1：spp.意同屬複數種，sp.意同屬單種。

註 2：粗體表示本季數據。

表3.1.9-7　　歷季海域生態-底棲生物優勢物種比較表(2/3)

季別＼優勢種		中文名	學名
施工期間	111Q1	北海道櫻蛤	*Nitidotellina valtonis*
		帚毛蟲科	Sabellariidae sp.
		盾管星蟲科	Aspidosiphonidae sp.
	111Q2	珊瑚蝌	*Gregariella coralliophaga*
		帚毛蟲科	Sabellariidae sp.
		光滑象牙貝	*Laevidentalium coruscum*
	111Q3	頂管象牙貝	*Episiphon virgula*
		胖象牙貝	*Gadila anguidens*
		檜葉螅科	Sertulariidae sp.
	111Q4	圓錐珊瑚科	Turbinoliidae sp.
		檜葉螅科	Sertulariidae sp.
		胖象牙貝	*Gadila anguidens*
	112Q1	皺肋文蛤	*Meretrix lyrata*
		多鱗蟲科	Polynoidae sp.
		裝飾擬豆瓷蟹	*Enosteoides ornatus*
	112Q2	糠蝦科	Mysidae sp.
		皺肋文蛤	*Meretrix lyrata*
		帚毛蟲科	Sabellariidae sp.
	112Q3	胖象牙貝	*Gadila anguidens*
		頂管象牙貝	*Episiphon virgula*
		長臂蝦科	Palaemonidae sp.
	112Q4	珊瑚蝌	*Gregariella coralliophaga*
		頂管象牙貝	*Episiphon virgula*
		北海道櫻蛤	*Nitidotellina valtonis*
	113Q1	北海道櫻蛤	*Nitidotellina valtonis*
		糠蝦科	Mysidae sp.
		盾管星蟲科	Aspidosiphonidae sp.
	113Q2	皺肋文蛤	*Meretrix lyrata*
		北海道櫻蛤	*Nitidotellina valtonis*
		盾管星蟲科	Aspidosiphonidae sp.
	113Q3	盾管星蟲科	Aspidosiphonidae sp.
		長臂蝦科	Palaemonidae sp.
		胖象牙貝	*Gadila anguidens*
	113Q4	盾管星蟲科	Aspidosiphonidae sp.
		北海道櫻蛤	*Nitidotellina valtonis*
		長臂蝦科	Palaemonidae sp.


註 1：spp.意同屬複數種，sp.意同屬單種。

註 2：粗體表示本季數據。

表3.1.9-7　　歷季海域生態-底棲生物優勢物種比較表(3/3)

季別＼優勢種		中文名	學名
施工期間	114Q1	珊瑚蜊	*Gregariella coralliophaga*
		帚毛蟲科	Sabellariidae sp.
		檜葉螅科	Sertulariidae sp.
	114Q2	盾管星蟲科	Aspidosiphonidae sp.
		北海道櫻蛤	*Nitidotellina valtonis*
		日本馬珂蛤	*Mactra nipponica*
	114Q3	檜葉螅科	Sertulariidae sp.
		盾管星蟲科	Aspidosiphonidae sp.
		頂管象牙貝	*Episiphon virgula*
	114Q4	**北海道櫻蛤**	***Nitidotellina valtonis***
		珊瑚蜊	***Gregariella coralliophaga***
		檜葉螅科	**Sertulariidae sp.**


註 1：spp.意同屬複數種，sp.意同屬單種。
註 2：粗體表示本季數據。



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。


圖 3.1.9-5　　歷季海域生態-底棲生物數量結果比較圖(1/5)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。


圖 3.1.9-5　　歷季海域生態-底棲生物數量結果比較圖(2/5)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。


圖 3.1.9-5　　歷季海域生態-底棲生物數量結果比較圖(3/5)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

圖 3.1.9-5　　歷季海域生態-底棲生物數量結果比較圖(4/5)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。
註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

圖 3.1.9-5　　歷季海域生態-底棲生物數量結果比較圖(5/5)




圖 3.1.9-6　　歷次海域生態-底棲生物平均種類數及平均豐度(個體隻數)比較圖

四、魚類(仔稚魚及魚卵)

整體來說，114年10月於觀塘附近海域採得之浮游性仔稚魚種包括沙泥底質及礁砂交匯底質棲地之中、小型魚種，調查結果大致符合附近海域之棲地型態，而採得之魚種亦屬臺灣西部海域普遍出現之魚種大類。

本季之採樣結果相較於上一季(114年7月)，本季調查到浮游性仔稚魚3科3屬3種，上一季則為4種。兩季調查採得之魚種數差異不大，魚種部分僅小鱗沙鮻(*Sillago parvisquamis*)有重疊，而仔稚魚平均豐度方面則以上季較高(**表3.1.9-8**)。

本季之採樣結果相較於113年同期(10月)，113年10月調查到浮游性仔稚魚有6種，與本季(114年10月)相較，本季少了3種，採得魚種不盡相同，但小鱗沙鮻兩時期皆有採得。整體看來，本年度同期採得仔稚魚之魚種數較少，但仔稚魚平均豐度方面則較去年度同期來得高。採得魚種主要皆為台灣西部海域常見之魚種，顯示一年來海域之底質魚類棲地型態應無太大變化。

另外，在113年10月採得之魚卵豐度方面，以觀塘工業區近岸測站3B豐度最高，為2,576ind./1,000m^3，各測站魚卵之平均豐度則為343±165 ind./1,000m^3。相較於本年度同期(10月)，本年度採得之魚卵平均豐度則較高(本年度同期魚卵平均豐度為430±180ind./1,000m^3，魚卵豐度最高之測站為社子溪口外5C測站(2,657 ind./1,000m^3)。

將本季採樣結果與復工前(104年5~7月)該區背景調查資料相較，104年調查結果中，浮游性仔稚魚僅採得6科6屬6種(**表3.1.9-8**)，以燈籠魚科之一種最為優勢，各測站仔稚魚豐度約在0~4,455ind./1,000m^{3}之間；本季之調查結果與復工前相較，魚種則大不相同，大致來說，本季採得之仔稚魚樣本尚屬台灣西部海岸普遍出現之大類。由長期之調查結果看來，當地海域魚種組成似乎已隨年代更迭而有所改變。

比較歷季採得魚種數及平均值，各季採得魚種數約介於1~16種之間，魚種數歷季平均值為7(不含復工前資料)；各季採得仔稚魚總豐度介於6~1,672 ind./1000m^{3}之間，歷季仔稚魚豐度平均值則為281ind./1000m^3(不含復工前資料)(**表3.1.9-8**、**圖3.1.9-7**、**圖3.1.9-8**)。

比較本案歷次採得優勢魚種，可看出調查結果皆以沙泥底質魚種為主，偶有礁沙交匯棲地魚種、洄游魚種及深海魚種(極少出現)，其中亦不乏經濟性魚種(表3.1.9-9)。由歷次採得魚種棲地屬性看來，當地海域之棲地類型應屬礁沙交匯地形，且多年來無太大變動。

表3.1.9-8　　歷季海域生態-仔稚魚結果比較表(1/2)

測站 / 季別		1A	1B	1C	2A	2B	2C	3A	3B	3C	4A	4B	4C	5A	5B	5C	所有測線
豐度(ind./1,000m^3)																	
復工前(104.06)		0	0	0	4,379	3,654	0	0	2,715	0	0	0	573	4,455	0	1,152	1,129
施工期間	108Q1	0	0	53	73	0	525	52	0	202	48	75	141	1,209	351	968	247
	108Q2	0	116	265	50	145	112	101	69	0	89	112	359	0	78	1,173	178
	108Q3	0	0	40	0	65	156	204	0	125	127	0	1,566	127	911	760	272
	108Q4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93	0	0	0	0	6
	109Q1	0	0	34	0	0	0	0	133	46	0	0	1,993	0	299	929	229
	109Q2	0	104	369	0	0	387	0	0	129	125	41	624	0	0	478	150
	109Q3	0	30	0	0	0	0	77	32	0	0	29	0	271	0	0	29
	109Q4	0	0	0	134	0	37	510	108	0	457	1,738	88	172	1,252	0	300
	110Q1	151	0	0	0	236	0	0	0	0	187	452	1,968	130	0	0	208
	110Q2	0	0	236	0	103	290	0	0	423	739	634	213	0	1,386	404	295
	110Q3	0	0	0	0	0	0	0	96	268	0	0	119	0	0	617	73
	110Q4	0	27	80	0	79	94	113	0	0	52	0	33	171	543	283	98
	111Q1	622	998	683	0	1,002	2,871	0	401	745	681	7,418	3,986	1,394	3,590	690	1,672
	111Q2	822	85	648	396	478	180	163	0	320	0	272	842	4,803	7,660	2,584	1,284
	111Q3	0	0	0	0	151	42	0	0	848	0	0	7,418	358	1,265	998	739
	111Q4	37	112	451	0	103	115	0	0	329	0	112	289	1,215	8,964	1,021	850
	112Q1	0	0	48	32	27	161	31	46	141	0	0	32	0	179	147	56
	112Q2	32	29	79	0	37	0	51	37	441	105	28	546	69	0	282	116
	112Q3	29	0	0	0	42	64	30	0	35	28	73	0	137	0	352	53
	112Q4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	0	59	43	8
	113Q1	334	0	0	0	0	300	116	0	0	0	66	428	0	140	0	92
	113Q2	27	198	836	31	103	282	0	95	248	0	166	2,210	1,572	34	200	400
	113Q3	0	113	0	0	0	0	0	0	0	66	0	0	0	0	55	16
	113Q4	0	58	25	0	0	0	0	0	39	0	27	114	51	57	0	25
	114Q1	0	26	0	29	0	16	0	0	176	21	24	173	988	288	170	128
	114Q2	38	51	36	0	0	71	0	0	166	85	68	40	0	0	0	37
	114Q3	0	35	0	0	0	35	0	0	0	0	0	0	30	0	26	8
	114Q4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**199**	**0**	**0**	**741**	**72**	**2,975**	**591**	**305**
歷次平均		281															

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.9-8　　歷季海域生態-仔稚魚結果比較表(2/2)

季別＼測站		1A	1B	1C	2A	2B	2C	3A	3B	3C	4A	4B	4C	5A	5B	5C	所有測線
魚種數																	
復工前(104.06)		0	0	0	1	2	0	0	1	0	0	0	1	2	0	1	6
施工期間	108Q1	0	0	1	1	0	3	2	0	3	1	1	5	8	5	5	10
	108Q2	0	2	1	1	2	2	2	1	0	1	2	2	0	1	4	5
	108Q3	0	0	1	0	2	1	3	0	1	2	0	6	1	3	5	14
	108Q4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	2
	109Q1	0	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	4	0	2	3	5
	109Q2	0	2	6	0	0	3	0	0	3	1	1	3	0	0	5	16
	109Q3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	0	0	5
	109Q4	0	0	0	2	0	1	1	1	0	2	3	1	1	3	0	6
	110Q1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	1	1	0	0	5
	110Q2	0	0	3	0	1	3	0	0	3	2	2	3	0	3	2	10
	110Q3	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	3	0	0	1	6
	110Q4	0	1	3	0	1	1	2	0	0	1	0	1	1	3	3	9
	111Q1	3	1	1	0	5	2	0	3	3	2	3	3	3	3	1	8
	111Q2	3	2	3	1	2	1	1	0	3	0	2	4	4	2	1	12
	111Q3	0	0	0	0	2	1	0	0	4	0	0	2	3	3	2	7
	111Q4	1	2	3	0	1	2	0	0	1	0	1	2	4	5	3	8
	112Q1	0	0	1	1	1	2	1	1	1	0	0	1	0	1	1	5
	112Q2	1	1	1	0	1	0	1	1	4	2	1	3	2	0	3	7
	112Q3	1	0	0	0	1	1	1	0	1	1	2	0	3	0	5	8
	112Q4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	3
	113Q1	1	0	0	0	0	4	1	0	0	0	1	1	0	1	0	8
	113Q2	1	3	2	1	3	2	0	1	2	0	1	1	3	1	2	11
	113Q3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1
	113Q4	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	6
	114Q1	0	1	0	1	0	1	0	0	3	1	1	1	2	2	1	4
	114Q2	1	1	1	0	0	2	0	0	2	2	1	1	0	0	0	5
	114Q3	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4
	114Q4	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	**0**	**0**	**3**	**1**	**3**	**3**	**3**
歷次平均		7															

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.9-9　　歷季海域生態-仔稚魚優勢物種比較表(1/2)

季別 \ 優勢種		中文名	學名
施工期間	108Q1	日本鯷	*Engraulis japonica*
		黃鰭鯛	*Acanthopagrus latus*
		黑鯛	*Acanthopagrus schlegeli*
	108Q2	日本沙鮻	*Sillago japonica*
		黃姑魚屬	*Nibea* sp.
		鰕虎科	*Gobiidae gen.* sp.
	108Q3	短吻三線舌鰨	*Cynoglossus abbreviatus*
		日本沙鮻	*Sillago japonica*
		雙帶鯵	*Elagatis bipinnulata*
	108Q4	圓鯵屬	*Decapterus* sp.
		鮋科	*Scorpaenidae gen.* sp.
		無明顯第三優勢種	
	109Q1	金梭魚科	*Sphyraenidae gen.* sp.
		鯔屬	*Liza* sp.
		真鯛	*Pagrus major*
	109Q2	黃鰭鯛	*Acanthopagrus latus*
		日本鯷	*Engraulis japonica*
		鰕虎科	*Gobiidae gen.* sp.
	109Q3	深鰕虎屬	*Bathygobius* sp.
		鯔屬	*Liza* sp.
		鰕虎科	*Gobiidae gen.* sp.
	109Q4	日本鯷	*Engraulis japonica*
		黑鯛	*Acanthopagrus schlegeli*
		黃姑魚屬	*Nibea* sp.
	110Q1	鯔屬	*Liza* sp.
		黃錫鯛	*Sparus sarba*
		鰕虎科	*Gobiidae gen.* sp.
	110Q2	花身鯚	*Terapon jarbua*
		緋鯉屬	*Upeneus* sp.
		日本鯷	*Engraulis japonica*
	110Q3	逆鉤鯵	*Scomberoides lysan*
		犁齒鯛屬	*Evynnis* sp.
		日本鯷	*Engraulis japonica*
	110Q4	深鰕虎	*Bathygobius* sp.
		日本沙鮻	*Sillago japonica*
		底金線魚、逆鉤鯵	*Nemipterus bathybius*、*Scomberoides lysan*
	111Q1	黑鯛	*Acanthopagrus schlegeli*
		若鯵屬	*Carangoides* sp.
		鯡科	Clupeidae gen. sp.
	111Q2	花身鯚	*Terapon jarbua*
		條尾緋鯉	*Upeneus bensasi*
		真鯛	*Pagrus major*

註 1：spp.意同屬複數種，sp.意同屬單種。


註 2：粗體表示本季數據。

表3.1.9-9　　歷季海域生態-仔稚魚優勢物種比較表(2/2)

季別＼優勢種		中文名	學名
施工期間	111Q3	日本沙鮻	*Sillago japonica*
		黃鰭棘鯛	*Acanthopagrus latus*
		鰕虎科之一種	Gobiidae gen. sp.
	111Q4	黑鯛	*Acanthopagrus schlegeli*
		條尾緋鯉	*Upeneus bensasi*
		沙鮻屬	*Sillago* sp.
	112Q1	斜棘鰯屬	*Repomucenus* sp.
		鮻屬	*Liza* sp.
		鯵科之一種	Carangidae gen sp.
	112Q2	鮻屬	*Liza* sp.
		黑鯛	*Acanthopagrus schlegeli*
		日本鯷	*Engraulis japonica*
	112Q3	日本沙鮻	*Sillago japonica*
		雙帶鯵	*Elagatis bipinnulata*
		鯻屬	*Terapon* sp.
	112Q4	小鱗沙鮻	*Sillago parvisquamis*
		下鱵魚屬	*Hyporhamphus* sp.
		鯻屬	*Terapon* sp.
	113Q1	黃鰭棘鯛	*Acanthopagrus latus*
		日本鯷	*Engraulis japonica*
		緋鯉屬	*Upeneus* sp.
	113Q2	真鯛	*Pagrus major*
		緋鯉屬	*Upeneus* sp.
		前鱗龜鮻	*Chelon affinis*
	113Q3	日本沙鮻	*Sillago japonica*
		無明顯第二優勢種	
		無明顯第三優勢種	
	113Q4	黃鰭棘鯛	*Acanthopagrus latus*
		花身鯻	*Terapon jarbua*
		緋鯉屬	*Upeneus* sp.
	114Q1	石狗公屬	*Sebastiscus* sp.
		雀鯛科	Pomacentridae sp.
		條紋鯻	*Terapon theraps*
	114Q2	前鱗龜鮻	*Chelon affinis*
		鑽光魚科	Gonostomatidae sp.
		圓鯵屬	*Decapterus* sp.
	114Q3	鰕虎科	Gobiidae sp.
		白沙鮻	*Sillago sihama*
		小鱗沙鮻	*Sillago parvisquamis*
	114Q4	**真鯛**	***Pagrus major***
		緋鯉屬	***Upeneuss* sp.**
		小鱗沙鮻	***Sillago parvisquamis***

註 1：spp.意同屬複數種，sp.意同屬單種。


註 2：粗體表示本季數據。



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。


圖 3.1.9-7　　歷季海域生態-仔稚魚物種及豐度結果比較圖(1/5)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。


圖 3.1.9-7　　歷季海域生態-仔稚魚物種及豐度結果比較圖(2/5)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。


圖 3.1.9-7　　歷季海域生態-仔稚魚物種及豐度結果比較圖(3/5)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

圖 3.1.9-7　　歷季海域生態-仔稚魚物種及豐度結果比較圖(4/5)



註 1:1=大堀溪口、2=觀音溪口、3=觀塘工業區、4=新屋溪口、5=社子溪口。

註 2:A=水深 10M、B=水深 15M、C=水深 30M。

圖 3.1.9-7　　歷季海域生態-仔稚魚物種及豐度結果比較圖(5/5)




圖 3.1.9-8　　歷次海域生態-仔稚魚平均種類及平均豐度數(ind./1,000 m^3)比較圖

五、總基礎生產力

比較季節之時間差異，111年至今歷季與本季觀塘海域總基礎生產力，季節間基礎生產力有顯著差異 (ANOVA，$F = 27.742$，$p < 0.001$)，海域平均生產力介於1.40至4.75 mg C/m^3/h之間，以113Q2最高，而111Q2最低。

比較基礎生產力之時間與測站、深度等環境之關係，環境因子影響基礎生產力極巨，其中光強度是直接關係光合作用效率之因子，對於基礎生產力的影響為最重要因子之一。本季各測站無論表、中及底層總基礎生產力介於0.13至12.45 mg C/m^3/h，平均為1.96 ± 2.64 mg C/m^3/h，與上一季(114年7月）平均總基礎生產力2.59 ± 1.74 mg C/m^3/h比較，本季平均總基礎生產力為其0.8倍。而與去年同季相比，113年10月平均總基礎生產力為3.68 ± 0.36 mg C/m^3/h，本季平均總基礎生產力為其0.5倍**(表3.1.9-10 圖3.1.9-9~10)**。

觀塘工業港海域基礎生產力數值落在台灣西北海域基礎生產力範圍。根據農委會漁業署2007年計畫，2007年台灣西北部海域水深5公尺基礎生產力夏季為3.56 mg C/m^3/h，秋季為9.50 mg C/m^3/h。台灣西北部海域基礎生產力年度及季節差異大，介於3.56-9.50 mg C/m^3/h。根據溶氧計直接測定，觀塘工業港海域基礎生產力過去15季之平均數值為3.09 mg C/m^3/h。參考資料:行政院農業委員會漁業署 台灣海域基礎生產力之研究(2007年計畫主持人 鄭學淵 教授)(中文摘要及計算過程於**附錄十**當中)。

表3.1.9-10　　歷季海域生態-總基礎生產力各季比較表(1/5)

季別＼測站		1A			1B			1C		
		表	中	底	表	中	底	表	中	底
施工期間	111Q2	1.48	1.52	1.45	1.49	1.46	1.62	1.42	1.40	1.81
	111Q3	2.46	2.44	2.80	1.56	1.48	2.24	2.35	2.70	2.59
	111Q4	2.27	2.09	2.07	2.03	2.20	3.20	2.05	2.25	1.98
	112Q1	3.79	4.09	3.01	1.09	0.88	3.83	4.42	5.56	4.87
	112Q2	3.35	3.48	3.09	3.23	3.32	3.40	3.55	3.05	2.68
	112Q3	3.35	2.90	3.39	3.72	3.65	3.13	3.70	3.32	3.30
	112Q4	3.89	3.69	3.78	4.32	4.22	4.36	4.03	4.34	4.36
	113Q1	1.78	1.74	1.81	1.48	1.32	1.45	1.66	1.55	1.43
	113Q2	4.07	4.56	4.71	4.42	5.50	5.09	5.15	3.97	4.66
	113Q3	2.07	2.01	2.02	1.94	1.86	1.84	1.82	1.53	1.87
	113Q4	3.06	3.77	4.76	3.40	3.27	3.79	3.80	4.02	4.00
	114Q1	7.88	3.37	0.00	1.12	3.38	1.12	6.75	3.37	1.12
	114Q2	2.95	4.16	4.07	6.73	5.95	5.69	4.23	5.01	4.54
	114Q3	6.19	1.57	1.41	1.64	2.04	1.72	6.42	2.19	3.21
	114Q4	**12.45**	**12.40**	**5.33**	**4.25**	**3.60**	**2.78**	**1.94**	**1.82**	**1.70**
歷次平均		3.09								

註 1：單位為 mg C/m^3/h。

註 2：粗體表示本季數據。

表3.1.9-10　　歷季海域生態-總基礎生產力各季比較表(2/5)

測站 / 季別		2A			2B			2C		
		表	中	底	表	中	底	表	中	底
施工期間	111Q2	1.33	1.19	1.38	1.28	1.24	1.09	1.20	1.24	1.18
	111Q3	2.62	2.61	2.54	2.26	2.48	2.51	2.88	2.91	2.77
	111Q4	2.37	2.08	1.98	2.11	2.19	2.11	2.04	2.63	2.32
	112Q1	4.09	3.72	4.21	1.38	0.65	4.57	3.44	5.88	5.93
	112Q2	3.73	3.90	3.71	3.84	3.86	3.86	3.92	3.55	3.85
	112Q3	3.28	2.83	3.91	3.38	3.90	3.34	3.55	3.44	3.39
	112Q4	3.90	4.01	4.94	4.59	5.08	4.62	4.66	4.43	4.54
	113Q1	1.84	1.91	1.96	1.45	1.57	1.23	1.42	1.49	1.73
	113Q2	4.42	4.07	4.39	5.39	5.27	4.80	4.63	4.62	5.09
	113Q3	2.03	2.14	2.11	1.95	1.99	1.73	1.99	1.79	1.81
	113Q4	4.05	3.38	3.34	4.01	3.87	3.77	3.72	3.62	3.73
	114Q1	2.36	1.24	0.12	3.83	0.22	0.22	8.44	5.63	0.34
	114Q2	6.80	6.22	5.91	6.00	5.22	5.01	1.25	2.35	1.25
	114Q3	3.92	3.13	1.80	4.93	0.94	0.70	1.41	1.02	2.04
	114Q4	**3.52**	**2.76**	**2.14**	**2.19**	**2.35**	**1.43**	**0.78**	**1.08**	**0.50**
歷次平均		3.09								

註 1：單位為 mg C/m^3/h。

註 2：粗體表示本季數據。

表3.1.9-10　　歷季海域生態-總基礎生產力各季比較表(3/5)

季別＼測站		3A			3B			3C		
		表	中	底	表	中	底	表	中	底
施工期間	111Q2	1.45	1.26	1.45	1.25	1.29	1.26	1.41	1.49	1.22
	111Q3	2.27	2.50	2.61	1.54	1.61	1.92	3.59	3.77	3.78
	111Q4	1.99	1.95	1.95	2.08	2.26	2.09	2.59	2.91	2.57
	112Q1	3.46	3.58	2.31	0.21	3.92	4.67	2.89	4.61	2.67
	112Q2	3.83	3.96	4.74	3.86	3.75	4.34	3.57	3.59	3.72
	112Q3	3.21	2.75	3.55	3.77	3.60	3.27	3.48	3.22	3.20
	112Q4	4.06	4.16	4.43	4.71	5.13	4.33	4.51	4.75	4.48
	113Q1	0.83	1.98	1.96	1.28	1.15	1.26	1.45	1.23	1.43
	113Q2	4.67	4.57	4.48	4.75	4.95	4.30	4.96	4.60	4.68
	113Q3	1.80	1.90	1.93	1.84	1.99	1.83	1.75	1.83	1.58
	113Q4	3.66	3.19	3.17	3.90	4.22	3.67	3.44	3.62	3.80
	114Q1	8.10	4.50	0.68	14.63	5.74	0.34	9.22	3.49	0.22
	114Q2	7.20	7.88	6.06	6.00	6.32	5.27	0.94	2.27	0.16
	114Q3	6.58	1.02	1.10	2.66	0.86	0.47	3.60	0.55	1.25
	114Q4	**1.41**	**1.38**	**6.06**	**0.76**	**0.70**	**0.52**	**0.69**	**0.65**	**0.52**
歷次平均		3.09								

註 1：單位為 mg C/m^3/h。

註 2：粗體表示本季數據。

表3.1.9-10　　歷季海域生態-總基礎生產力各季比較表(4/5)

季別＼測站		4A			4B			4C		
		表	中	底	表	中	底	表	中	底
施工期間	111Q2	1.87	1.91	1.97	2.04	1.94	1.88	1.05	1.19	1.22
	111Q3	2.50	2.69	2.50	2.33	2.54	2.99	3.72	3.77	3.79
	111Q4	2.04	2.15	2.08	2.15	2.14	2.22	2.47	2.53	2.29
	112Q1	4.15	2.01	2.46	1.59	4.46	5.82	4.02	5.75	5.12
	112Q2	3.90	3.87	3.99	3.88	3.81	3.77	3.55	3.51	3.59
	112Q3	3.18	2.42	4.40	3.83	3.78	3.54	3.65	3.25	3.48
	112Q4	3.57	3.49	3.63	3.83	3.67	4.12	4.39	4.62	4.74
	113Q1	2.17	1.51	1.59	1.43	1.33	1.25	1.63	1.57	1.62
	113Q2	4.60	4.69	4.76	4.66	5.17	5.09	5.06	4.50	4.55
	113Q3	1.88	1.80	1.81	1.58	1.79	1.78	1.89	1.92	1.71
	113Q4	3.26	3.48	3.21	3.62	4.20	3.71	3.44	3.90	3.53
	114Q1	7.87	4.50	1.24	3.83	1.35	0.56	9.56	3.49	0.34
	114Q2	7.52	5.43	5.12	5.27	4.70	4.91	2.43	2.90	2.27
	114Q3	0.23	5.95	4.54	4.39	1.49	3.68	0.47	5.25	1.96
	114Q4	**1.96**	**1.00**	**1.15**	**0.90**	**0.59**	**0.80**	**0.69**	**0.31**	**0.37**
歷次平均		3.09								

註 1：單位為 mg C/m^3/h。


註 2：粗體表示本季數據。

表3.1.9-10　　歷季海域生態-總基礎生產力各季比較表(5/5)

季別＼測站		5A			5B			5C			本季平均
		表	中	底	表	中	底	表	中	底	
施工期間	111Q2	1.20	1.20	1.63	1.29	1.28	1.17	1.13	1.04	1.24	1.40
	111Q3	3.76	3.85	3.83	3.58	3.57	3.62	3.47	3.89	3.98	2.85
	111Q4	2.16	1.94	2.06	2.28	2.04	2.03	2.40	2.86	2.76	2.24
	112Q1	3.18	1.72	4.13	1.72	3.64	2.38	5.32	5.47	7.37	3.65
	112Q2	3.96	3.98	4.11	4.02	3.86	4.16	3.82	3.76	3.81	3.74
	112Q3	3.06	3.29	5.01	3.52	4.00	3.34	3.53	3.29	3.32	3.45
	112Q4	4.96	4.73	5.94	4.15	4.20	4.33	4.16	4.36	4.25	4.34
	113Q1	1.51	1.23	1.54	1.17	1.17	1.16	1.10	1.27	1.37	1.49
	113Q2	5.12	5.04	5.02	4.99	4.96	5.24	4.75	4.62	4.29	4.75
	113Q3	1.85	2.21	2.35	2.02	1.65	1.85	1.95	1.88	1.75	1.88
	113Q4	3.40	3.21	3.52	4.43	3.73	3.75	3.78	3.38	4.21	3.68
	114Q1	6.75	3.38	1.35	3.94	3.38	0.79	10.35	3.60	0.56	3.65
	114Q2	5.56	4.23	4.23	3.29	3.76	4.70	1.49	3.13	10.81	4.60
	114Q3	2.82	1.57	1.49	2.04	2.43	4.23	1.80	3.76	3.99	2.59
	114Q4	**0.78**	**0.13**	**0.89**	**0.94**	**0.82**	**0.38**	**0.28**	**0.20**	**0.37**	**1.96**
歷次平均		3.09									

註 1：單位為 mg C/m^3/h。


註 2：粗體表示本季數據。



註 1：A=水深 10M (取-1M、-5M，-9M)、B=水深 15M (取-1M、-7M，-14M)、C=水深 30M (取-1M、-15M，-29M)。

註 2：單位為 mg C/m^3/h。


圖 3.1.9-9　　歷季海域生態-總基礎生產力各季比較圖(1/15)



註 1：A=水深 10M (取-1M、-5M，-9M)、B=水深 15M (取-1M、-7M，-14M)、C=水深 30M (取-1M、-15M，-29M)。

註 2：單位為 mg C/m^3/h。


圖 3.1.9-9　　歷季海域生態-總基礎生產力各季比較圖(2/15)



註 1：A=水深 10M (取-1M、-5M，-9M)、B=水深 15M (取-1M、-7M，-14M)、C=水深 30M (取-1M、-15M，-29M)。

註 2：單位為 mg C/m^3/h。


圖 3.1.9-9　　歷季海域生態-總基礎生產力各季比較圖(3/15)



註 1：A=水深 10M (取-1M、-5M，-9M)、B=水深 15M (取-1M、-7M，-14M)、C=水深 30M (取-1M、-15M，-29M)。

註 2：單位為 mg C/m^3/h。


圖 3.1.9-9　　歷季海域生態-總基礎生產力各季比較圖(4/15)



註 1：A=水深 10M (取-1M、-5M，-9M)、B=水深 15M (取-1M、-7M，-14M)、C=水深 30M (取-1M、-15M，-29M)。

註 2：單位為 mg C/m^3/h。


圖 3.1.9-9　　歷季海域生態-總基礎生產力各季比較圖(5/15)



註 1：A=水深 10M (取-1M、-5M，-9M)、B=水深 15M (取-1M、-7M，-14M)、C=水深 30M (取-1M、-15M，-29M)。

註 2：單位為 mg C/m^3/h。


圖 3.1.9-9　　歷季海域生態-總基礎生產力各季比較圖(6/15)



註 1：A=水深 10M (取-1M、-5M，-9M)、B=水深 15M (取-1M、-7M，-14M)、C=水深 30M (取-1M、-15M，-29M)。

註 2：單位為 mg C/m^3/h。


圖 3.1.9-9　　歷季海域生態-總基礎生產力各季比較圖(7/15)



註 1：A=水深 10M (取-1M、-5M，-9M)、B=水深 15M (取-1M、-7M，-14M)、C=水深 30M (取-1M、-15M，-29M)。

註 2：單位為 mg C/m^3/h。


圖 3.1.9-9　　歷季海域生態-總基礎生產力各季比較圖(8/15)



註 1：A=水深 10M (取-1M、-5M，-9M)、B=水深 15M (取-1M、-7M，-14M)、C=水深 30M (取-1M、-15M，-29M)。

註 2：單位為 mg C/m^3/h。


圖 3.1.9-9　　歷季海域生態-總基礎生產力各季比較圖(9/15)



註 1：A=水深 10M (取-1M、-5M，-9M)、B=水深 15M (取-1M、-7M，-14M)、C=水深 30M (取-1M、-15M，-29M)。

註 2：單位為 mg C/m^3/h。


圖 3.1.9-9　　歷季海域生態-總基礎生產力各季比較圖(10/15)



註 1：A=水深 10M (取-1M、-5M，-9M)、B=水深 15M (取-1M、-7M，-14M)、C=水深 30M (取-1M、-15M，-29M)。

註 2：單位為 mg C/m^3/h。


圖 3.1.9-9　　歷季海域生態-總基礎生產力各季比較圖(11/15)





註 1：A=水深 10M (取-1M、-5M，-9M)、B=水深 15M (取-1M、-7M，-14M)、C=水深 30M (取-1M、-15M，-29M)。

註 2：單位為 mg C/m^3/h。

圖 3.1.9-9　　歷季海域生態-總基礎生產力各季比較圖(12/15)








註 1：A=水深 10M (取-1M、-5M，-9M)、B=水深 15M (取-1M、-7M，-14M)、C=水深 30M (取-1M、-15M，-29M)。

註 2：單位為 mg C/m^3/h。


圖 3.1.9-9　　歷季海域生態-總基礎生產力各季比較圖(13/15)



註 1：A=水深 10M (取-1M、-5M，-9M)、B=水深 15M (取-1M、-7M，-14M)、C=水深 30M (取-1M、-15M，-29M)。

註 2：單位為 mg C/m^3/h。

圖 3.1.9-9　　歷季海域生態-總基礎生產力各季比較圖(14/15)



註 1：A=水深 10M (取-1M、-5M，-9M)、B=水深 15M (取-1M、-7M，-14M)、C=水深 30M (取-1M、-15M，-29M)。

註 2：單位為 mg C/m^3/h。

圖 3.1.9-9　　歷季海域生態-總基礎生產力各季比較圖(15/15)




圖 3.1.9-10　　歷次海域生態-總基礎生產力歷次平均比較圖

3.1.10 河口生態

一、浮游植物

114年第4季河口浮游植物的調查結果，平均豐度為695,120 ± 631,230 cells/L，較復工前(104年6月)監測報告中的平均豐度81 cells/L高了許多。與上一季114年7月1,279,520 ± 1,024,974 cells/L比較，本季爲其0.75倍，與113年10月之3,133,440 ± 1,701,152 cells/L比較，本季爲其0.31倍。自108年至114年間，第4季平均豐度介於954,240至14,068,160 cells/L，本季爲其0.07至1.01倍。除了112年第4季因個別測站發生較大藻華以外，歷年第4季平均豐度多在1,000,000 cells/L左右。

綠藻及藍綠菌在各季豐度皆很高，為溪流及河口常見藻相。歷次優勢物種比較方面，由**表3.1.10-2**可得知，自108年以來，矽藻之小環藻屬、綠藻之空星藻屬及柵藻屬、以及藍綠菌之束毛藻屬、顫藻屬及微囊藻屬經常為最優勢的種類，年間變化並不明顯。

本季5D社子溪口豐度最高，3D小飯壢溪口較低，高低相差44倍。以Spearman correlation 探討浮游植物與所測之環境因子相關性，本季浮游植物豐度與總磷有顯著正相關。

本季河口浮游植物平均豐度為695,120 ± 631,230 cells/L，共發現32物種數。與歷季平均豐度及歷季平均物種數比較(**圖3.1.10-2**)，浮游植物各季豐度沒有趨勢性，扣除112Q4束毛藻屬大量繁生、114Q1及114Q2微囊藻屬藻華外，過去平均變動範圍約為25倍左右。各季發現的種類變動也不大，長期平均約30種，也沒有一定的季節變動趨勢。

表3.1.10-1　　歷季河口生態-植物性浮游生物結果比較表(1/2)

測站 / 季別		1D 大堀溪	2D 觀音溪	3D 小飯壢溪	4D 新屋溪	5D 社子溪	所有測站
物種數							
復工前(104.06)		56					56
施工期間	108Q1	15	23	19	14	17	18
	108Q2	13	14	18	9	12	13
	108Q3	18	18	22	15	19	18
	108Q4	23	21	21	19	19	21
	109Q1	20	21	19	22	23	21
	109Q2	24	19	14	15	22	19
	109Q3	14	17	14	12	18	15
	109Q4	15	18	15	20	17	17
	110Q1	20	19	21	14	16	18
	110Q2	16	19	10	26	13	17
	110Q3	23	16	22	21	24	21
	110Q4	21	20	17	17	20	19
	111Q1	17	16	16	17	14	16
	111Q2	19	13	17	16	14	16
	111Q3	19	20	17	13	16	26
	111Q4	16	8	20	13	15	31
	112Q1	17	15	18	21	16	31
	112Q2	14	16	19	18	16	31
	112Q3	20	21	11	9	14	25
	112Q4	16	22	14	16	15	26
	113Q1	14	11	9	11	11	17
	113Q2	9	8	10	10	11	18
	113Q3	19	25	19	22	20	34
	113Q4	19	28	21	22	23	35
	114Q1	24	19	18	29	23	36
	114Q2	21	12	22	24	22	33
	114Q3	22	22	19	24	22	33
	114Q4	**21**	**21**	**13**	**19**	**23**	**32**
歷次平均		23					

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.10-1　　歷季河口生態-植物性浮游生物結果比較表(2/2)

測站 / 季別		1D 大堀溪	2D 觀音溪	3D 小飯壢溪	4D 新屋溪	5D 社子溪	所有測站
數量(細胞數/公升)							
復工前(104.06)		81					81
施工期間	108Q1	1,379,200	2,064,000	353,600	230,400	1,160,000	1,037,440
	108Q2	8,568,000	998,400	5,464,000	620,000	2,124,000	3,554,880
	108Q3	3,158,400	279,200	629,600	1,494,400	5,471,200	2,206,560
	108Q4	2,126,400	1,822,400	159,200	1,548,000	2,508,800	1,632,960
	109Q1	1,389,200	24,173,600	549,600	130,800	292,800	5,307,200
	109Q2	1,338,400	1,932,800	111,200	390,400	1,415,200	1,037,600
	109Q3	585,600	1,748,000	253,600	244,000	1,268,800	820,000
	109Q4	468,800	2,737,600	228,800	704,000	632,000	954,240
	110Q1	3,840,000	4,369,600	803,200	182,400	707,200	1,980,480
	110Q2	9,422,400	2,905,600	168,000	5,888,000	1,680,000	4,012,800
	110Q3	12,678,400	4,182,400	516,800	1,100,800	3,510,400	4,397,760
	110Q4	3,352,000	4,513,600	1,140,800	457,600	2,131,200	2,319,040
	111Q1	1,443,200	870,400	748,800	974,400	926,400	992,640
	111Q2	668,800	252,800	884,800	177,600	574,400	511,680
	111Q3	1,216,800	1,220,000	1,503,200	1,508,800	304,800	1,150,720
	111Q4	3,377,600	920,000	1,168,000	875,200	579,200	1,384,000
	112Q1	1,689,600	254,400	4,203,200	436,800	393,600	1,395,520
	112Q2	1,588,800	796,800	1,368,000	202,400	182,400	827,680
	112Q3	4,262,400	4,377,600	241,600	243,200	2,377,600	2,300,480
	112Q4	6,176,000	58,731,200	3,057,600	1,264,000	1,112,000	14,068,160
	113Q1	443,200	329,600	576,000	185,600	561,600	419,200
	113Q2	179,200	65,200	112,000	248,000	443,200	209,520
	113Q3	2,332,000	3,030,400	919,200	1,188,800	1,344,800	1,763,040
	113Q4	1,450,400	2,786,400	4,168,000	1,752,800	5,509,600	3,133,440
	114Q1	3,272,800	4,197,600	378,400	12,922,400	1,079,200	4,370,080
	114Q2	1,248,000	563,200	1,088,000	444,590,400	921,600	89,682,240
	114Q3	940,000	739,200	676,800	3,100,800	940,800	1,279,520
	114Q4	**1,060,800**	**572,800**	**36,000**	**223,200**	**1,582,800**	**695,120**
歷次平均		5,480,143					

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.10-2　　歷季河口生態-植物性浮游生物優勢物種比較表(1/2)

季別 \ 優勢種		中文名	學名
施工期間	108Q1	顫藻屬	*Oscillatoria* spp.
		微囊藻屬	*Microcystis* sp.
		無明顯第三優勢種	
	108Q2	小環藻屬	*Cyclotella* spp.
		顫藻屬	*Oscillatoria* spp.
		無明顯第三優勢種	
	108Q3	空星藻屬	*Coelastrum* spp.
		束毛藻屬	*Trichodesmium* spp.
		無明顯第三優勢種	
	108Q4	柵藻屬	*Scenedesmus* spp.
		小環藻屬	*Cyclotella* spp.
		無明顯第三優勢種	
	109Q1	束毛藻	*Trichodesmium* spp.
		空星藻屬	*Coelastrum* spp.
		無明顯第三優勢種	
	109Q2	小環藻屬	*Cyclotella* spp.
		菱形藻屬	*Nitzschia* spp.
		無明顯第三優勢種	
	109Q3	小環藻屬	*Cyclotella* spp.
		顫藻屬	*Oscillatoria* spp.
		無明顯第三優勢種	
	109Q4	空星藻屬	*Coelastrum* spp.
		柵藻屬	*Scenedesmus* spp.
		無明顯第三優勢種	
	110Q1	柵藻屬	*Scenedesmus* spp.
		小環藻屬	*Cyclotella* spp.
		無明顯第三優勢種	
	110Q2	小環藻屬	*Cyclotella* spp.
		微囊藻屬	*Microcystis* spp.
		席藻屬	*Phormidium* sp.
	110Q3	微囊藻屬	*Microcystis* spp.
		柵藻屬	*Scenedesmus* spp.
		顫藻	*Oscillatoria* spp.
	110Q4	顫藻	*Oscillatoria* spp.
		柵藻屬	*Scenedesmus* spp.
		無明顯第三優勢種	
	111Q1	小環藻屬	*Cyclotella* spp.
		直鏈藻屬	*Melosira* spp.
		菱形藻屬	*Nitzschia* spp.
	111Q2	微囊藻屬	*Microcystis* spp.
		小環藻屬	*Cyclotella* spp.
		柵藻屬	*Scenedesmus* spp.

註 1：spp.意同屬複數種，sp.意同屬單種。

註 2：粗體表示本季數據。

表3.1.10-2　　歷季河口生態-植物性浮游生物優勢物種比較表(2/2)

季別 \ 優勢種		中文名	學名
施工期間	111Q3	小環藻屬	*Cyclotella* spp.
		束毛藻	*Trichodesmium* spp.
		無明顯第三優勢種	
	111Q4	微囊藻屬	*Microcystis* spp
		柵藻屬	*Scenedesmus* spp.
		盤星藻屬	*Pediastrum* spp.
	112Q1	小環藻屬	*Cyclotella* spp.
		菱形藻屬	*Nitzschia* spp.
		舟形藻屬	*Navicula* spp.
	112Q2	小環藻屬	*Cyclotella* spp.
		菱形藻屬	*Nitzschia* spp.
		舟形藻屬	*Navicula* spp.
	112Q3	柵藻屬	*Scenedesmus* spp.
		小環藻屬	*Cyclotella* spp.
		微囊藻屬	*Microcystis* spp
	112Q4	束毛藻屬	*Trichodesmium* spp.
		微囊藻屬	*Microcystis* spp
		小環藻屬	*Cyclotella* spp.
	113Q1	小球藻屬	*Chlorella* spp.
		直鏈藻屬	*Melosira* spp.
		菱形藻屬	*Nitzschia* spp.
	113Q2	菱形藻屬	*Nitzschia* spp.
		微囊藻屬	*Microcystis* spp
		海鏈藻屬	*Thalassiosira* spp.
	113Q3	束毛藻屬	*Trichodesmium* spp.
		微囊藻屬	*Microcystis* spp
		小環藻屬	*Cyclotella* spp.
	113Q4	束毛藻屬	*Trichodesmium* spp.
		直鏈藻屬	*Melosira* spp.
		微囊藻屬	*Microcystis* spp
	114Q1	微囊藻屬	*Microcystis* spp
		小環藻屬	*Cyclotella* spp.
		菱形藻屬	*Nitzschia* spp.
	114Q2	微囊藻屬	*Microcystis* spp
		直鏈藻屬	*Melosira* spp.
		菱形藻屬	*Nitzschia* spp.
	114Q3	微囊藻屬	*Microcystis* spp.
		束毛藻屬	*Trichodesmium* spp.
		脆杆藻屬	*Fragilaria* spp.
	114Q4	**空星藻屬**	***Coelastrum* spp.**
		微囊藻屬	***Microcystis* spp.**
		柵藻屬	***Scenedesmus* spp.**

註 1：spp.意同屬複數種，sp.意同屬單種。

註 2：粗體表示本季數據。




圖 3.1.10-1　　歷季河口生態-植物性浮游生物數量結果比較圖(1/2)




圖 3.1.10-1　　歷季河口生態-植物性浮游生物數量結果比較圖(2/2)




圖 3.1.10-2　　歷次河口生態-植物性浮游生物平均種類數及平均豐度(cells/l)比較圖

二、浮游動物

本季調查共發現浮游動物16大類，低於上一季(19大類)，各測站記錄到的大類數介於10~16大類之間，亦低於上季調查結果(11~18大類)；如與去年同季相比，113年第4季發現21大類浮游動物，各測站記錄到的大類數介於13~19大類之間，高於本季；此外，本海域歷年平均發現19大類的浮游動物，屬於物總數頗豐富的海域(**表3.1.10-3、圖3.1.10-3~4**)。

本季豐度介於57,000~97,000 ind./1,000 m^3，變化範圍小於上一季，114年第3季各測站豐度介於70,000~132,000 ind./1,000 m^3之間；如與去年同季相比，本季各測站豐度變化範圍亦較小，113年第4季各測站豐度介於101,000~185,000 ind./1,000 m^3之間；此外，本海域歷年平均豐度為125,183 ind./1,000 m^3，而本季各測站的豐度多低於歷年平均(**表3.1.10-3、圖3.1.10-3~4**)。

以歷季的各優勢大類來看，此海域的第一優勢大類多為哲水蚤，偶而會是橈足類幼生和劍水蚤，本季為哲水蚤，第二優勢大類多為翼足類和劍水蚤，偶而會是哲水蚤和枝角類，本季為劍水蚤，而第三優勢大類以毛顎類、多毛類、劍水蚤、端腳類、橈足類幼生和藤壺幼生較常出現，本季為蝦類幼生 (**表3.1.10-4**)。

由於河海交匯區本身就有複雜的水文環境，再加上降雨的因素，多少會影響棲息其中之浮游動物類群組成及數量的消長。

表3.1.10-3　　歷季河口生態-動物性浮游生物結果比較表(1/2)

季別＼測站		1D 大堀溪	2D 觀音溪	3D 小飯壢溪	4D 新屋溪	5D 社子溪	所有測站
物種數							
復工(104.06)		無詳細資料					
施工期間	108Q1	10	11	14	15	13	17
	108Q2	17	19	15	17	18	21
	108Q3	13	17	15	12	13	19
	108Q4	12	17	12	11	12	18
	109Q1	11	11	13	15	10	17
	109Q2	12	17	14	13	10	18
	109Q3	10	14	13	12	12	17
	109Q4	11	14	12	11	10	18
	110Q1	15	12	13	14	16	19
	110Q2	13	15	11	14	10	18
	110Q3	14	17	15	15	12	19
	110Q4	14	15	11	13	13	17
	111Q1	17	14	16	14	11	19
	111Q2	19	22	17	16	14	23
	111Q3	11	15	14	17	18	22
	111Q4	15	11	12	17	13	18
	112Q1	12	13	15	16	13	18
	112Q2	10	16	10	12	14	16
	112Q3	13	15	17	15	10	20
	112Q4	14	19	17	12	16	20
	113Q1	18	20	15	13	15	22
	113Q2	20	23	19	17	19	24
	113Q3	16	17	19	15	16	22
	113Q4	14	18	19	13	16	21
	114Q1	12	13	16	11	12	17
	114Q2	12	14	13	10	12	15
	114Q3	12	16	18	11	12	19
	114Q4	**10**	**13**	**16**	**11**	**12**	**16**
歷次平均		19					

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.10-3　　歷季河口生態-動物性浮游生物結果比較表(2/2)

測站 / 季別		1D 大堀溪	2D 觀音溪	3D 小飯壢溪	4D 新屋溪	5D 社子溪	所有測站
數量(個體數/1,000 立方 m)							
復工(104.06)		無詳細資料					
施工期間	108Q1	55,000	64,000	129,000	211,000	111,000	114,000
	108Q2	141,000	334,663	123,947	124,000	165,000	177,722
	108Q3	101,000	232,000	144,000	92,000	125,000	138,800
	108Q4	89,000	194,000	87,000	53,000	90,000	102,600
	109Q1	78,000	104,000	137,000	166,000	79,000	112,800
	109Q2	164,000	268,000	206,000	196,000	115,000	189,800
	109Q3	104,000	154,000	115,000	139,000	150,000	132,400
	109Q4	73,000	109,000	86,000	84,000	41,000	78,600
	110Q1	167,000	77,000	100,000	110,000	204,000	131,600
	110Q2	141,000	161,000	104,000	136,000	87,000	125,800
	110Q3	168,000	219,000	173,000	182,000	136,000	175,600
	110Q4	133,000	137,000	61,000	74,000	85,000	98,000
	111Q1	172,000	142,000	152,000	98,000	71,000	127,000
	111Q2	204,000	326,000	178,000	116,000	93,000	183,400
	111Q3	48,000	84,000	65,000	161,000	202,000	112,000
	111Q4	109,000	65,000	84,000	116,000	85,000	91,800
	112Q1	55,000	87,000	89,000	114,000	73,000	83,600
	112Q2	107,000	189,000	51,000	103,000	140,000	118,000
	112Q3	124,000	134,000	165,000	121,000	75,000	123,800
	112Q4	160,000	212,000	183,000	85,000	152,000	158,400
	113Q1	163,000	200,000	140,000	80,000	157,000	148,000
	113Q2	175,000	224,000	167,000	109,000	131,000	161,200
	113Q3	137,000	173,000	188,000	111,000	133,000	148,400
	113Q4	111,000	185,000	142,000	101,000	128,000	133,400
	114Q1	75,000	92,000	130,000	69,000	63,000	85,800
	114Q2	63,000	96,000	101,000	65,000	74,000	79,800
	114Q3	88,000	109,000	132,000	70,000	75,000	94,800
	114Q4	**57,000**	**95,000**	**97,000**	**64,000**	**77,000**	**78,000**
歷次平均		125,183					

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.10-4　　歷季河口生態-動物性浮游動物優勢大類比較表(1/2)

季別＼優勢種		中文名	學名
施工期間	108Q1	哲水蚤	Calanoida
		翼足類	Pteropoda
		毛顎類	Chaetognatha
	108Q2	橈足類幼生	*Copepoda nauplius*
		哲水蚤	Calanoida
		多毛類	Polychaeta
	108Q3	哲水蚤	Calanoida
		翼足類	Pteropoda
		劍水蚤	Cyclopoida
	108Q4	翼足類	Pteropoda
		哲水蚤	Calanoida
		毛顎類	Chaetognatha
	109Q1	哲水蚤	Calanoida
		尾蟲類	Appendicularia
		端腳類	Amphipoda
	109Q2	劍水蚤	Cyclopoida
		尾蟲類	Appendicularia
		橈足類幼生	*Copepoda nauplius*
	109Q3	哲水蚤	Calanoida
		橈足類幼生	*Copepoda nauplius*
		尾蟲類	Appendicularia
	109Q4	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		藤壺幼生	*Barnacle nauplius*
	110Q1	哲水蚤	Calanoida
		翼足類	Pteropoda
		尾蟲類	Appendicularia
	110Q2	哲水蚤	Calanoida
		枝角類	Cladocera
		端腳類	Amphipoda
	110Q3	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		端腳類	Amphipoda
	110Q4	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		蝦類幼生	Shrimp larva
	111Q1	劍水蚤	Cyclopoida
		哲水蚤	Calanoida
		仔稚魚	Fish larva

註：粗體表示本季數據。

表3.1.10-4　　歷季河口生態-動物性浮游動物優勢大類比較表(2/2)

季別 \ 優勢種		中文名	學名
施工期間	111Q2	哲水蚤	Calanoida
		橈足類幼生	*Copepoda nauplius*
		劍水蚤	Cyclopoida
	111Q3	哲水蚤	Calanoida
		蟹類幼生	Crab zoea
		劍水蚤	Cyclopoida
	111Q4	劍水蚤	Cyclopoida
		枝角類	Cladocera
		哲水蚤	Calanoida
	112Q1	哲水蚤	Calanoida
		蟹類幼生	Crab zoea
		劍水蚤	Cyclopoida
	112Q2	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		蟹類幼生	Crab zoea
	112Q3	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		翼足類	Pteropoda
	112Q4	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		翼足類	Pteropoda
	113Q1	哲水蚤	Calanoida
		蝦類幼生	Shrimp larva
		劍水蚤	Cyclopoida
	113Q2	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		蟹類幼生	Crab zoea
	113Q3	哲水蚤	Calanoida
		橈足類幼生	Copepoda nauplius
		藤壺幼生	Barnacle nauplius
	113Q4	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		藤壺幼生	Barnacle nauplius
	114Q1	劍水蚤	Cyclopoida
		藤壺幼生	Barnacle nauplius
		哲水蚤	Calanoida
	114Q2	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		藤壺幼生	Barnacle nauplius
	114Q3	哲水蚤	Calanoida
		劍水蚤	Cyclopoida
		蝦類幼生	Shrimp larva
	114Q4	**哲水蚤**	**Calanoida**
		劍水蚤	**Cyclopoida**
		蝦類幼生	**Shrimp larva**

註：粗體表示本季數據。




圖 3.1.10-3　　歷季河口生態-動物性浮游生物數量結果比較圖




圖 3.1.10-4　　歷次河口生態-動物性浮游生物平均豐度及平均種類數(ind./1000 m^3)比較圖

三、底棲生物

本季(114年10月)在五條溪流出海口測站所進行的調查共採獲14種106個生物個體，此結果在物種數方面相近於去年(113年)以相同調查方式採獲之8種117個體(第1季)、9種82個體(第2季)、9種109個體(第3季)及9種87個體(第4季)。與復工前階段相比，復工前(104年)於大堀溪、觀音溪與新屋溪共三條溪流出海口測站調查到12種125個體，整體結果亦相似。歷年採樣均顯示河口優勢之底棲動物以節肢動物門、軟體動物門與環節動物門為主，調查結果大致符合附近河口之棲地型態，其中本季採獲底棲動物數量上前兩名之優勢種分別為雙扇股窗蟹與端足目尾鉤蝦科，皆為台灣西部潮間帶泥質或沙質潮間帶灘地與溪流河口普遍出現之底棲動物，並未發現稀有種或獨特種(表3.1.10-5、表3.1.10-6、圖3.1.10-5、圖3.1.10-6)。

表3.1.10-5　　歷季河口生態-底棲生物物種數結果比較表(1/2)

季別 \ 測站		1D 大堀溪	2D 觀音溪	3D 小飯壢溪	4D 新屋溪	5D 社子溪	所有測站
物種數							
復工前	104.06	12	1	-	0	-	12
施工期間	108Q1	2	1	2	5	6	8
	108Q2	1	2	2	5	3	11
	108Q3	1	2	3	5	4	9
	108Q4	3	2	2	2	4	6
	109Q1	4	3	3	5	2	10
	109Q2	3	3	5	4	2	12
	109Q3	6	7	2	6	5	11
	109Q4	1	4	4	2	3	7
	110Q1	3	4	1	5	1	9
	110Q2	1	1	2	6	2	6
	110Q3	3	3	4	4	2	9
	110Q4	4	4	6	8	6	15
	111Q1	3	4	2	6	3	10
	111Q2	3	2	9	3	3	10
	111Q3	5	4	5	3	3	10
	111Q4	5	6	5	4	3	13
	112Q1	7	2	9	11	9	22
	112Q2	6	5	3	8	8	18
	112Q3	3	5	3	8	4	21
	112Q4	3	4	4	5	4	9
	113Q1	4	5	3	6	6	8
	113Q2	2	4	3	3	4	9
	113Q3	2	3	2	5	5	9
	113Q4	2	2	3	5	5	9
	114Q1	3	3	9	7	6	16
	114Q2	2	4	4	5	2	9
	114Q3	8	5	2	5	4	12
	114Q4	**7**	**8**	**3**	**5**	**4**	**14**
歷次平均		11					

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.10-5　　歷季河口生態-底棲生物物種數結果比較表(2/2)

季別＼測站		1D 大堀溪	2D 觀音溪	3D 小飯壢溪	4D 新屋溪	5D 社子溪	所有測站
個體數							
復工前	104.06	77	2	0	46	0	125
施工期間	108Q1	8	6	7	34	54	109
	108Q2	1	2	4	10	4	21
	108Q3	1	4	11	32	40	88
	108Q4	4	11	30	22	25	92
	109Q1	4	3	6	27	6	46
	109Q2	5	10	34	18	4	71
	109Q3	36	44	37	45	49	211
	109Q4	7	9	62	8	9	95
	110Q1	7	4	2	27	8	48
	110Q2	2	5	4	45	8	64
	110Q3	5	14	23	35	13	90
	110Q4	11	15	50	31	26	133
	111Q1	4	7	7	12	6	36
	111Q2	13	8	53	80	57	211
	111Q3	19	22	28	57	6	132
	111Q4	15	26	24	28	19	112
	112Q1	29	12	28	34	21	124
	112Q2	18	11	13	29	20	91
	112Q3	24	27	39	27	31	148
	112Q4	14	12	22	28	18	94
	113Q1	21	15	23	32	26	117
	113Q2	21	15	17	14	15	82
	113Q3	18	24	24	22	21	109
	113Q4	15	11	20	22	19	87
	114Q1	6	3	31	21	32	93
	114Q2	9	9	16	13	9	56
	114Q3	14	15	23	26	23	101
	114Q4	**18**	**18**	**21**	**24**	**25**	**106**
歷次平均		99					

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.10-6　　歷季河口底棲生物優勢物種比較表(1/2)

季別＼優勢種		中文名	學名
施工期間	108Q1	端足目	*Urothoe* sp.
		雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		日本絨螯蟹	*Eriocheir japonica*
	108Q2	海蜾	*Batillaria* sp.
		珠螺	*Lunella coronata*
		短趾和尚蟹	*Mictyris brevidactylus*
	108Q3	端足目	*Urothoe sp.*
		雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		乳白南方招潮蟹	*Austruca lactea*
	108Q4	雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		端足目	*Urothoe* sp.
		短趾和尚蟹	*Mictyris brevidactylus*
	109Q1	端足目	*Urothoe sp.*
		雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		絨毛近方蟹	*Hemigrapsus penicillatus*
	109Q2	雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		字紋弓蟹	*Varuna litterata*
		短趾和尚蟹	*Mictyris brevidactylus*
	109Q3	雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		字紋弓蟹	*Varuna litterata*
		端足目	*Urothoe* sp.
	109Q4	短趾和尚蟹	*Mictyris brevidactylus*
		雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		端足目	*Urothoe* sp.
	110Q1	黑項鍊蟹守螺	*Clypeomorus humilis*
		雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		日本絨螯蟹	*Eriocheir japonica*
	110Q2	端足目	*Urothoe* sp.
		雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		栓海蜾	*Cerithidea cingulata cingulata*
	110Q3	端足目	*Urothoe* sp.
		雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		絲鰓科	Cirratulidae sp.
	110Q4	雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		端足目	*Urothoe* sp.
		吻沙蠶	*Glycera* sp.
	111Q1	雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		等足目漂水虱科	Cirolanidae sp.
	111Q2	雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		短趾和尚蟹	*Mictyris brevidactylus*

註 1：spp.意同屬複數種，sp.意同屬單種。

註 2：粗體表示本季數據。

表3.1.10-6　　歷季河口底棲生物優勢物種比較表(2/2)

季別＼優勢種		中文名	學名
施工期間	111Q3	雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		端足目	*Urothoe* sp.
		無明顯第三優勢種	
	111Q4	端足目	*Urothoe* sp.
		雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
	112Q1	小頭蟲科	Capitellidae sp.
		端足目	*Urothoe* sp.
		無明顯第三優勢種	
	112Q2	端足目	*Urothoe* sp.
		雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		無明顯第三優勢種	
	112Q3	端足目	*Urothoe* sp.
		雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
	112Q4	雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		吻沙蠶科	Glyceridae sp.
		端足目	*Urothoe* sp.
	113Q1	雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		端足目	*Urothoe* sp.
		無明顯第三優勢種	
	113Q2	雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		端足目	*Urothoe* sp.
		無明顯第三優勢種	
	113Q3	雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		端足目	*Urothoe* sp.
		無明顯第三優勢種	
	113Q3	雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		端足目	*Urothoe* sp.
		無明顯第三優勢種	
	114Q1	日本絨螯蟹	*Eriocheir japonica*
		端足目	*Urothoe* sp.
		無明顯第三優勢種	
	114Q2	雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		端足目	*Urothoe* sp.
		無明顯第三優勢種	
	114Q3	雙扇股窗蟹	*Scopimera bitympana*
		端足目	*Urothoe* sp.
		無明顯第三優勢種	
	114Q4	**雙扇股窗蟹**	***Scopimera bitympana***
		端足目	***Urothoe* sp.**
		無明顯第三優勢種	

註 1：spp.意同屬複數種，sp.意同屬單種。

註 2：粗體表示本季數據。




圖 3.1.10-5　　歷季河口生態-底棲生物數量結果比較圖




圖 3.1.10-6　　歷季河口生態-底棲生物平均種類數及平均豐度(個體隻數)比較圖

四、魚類

本年度(114 年 2 月)於桃園市境內，1D 大堀溪、2D 觀音溪、3D 小飯壢溪、4D 新屋溪及 5D 社子溪等之河口測站，進行河口魚類群聚生態調查，共調查記錄到 3 科 3 屬 3 種 5 尾河口魚類，包括：鯉科的羅漢魚、笛鯛科的勒氏笛鯛及塘鯉科的頭孔塘鱧。本季採樣調查，未發現任何特有及保育物種。

本年度(114 年 4 月)於桃園市境內，1D 大堀溪、2D 觀音溪、3D 小販壢西、4D 新屋溪及 5D 社子溪等之河口測站，進行河口魚類群聚生態調查，共調查記錄到 6 科 9 屬 10 種 52 尾河口魚類，包括：鯔科的大鱗鯔、雙邊魚科的小眼雙邊魚、鑽嘴魚科的奧奈鑽嘴魚、慈鯛科的吉利非鯽和尼羅口孵魚、塘鱧科的刺蓋塘鱧、褐塘鱧和頭孔塘鱧及鰕虎科的阿部氏鰕虎和極樂吻鰕虎。本季採樣調查，未發現任何特有及保育物種。

本年度(114 年 7 月)於桃園市境內，1D 大堀溪、2D 觀音溪、3D 小飯壢溪、4D 新屋溪及 5D 社子溪等之河口測站，進行河口魚類群聚生態調查，共調查記錄到 10 科 12 屬 12 種 96 尾河口魚類，包括：鯉科的羅漢魚、鯔科的大鱗鯔、笛鯛科的銀紋笛鯛、鑽嘴魚科的奧奈鑽嘴魚、鯛科的太平洋棘鯛、慈鯛科吉利非鯽和尼羅口孵魚、塘鱧科的褐塘鱧、鰕虎科彈塗魚和極樂吻鰕虎、金錢魚科的金錢魚及四齒魨科的凹鼻魨。本季採樣調查，未發現任何特有及保育物種。

本年度(114 年 10 月)於桃園市境內，1D 大堀溪、2D 觀音溪、3D 小飯壢溪、4D 新屋溪及 5D 社子溪等之河口測站，進行河口魚類群聚生態調查，共調查記錄到 7 科 7 屬 8 種 50 尾河口魚類，包括：鯔科的鯔、笛鯛科的火斑笛鯛和約氏笛鯛、鑽嘴魚科的奧奈鑽嘴魚、鯛科的太平洋棘鯛、鰍科的花身鰍、慈鯛科的尼羅口孵魚及四齒魨科的凹鼻魨。本季採樣調查，未發現任何特有及保育物種。

本季(10 月)調查以小飯壢溪魚類群聚數量最多，為 2 種 24 尾，其次為大堀溪，為 1 種 20 尾，此次各溪流之河口站別的魚種為 1-4 種，漁獲量 1-4 尾，其中尼羅口孵魚及花身鰍是出現頻度較高的魚種。

比較歷年河口魚類之調查結果：

本季調查相較於 108 年第 4 季、109 年第 4 季、110 年第 4 季、111 年第 4 季、112 年第 4 季、113 年第 4 季，同期調查到河口魚類分別為 6 科 6 屬 6 種 31 尾、12 科 13 屬 14 種 139 尾、9 科 10 屬 10 種 93 尾、11 科 12 屬 12 種 49 尾、9 科 9 屬 10 種 71 尾、8 科 8 屬 8 種 19 尾魚類，本季 114 年 10 月採得之河口魚類

種數為 7 科 7 屬 8 種 50 尾。整體來看，本季採樣之魚種數與往年同季相比，較 108 年相對增加，較 109、110 年、111 年及 112 年相對減少，與 113 年相同。

與 108 年同季比較,兩時期採獲的魚種中,均有花身鰯及尼羅口孵魚 2 種。與 109 年同季比較，兩時期採獲的魚種中，均有花身鰯 1 種。與 110 年同季比較，兩時期採獲的魚種中，均有花身鰯及尼羅口孵魚 2 種。與 111 年同季比較，兩時期採獲的魚種中，均有花身鰯 1 種。與 112 年同季比較，兩時期採獲的魚種中，均有花身鰯及尼羅口孵魚 1 種。與 113 年同季比較，兩時期採獲的魚種中，均有奧奈鑽嘴魚、花身鰯及尼羅口孵魚 3 種。漁獲個體數 114 年第 4 季與往年同季相比較本季採樣之魚獲數，較 108 年增加、較 109 年減少、較 110 年減少、與 111 年相近、較 112 年減少、較 113 年增加。

本季調查結果相較於 114 年第 3 季，則魚種數增加，魚獲數增加，本季捕獲之 8 種魚類中，兩季同種魚類有 4 種，為奧奈鑽嘴魚、太平洋棘鯛、尼羅口孵魚及凹鼻鮭，這季捕獲新鰯、火斑笛鯛、約氏笛鯛及花身鰯。

114 年第 4 季主要優勢種為尼羅口孵魚、花身鰯和凹鼻鮭。本季所捕獲的魚種均為臺灣西部常見之魚種。

本季採樣結果與歷季平均值比較，在種數方面本季採獲 8 種，低於歷季平均值 10 種，在魚獲數方面，本季採獲 50 尾，亦低於歷季平均 60 尾。本季採樣優勢種前三名依序為尼羅口孵魚、花身鰯和凹鼻鮭。與以往各季採樣相比較，尼羅口孵魚和花身鰯為經常出現的魚種。在歷季(118Q1-114Q4)28 次採樣資料中，位於前三名的優勢種、尼羅口孵魚出現 17 次、花身鰯出現 5 次、凹鼻鮭出現 1 次。尼羅口孵魚、花身鰯和凹鼻鮭是河口常見之魚種，亦為溫度及鹽度適應性廣泛的魚類，奧奈鑽嘴魚、太平洋棘鯛在歷季採樣的優勢種中偶有出現。目前尚無法判斷是否個採樣佔主要優勢物種正在改變，有待後續更多採樣資料確認。

表3.1.10-7　　歷季河口生態-魚類結果比較表(1/2)

季別＼測站		1D 大堀溪	2D 觀音溪	3D 小飯壢溪	4D 新屋溪	5D 社子溪	所有測站
物種數							
復工前(104.06)		2	0	0	0	0	2
施工期間	108Q1	1	1	7	2	3	11
	108Q2	2	2	6	1	5	10
	108Q3	2	3	4	7	5	9
	108Q4	2	2	2	3	2	6
	109Q1	2	2	4	1	1	5
	109Q2	6	3	7	7	4	13
	109Q3	4	7	5	5	5	15
	109Q4	4	4	6	5	7	14
	110Q1	2	4	2	3	2	14
	110Q2	4	4	6	7	5	14
	110Q3	7	5	6	5	7	14
	110Q4	4	4	5	3	6	10
	111Q1	5	2	6	4	4	11
	111Q2	1	2	0	0	1	3
	111Q3	4	2	2	2	8	13
	111Q4	3	2	4	1	3	12
	112Q1	1	0	3	1	0	4
	112Q2	3	1	6	1	2	7
	112Q3	3	0	4	4	8	15
	112Q4	2	4	3	7	2	10
	113Q1	0	2	2	0	0	4
	113Q2	3	4	1	3	2	9
	113Q3	2	4	4	4	4	12
	113Q4	1	3	2	2	1	8
	114Q1	1	1	0	0	1	3
	114Q2	6	3	1	4	2	10
	114Q3	5	2	1	6	3	12
	114Q4	**1**	**1**	**2**	**4**	**0**	**8**
歷次平均		10					

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.10-7　　歷季河口生態-魚類結果比較表(2/2)

季別＼測站		1D 大堀溪	2D 觀音溪	3D 小飯壢溪	4D 新屋溪	5D 社子溪	所有測站
數量(尾)							
復工前(104.06)		2	0	0	0	0	2
施工期間	108Q1	1	1	10	2	3	17
	108Q2	4	4	17	2	13	40
	108Q3	9	9	13	18	14	63
	108Q4	3	4	3	8	13	31
	109Q1	2	3	7	2	1	15
	109Q2	26	32	43	53	18	172
	109Q3	22	10	55	50	29	166
	109Q4	12	42	37	17	31	139
	110Q1	6	10	7	24	9	56
	110Q2	11	10	21	18	29	89
	110Q3	27	18	28	15	39	127
	110Q4	13	27	19	6	28	93
	111Q1	15	3	39	18	54	129
	111Q2	1	3	0	0	1	5
	111Q3	14	4	3	2	15	38
	111Q4	28	4	9	1	7	49
	112Q1	3	0	8	1	0	12
	112Q2	8	3	15	3	6	35
	112Q3	5	0	10	8	15	38
	112Q4	36	8	6	16	5	71
	113Q1	0	4	5	0	0	9
	113Q2	9	12	1	4	8	34
	113Q3	3	17	9	10	4	43
	113Q4	2	7	2	6	2	19
	114Q1	1	3	0	0	1	5
	114Q2	26	4	2	15	5	52
	114Q3	49	6	2	36	3	96
	114Q4	**21**	**1**	**24**	**4**	**0**	**50**
歷季平均		60					

註 1：粗體表示本季數據。

註 2：歷次平均未包含復工前資料。

表3.1.10-8　　歷季河口生態-魚類生物優勢物種比較表(1/2)

季別 \ 優勢種		中文名	學名
施工期間	108Q1	大鱗龜鮻	*Planiliza macrolepis*
		黑棘鯛	*Acanthopagrus schlegelii*
		長鰭凡鯙	*Moolgarda cunnesius*
	108Q2	大鱗龜鮻	*Planiliza macrolepis*
		尼羅口孵魚	*Oreochromis niloticus*
		黑棘鯛	*Acanthopagrus schlegelii*
	108Q3	尼羅口孵魚	*Oreochromis niloticus*
		大鱗龜鮻	*Planiliza macrolepis*
		星雞魚	*Pomadasys kaakan*
	108Q4	大鱗龜鮻	*Planiliza macrolepis*
		花身鯞	*Terapon jarbua*
		尼羅口孵魚	*Oreochromis niloticus*
	109Q1	大鱗龜鮻	*Planiliza macrolepis*
		彈塗魚	*Periophthalmus modestus*
		尼羅口孵魚	*Oreochromis niloticus*
	109Q2	彈塗魚	*Periophthalmus modestus*
		大鱗龜鮻	*Planiliza macrolepis*
		尼羅口孵魚	*Oreochromis niloticus*
	109Q3	彈塗魚	*Periophthalmus modestus*
		小眼雙邊魚	*Ambassis miops*
		尼羅口孵魚	*Oreochromis niloticus*
	109Q4	大鱗龜鮻	*Planiliza macrolepis*
		彈塗魚	*Periophthalmus modestus*
		小眼雙邊魚	*Ambassis miops*
	110Q1	大鱗龜鮻	*Planiliza macrolepis*
		尼羅口孵魚	*Oreochromis niloticus*
		彈塗魚	*Periophthalmus modestus*
	110Q2	尼羅口孵魚	*Oreochromis niloticus*
		大鱗龜鮻	*Planiliza macrolepis*
		彈塗魚	*Periophthalmus modestus*
	110Q3	尼羅口孵魚	*Oreochromis niloticus*
		大鱗龜鮻	*Planiliza macrolepis*
		花身鯞	*Terapon jarbua*
	110Q4	大鱗龜鮻	*Planiliza macrolepis*
		尼羅口孵魚	*Oreochromis niloticus*
		黑邊布氏鯷	*Eubleekeria splendens*
	111Q1	大鱗龜鮻	*Planiliza macrolepis*
		尼羅口孵魚	*Oreochromis niloticus*
		小眼雙邊魚	*Ambassis miops*
	111Q2	黃鰭棘鯛	*Acanthopagrus latus*
		黑體塘鱧	*Eleotris melanosoma*
		褐塘鱧	*Eleotris fusca*
	111Q3	尼羅口孵魚	*Oreochromis niloticus*
		莫三比克口孵非鯽	*Oreochromis mossambicus*
		星雞魚	*Pomadasys kaakan*
		尖鰭寡鱗鰕虎	*Oligolepis acutipennis*

註：粗體表示本季數據。

表3.1.10-8　　歷季河口生態-魚類生物優勢物種比較表(2/2)

季別＼優勢種		中文名	學名
	111Q4	尼羅口孵魚	*Oreochromis niloticus*
		日本海鰶	*Nematalosa japonica*
		高身鯽	*Carassius cuvieri*
		小眼雙邊魚	*Ambassis miops*
		星雞魚	*Pomadasys kaakan*
	112Q1	綠背鮻	*Planiliza subviridis*
		小眼雙邊魚	*Ambassis miops*
		大棘鑽嘴魚	*Gerres macracanthus*
	112Q2	大鱗龜鮻	*Planiliza macrolepis*
		尼羅口孵魚	*Oreochromis niloticus*
		黃鰭棘鯛	*Acanthopagrus latus*
	112Q3	太平洋棘鯛	*Acanthopagrus pacificus*
		刺蓋塘鱧	*Eleotris acanthopoma*
		星雞魚	*Pomadasys kaakan*
	112Q4	尼羅口孵魚	*Oreochromis niloticus*
		莫三比克口孵非鯽	*Oreochromis mossambicus*
		大鱗龜鮻	*Planiliza macrolepis*
		花身鯞	*Terapon jarbua*
	113Q1	點帶叉舌鰕虎	*Glossogobius olivaceus*
		阿部氏鰨鰕虎	*Mugilogobius abei*
		彈塗魚	*Periophthalmus modestus*
		巴庫寡棘鰕虎	*Redigobius bikolanus*
	113Q2	尼羅口孵魚	*Oreochromis niloticus*
		高身鯽	*Carassius cuvieri*
		食蚊魚	*Gambusia affinis*
	113Q3	高身鯽	*Carassius cuvieri*
		太平洋棘鯛	*Acanthopagrus pacificus*
		大鱗龜鮻	*Planiliza macrolepis*
		尼羅口孵魚	*Oreochromis niloticus*
	113Q4	小眼雙邊魚	*Ambassis miops*
		頭孔塘鱧	*Ophiocara porocephala*
		花身鯞	*Terapon jarbua*
	114Q1	羅漢魚	*Pseudorasbora parva*
		勒氏笛鯛	*Lutjanus russellii*
		頭孔塘鱧	*Ophiocara porocephala*
	114Q2	大鱗鮻	*Planiliza macrolepis*
		奧奈鑽嘴魚	*Gerres oyena*
		小眼雙邊魚	*Ambassis miops*
	114Q3	吉利非鯽	*Coptodon zillii*
		尼羅口孵魚	*Oreochromis niloticus*
		金錢魚	*Scatophagus argus*
	114Q4	**尼羅口孵魚**	***Oreochromis niloticus***
		花身鯞	***Terapon jarbua***
		凹鼻鈍	***Chelonodon patoca***

註：粗體表示本季數據。




圖 3.1.10-7　　歷季河口生態-魚類數量結果比較圖(1/2)





圖 3.1.10-7　　歷季河口生態-魚類數量結果比較圖(2/2)






圖 3.1.10-8　　歷次河口生態-魚類平均種類數及平均豐度(尾)比較圖

五、總基礎生產力

比較歷季與本季觀塘各河口基礎生產力，呈現不同季節差異。本季平均值為0.26 mg C/m^3/h，約爲上一季7月平均值4.90 mg C/m^3/h的0.05倍；歷年同季介於0.26 mg C/m^3/h至4.81mg C/m^3/h，以本季為最低，歷次平均為4.52mg C/m^3/h。本季平均值為0.26 mg C/m^3/h，本季基礎生產力明顯偏低，顯示環境條件可能不利於浮游植物生長與光合作用 (**表3.1.10-9 圖3.1.10-9~10**)。

表3.1.10-9　　歷季河口生態-總基礎生產力結果比較表

季別 \ 測站		大堀溪口	觀音溪口	小飯壢溪口	新屋溪口	社子溪口	本季平均
施工期間	111Q2	1.84	1.3	1.3	1.69	2.26	1.68
	111Q3	3.91	3.92	3.75	3.66	3.68	3.78
	111Q4	2.55	2.76	2.46	2.57	2.8	2.63
	112Q1	4.21	5.95	4.17	5.75	5.53	5.12
	112Q2	3.94	3.17	3.67	3.48	4.10	3.67
	112Q3	6.17	3.45	6.58	5.65	5.84	5.54
	112Q4	4.96	4.77	4.35	4.89	5.10	4.82
	113Q1	1.17	1.03	1.07	1.14	1.14	1.11
	113Q2	4.29	3.79	4.38	4.70	3.54	4.14
	113Q3	3.62	3.10	3.09	2.96	3.59	3.27
	113Q4	3.30	3.04	3.80	3.67	3.13	3.39
	114Q1	38.25	49.50	9.00	3.38	2.25	20.48
	114Q2	10.65	0.06	0.94	0.75	2.63	3.01
	114Q3	4.15	3.76	2.90	8.14	5.56	4.90
	114Q4	**0.14**	**0.24**	**0.27**	**0.05**	**0.58**	**0.26**
歷次平均		4.52					

註 1：單位為 mg C/m^3/h。

註 2：粗體表示本季數據。




圖 3.1.10-9　　歷季河口生態-總基礎生產力結果比較圖(1/2)




圖 3.1.10-9　　歷季河口生態-總基礎生產力結果比較圖(2/2)




圖 3.1.10-10　　歷次海域生態-總基礎生產力歷次平均比較圖

3.1.11 漁業經濟

一、刺網現場生物採樣

表 3.1.11-1 為自 108 年度以來之各季採樣調查結果，比對歷年第 4 季與本年度季之結果 (僅魚類部分)來看，本年度季之採樣分類結果較歷年平均值低 (歷年平均科別數為 14 科、平均種類數為 20 種)；總捕獲重量方面，本年度季之捕獲重量則略低於歷年平均重量 (約 60.52 公斤)；總捕獲尾數部分，本年度季則明顯低於歷年平均 (163 尾)；單位努力量方面，則同樣明顯低於歷年平均 (27.05 尾/小時)；而優勢種則與之前有所不同，為中國鯧。

另，比較歷年及本年度之第 4 季 (108 年~114 年度之 9-11 月)共 21 次之採樣結果 (**表 3.1.11-2**)，累計共捕獲魚類 32 科 61 種，整體採樣紀錄中，並無 21 次採樣皆有出現之魚種，但以多鱗四指馬鮫為出現次數最多之物種，共計捕獲 13 次，且本年度亦有捕獲到；其次則為長鰳 (*Ilisha elongata*)，共計 10 次捕獲紀錄，但本年度季無捕獲紀錄 (但 108-112 年度皆有捕獲)；而無法完全鑑定至種的鯧科魚類，則有 11 次的捕獲紀錄。若以年度間之捕獲結果來看，除了多鱗四指馬鮫有於 7 年皆有捕獲之外，尚包含有鯧科魚類；而除上述種類之外，若以任五個年度間皆有出現之魚種，則共計有 6 個種類，包含海蘭德若鯵、大海鰱 (*Megalops cyprinoides*)、鰛、長鰳、臺灣馬加鰆 (*Scomberomorus guttatus*)、鐮鯧。

由於本試驗所採用之漁具為刺網，因此網具之漁獲選擇性相對較高，且施放時間相對於當地漁民作業時程較短，又因本海域之水深較淺等因素影響，皆可能使每次採樣之物種受到不同程度之影響而有所不同。如以季節 (每三個月為一次採樣紀錄)之考量角度來看，本試驗所捕獲到的物種多屬於定棲性的物種，且較少隨著季節轉換而完全從桃園沿岸海域遷移至其他海域，故可經常性的在該海域被捕獲到，其變化僅有月別間或年間之捕獲數量差異。此外，本研究進一步將歷年來之第 4 季中，所有採集到的魚種之每小時漁獲尾數，以 ANOSIM 檢定來探究其魚種組成相似程度，其結果顯示，魚種組成在年間並無顯著差異 (R=0.1)。由上述分析結果來看，桃園沿岸海域之環境變動或魚種組成結構變化等資訊應尚存在許多影響因素，雖每次調查仍能採集到首次捕獲之魚種，但目前結果在統計分析上仍呈現無顯著差異。建議可再持續累積長期觀測結果，此除了可避免產生因採樣試驗所造成之誤差之外，亦應能更清楚解釋整體海域之魚類資源變動特性。

二、漁業資源

桃園海域112年作業漁船數共計782艘,其中動力漁筏有348艘佔44.50%，無動力漁船5艘佔0.63%，動力漁船數中，動力舢舨212艘佔27.11%，5噸未滿動力漁船169艘佔21.61%，5噸～10噸未滿動力漁船19艘佔 2.43%，10噸～20噸未滿動力漁船19艘佔2.43 %，20噸～50噸未滿動力漁船10艘佔1.28%。以上所有動力漁船合計有429艘合計佔54.86%。桃園海域113年作業漁船數共計774艘，其中動力漁筏有340艘佔43.93 %，無動力漁船5艘佔0.65 %，動力漁船數中，動力舢舨213艘佔27.52 %，5噸未滿動力漁船167艘佔21.58 %，5噸～10噸未滿動力漁船20艘佔 2.58 %，10噸～20噸未滿動力漁船19艘佔2.45%，20噸～50噸未滿動力漁船10艘佔1.289%。以上所有動力漁船合計有429艘合計佔55.43 %。

圖 3.1.11-1 為108年至114年第4季永安和竹圍地區漁獲產量產值比較。在產量方面，永安平均產量為58公噸，以110年124公噸為最高，竹圍平均產量33公噸，以114年60公噸為最高；在產值方面，永安平均產值為2,850萬元，以110年5,616萬元為最高，竹圍平均產值1,079萬元，以114年2,046萬元為最高。整體來看，永安109年和110年第4季產量明顯較其他年高，經分析各年度第4季魚種供銷量報表，發現永安在109年和110年第4季其他鯡、帶魚科和白姑魚大量出現後，來游量則有明顯滑落現象；竹圍108年和114年第4季產量明顯較其他年高，其中108年第4季有白姑魚和赤鰭笛鯛捕獲量較高的情形，而114年第4季則是日本真鱸、其他鯵和鯷魚捕獲量較高。

桃園地區魚苗漁業歷年產量如**表 2.10.2-2** 所示，本區域有烏魚苗及鰻魚苗兩類，其中烏魚苗自99年已無漁民採捕，鰻魚苗產量則在95年達到高峰(3,726千尾)後，產量開始減少，進一步由**圖 3.1.11-2** 來看，不僅是桃園地區鰻苗有減少之情況，全台產量亦有相同情況發生，非單一工程所造成的地區性影響。

桃園海域作業漁船總數109年至113年依序為780、778、778、782及774艘，漁船數呈現穩定無明顯增減。漁船種類整體而言以動力漁筏約43.92%佔最多，其次依序是動力舢舨約27.52 %及5噸未滿動力漁船約21.58 %(**表 2.10.2-3**)。

桃園地區漁業產量分析顯示，近海漁業部分近5年(109～113年)皆10噸以下，主要與從事近海漁業人員大幅減少有關；沿岸漁業產量近5年呈現穩定狀態，多維持於600噸上下(**表 2.10.2-4**，**圖 2.10.2-6**)。

表3.1.11-1　　歷年刺網採樣漁獲統計

年度	季別	種類數	總重量(公斤)	總數量(尾數)	單位努力量(尾/小時)	優勢魚種
108	Q1	8 科 9 種	56.4	143	71.5	長鰩 (63 尾/小時)
	Q2	12 科 17 種	83.35	208	34.67	托爾逆鈎鰺 (12 尾/小時)
	Q3	13 科 22 種	111.39	214	26.75	寬尾斜齒鯊 (6.75 尾/小時)
		1 科 1 種(蟹類)	0.151	2	0.25	善泳蟳 (0.25 隻/小時)
		1 科 1 種(頭足類)	0.0065	1	0.125	日本無針烏賊 (0.125 隻/小時)
	Q4	19 科 25 種	57.17	144	24.4	長鰩 (8.83 尾/小時)
109	Q1	14 科 17 種	225.57	273	68.25	鰛 (40.25 尾/小時)
		1 科 2 種(蟹類)	0.362	4	1	日本蟳、紅星梭子蟹 (0.5 隻/小時)
	Q2	12 科 18 種	84.61	129	32.25	白姑魚 (8.75 尾/小時)
	Q3	10 科 11 種	43.97	182	26	鯧科魚類 (17.1 尾/小時)
		1 科 1 種(蟹類)	0.3	1	0.14	善泳蟳 (0.14 隻/小時)
	Q4	12 科 21 種	63.51	200	28.57	長鰩 (8.29 尾/小時)
110	Q1	11 科 14 種	50.62	76	6.33	鰛 (3.17 尾/小時)
	Q2	9 科 11 種	83.69	86	15.64	斑海鯰 (4.36 尾/小時)
	Q3	10 科 16 種	68.02	97	12.93	白腹鯖 (5.47 尾/小時)
		1 科 1 種(蟹類)	0.124	1	0.13	紅星梭子蟹 (0.13 尾/小時)
	Q4	11 科 14 種	83.903	218	39.64	鯧科魚類 (13.82 尾/小時)
111	Q1	6 科 10 種	62.886	94	23.5	黃金鰭鰺 (8.25 尾/小時)
		1 科 1 種(蟹類)	1.956	3	1.5	擬深穴青蟳 (1.5 隻/小時)
	Q2	7 科 10 種	40.04	47	7.23	斑海鯰 (2.31 尾/小時)
	Q3	9 科 13 種	38.097	40	8	烏鯧 (1.83 尾/小時)
	Q4	13 科 20 種	73.789	180	30	布氏鯧鰺 (7.5 尾/小時)
112	Q1	9 科 12 種	28.93	34	5.67	鯧科魚類 (4 尾/小時)
		1 科 1 種(蟹類)	0.352	2	1	紅星梭子蟹 (1 隻/小時)
	Q2	8 科 10 種	21.2	43	7.17	多鱗四指馬鮫 (1.83 尾/小時)
	Q3	8 科 12 種	42.892	84	15.27	日本竹筴魚 (4.91 尾/小時)
	Q4	18 科 26 種	67.16	176	14.67	寬尾斜齒鯊 (4.83 尾/小時)
113	Q1	8 科 10 種	21.2	43	7.17	多鱗四指馬鮫(1.83 尾/小時)
	Q2	6 科 8 種	17.029	39	8.67	鐮鯧 (2.22 尾/小時)
		1 科 1 種(蟹類)	0.06382	1	0.22	日本蟳 (0.22 隻/小時)
		1 科 1 種(頭足類)	0.02254	1	0.22	沙蝤 (0.22 隻/小時)
	Q3	6 科 10 種	15.51	28	5.6	鐮鯧 (1.8 尾/小時)
	Q4	9 科 15 種	54.36	57	10.36	大口逆鈎鰺 (2.36 尾/小時)
114	Q1	7 科 8 種	72.921	101	15.54	臺灣馬加鰆 (4.62 尾/小時)
		1 科 1 種(蟹類)	0.0299	1	0.5	擬深穴青蟳 (0.5 尾/小時)
	Q2	4 科 9 種	29.907	70	10.8	藍圓鰺 (4.46 尾/小時)
	Q3	6 科 8 種	11.485	84	14	黃帶圓腹鯡 (11.17 尾/小時)
		1 科 1 種(蟹類)	0.047	1	0.008	紅星梭子蟹 (0.008 尾/小時)
	Q4	10 科 13 種	38.084	44	7.33	中國鯧 (1.67 尾/小時)

註：自 108 年第 2 季開始，每季調查頻率改為每月 1 次，故其單位努力量為三次調查結果之平均。

表3.1.11-2　　歷年第4季(9～11月)之刺網捕獲生物之科別、種類及單位漁獲尾數(ind./hr)

物種 \ 時間	108年 9/10 尾數	108年 10/23 尾數	108年 11/8 尾數	109年 9/2 尾數	109年 10/26 尾數	109年 11/19 尾數	110年 9/27 尾數	110年 10/14 尾數	110年 11/23 尾數	111年 9/3 尾數	111年 10/7 尾數	111年 11/5 尾數	112年 9/30 尾數	112年 10/2 尾數	112年 11/1 尾數	113年 9/2 尾數	113年 10/11 尾數	113年 11/19 尾數	114年 9/22 尾數	114年 10/14 尾數	114年 11/20 尾數
真鯊科 Carcharhinidae																					
沙拉真鯊 *Carcharhinus sorrah*																				0.5	
寬尾斜齒鯊 *Scoliodon laticaudus*		1.5												14.5		2.67	0.5		3.33		
雙髻鯊科 Sphyrnidae																					
紅肉丫髻鮫 *Sphyrna lewini*														0.5							
弘棚科 Albulidae																					
圓頜弘棚 *Albula glossodonta*											0.4										
海鮎科 Ariidae																					
斑海鮎 *Arius maculatus*			1		0.33									6						0.5	
鶴鱵科 Belonidae																					
無斑圓尾鶴鱵 *Strongylura leiura*																				0.5	
鯵科 Carangidae																					
棘鯵 *Alectis ciliaris*											0.4			0.5							
印度棘鯵 *Alectis indica*														0.5							
甲若鯵 *Carangoides armatus*														5							
海蘭德若鯵 *Carangoides hedlandensis*	7.5				0.33					1						0.67			4		
藍圓鯵 *Decapterus maruadsi*											0.4										
大甲鯵 *Megalaspis cordyla*																	0.5				
烏鯧 *Parastromateus niger*	0.5				2.67									1							
大口逆鉤鯖 *Scomberoides commersonnianus*								0.5								1.33	5.5		2.67		
橫紋逆鉤鯖 *Scomberoides lala*																	0.5				
托爾逆鉤鯖 *Scomberoides tol*					0.67									0.5			1.5				
布氏鰺鯖 *Trachinotus blochii*			0.5									30		0.5			0.5				
日本竹莢魚 *Trachurus japonicus*							25														
虱目魚科 Chanidae																					
虱目魚 *Chanos chanos*								2													
胃刃魚科 Chirocentridae																					
胃刃魚 *Chirocentrus dorab*														0.5							
鯡科 Clupeidae																					
黃帶圓腹鯡 *Dussumieria elopsoides*		1												2.5						2	
海鯇科 Elopidae																					
海鯇 *Elops machnata*		0.5									0.4										
鯷科 Engraulididae																					
克氏鯷鯷 *Thryssa chefuensis*		0.5																			
黃鯷 *Setipinna tenuifilis*		2.5												0.5							
石鱸科 Haemulidae																					
臀斑犁齒鱸 *Hapalogenys analis*						2.5															
花尾胡椒鯛 *Plectorhinchus cinctus*						0.5															
鱵科 Hemiramphidae																					
扁鱵 *Hemiramphus far*														0.5							
頎魚科 Istiophoridae																					
肉食頎魚 *Istiophorus platypterus*																				0.5	
鰭科 Leiognathidae																					
短棘鰭 *Leiognathus equulus*														1							
松鯛科 Lobotidae																					
松鯛 *Lobotes surinamensis*		1	2					0.5			0.4										
大海鯇科 Megalopidae																					
大海鯇 *Megalops cyprinoides*		1			0.33						0.4			0.5			0.5				
眼眶魚科 Menidae																					
眼眶魚 *Mene maculata*																	0.5				
單棘鯇科 Monacanthidae																					
單角單棘鯇 *Aluterus monoceros*			0.5																		
長尾單單棘鯇 *Aluterus scriptus*											0.4										
鯔科 Mugilidae																					
鯔 *Mugil cephalus*		1	1.5		1			1.5									1	1.5		2	
馬鯇科 Polynemidae																					
多鰭四指馬鯇 *Eleutheronema rhadinum*		0.5	2		1.33	0.5		0.5	12	0.5	0.4	3.33	0.5		4			4			0.4
短吻鰶科 Pristigasteridae																					
長鰶 *Ilisha elongata*	7.5	18	1		19.33			0.5	8.67		24	6.67		5.5	4.5						
金梭魚科 Scatophagidae																					
金梭魚 *Scatophagus argus*								1									1.5				
石首魚科 Sciaenidae																					
黃金鰔鯧 *Chrysochir aureus*						1.5															
大黃魚 *Larimichthys crocea*									2			0.67									
小黃魚 *Larimichthys polyactis*		0.5																			
鯧 *Machilhys meiay*						0.5															
白姑魚 *Pennahia argentata*		0.5				1															
大頭白姑魚 *Pennahia macrocephalus*								1						8.5							
鯖科 Scombridae																					
花腹鯖 *Scomber australasicus*											11.2										
白腹鯖 *Scomber japonicus*					0.33																
康氏馬加鰆 *Scomberomorus commerson*				1																	
臺灣馬加鰆 *Scomberomorus guttatus*	2.5				1.67					0.5			2					3			
高麗馬加鰆 *Scomberomorus koreanus*														2						0.5	
日本馬加鰆 *Scomberomorus niphonius*	1	3.5								1	4	4									
鰤科 Seriolidae																					
橫紋光鰤鰤 *Cephalopholis boenak*						1.5															
臭肚魚科 Siganidae																					
褐臭肚魚 *Siganus fuscescens*	2																				
鯛科 Sparidae																					
黃鰭棘鯛 *Acanthopagrus latus*			0.5						2.67			2		0.5	0.5						
鯧科 Stromateidae																					
銀鯧 *Pampus argenteus*				3.5	12.67		0.5	18.5					3								
中國鯧 *Pampus chinensis*																			6		0.4
鐮鯧 *Pampus echinogaster*		5	2		0.33						1.2			6.5		2.67					
光鯧 *Pampus punctatissimus*											2										
鯧科 Gen. spp.			1.5	25			35		4	9		14.67	7		5.5			2	1.33		0.8
四齒魨科 Tetraodontidae																					
條紋兔頭魨 *Lagocephalus spadiceus*		0.5																			
帶魚科 Trichiuridae																					
日本帶魚 *Trichiurus japonicus*	0.5	0.5			0.67			0.5						0.5							
鰏科 Uranoscopidae																					
東方統魚鰏 *Ichthyscopus pollicaris*											1.6		0.5	2.5							
單位漁獲尾數(ind./hr)	21.5	38	12.5	29.5	41.66	8	60.5	26.5	29.34	12	25.6	61.34	13	60.5	14.5	7.34	12.5	10.5	17.33	4.5	3.6
科數	5	14	9	2	9	4	2	10	5	4	11	7	4	17	4	3	6	4	3	6	3
種數	7	16	10	3	13	7	3	10	5	5	14	7	5	22	4	4	10	4	5	6	4

資料來源：歷年及本年度之第 4 季刺網現場採樣漁獲統計




圖 3.1.11-1　　歷年第 4 季永安和竹圍地區漁獲產量產值




圖 3.1.11-2　　103-113 年鰻魚苗產量

3.1.12 礁體懸浮固體監測


3.1.12.1 每日漂沙監測

本季共有一個發布警報之颱風為鳳凰颱風，其颱風路徑圖，如**圖 3.1.12.1-1** 所示。根據以往的研究 Pomeroy, Lowe et al. (2017),Jia, Ren et al. (2014),Ly and Huang (2022) 可知漂沙濃度與海象有顯著正相關關係，波浪越強漂沙濃度越高，反之，波浪越平靜漂沙濃度越低。故本團隊蒐集離觀塘工業區工業專用港的中央氣象局新竹浮標資料與第三座天然氣接收站建港及圍堤造地新建工程的波流浮標資料進行比對，如**圖 3.1.12.1-2** 所示。由上述資料顯示波高與懸浮固體濃度呈現顯著關聯性，波高愈高則懸浮固體濃度愈高。

將本季與前幾季的礁體延時區間與最大平均懸浮固體濃度監測值進行比對，如**圖 3.1.12.1-3** 與**圖 3.1.12.1-4** 所示。並以 24 小時、120 小時、180 小時及 300 小時不同的延時時間區間進行討論，將資料整理於**表 3.1.12.1-1** 及**表 3.1.12.1-2**。本季 G2 區與保護區四個不同延時的區間與最大平均濃度值，明顯小於去年同時期資料。建議持續進行漂沙監測，以掌握懸浮固體濃度變化。




圖 3.1.12.1-1　鳳凰颱風路徑圖(資料來源：颱風資料庫)




註：由上而下分別為新竹浮標波高與三接港浮標波高、G2 區懸浮固體濃度、保護區懸浮固體濃度

圖 3.1.12.1-2　懸浮固體濃度與新竹浮標波高資料



註：其中 X 軸為延時區間、Y 軸為監測資料的最大平均濃度

圖 3.1.12.1-3　G2 區懸浮固體濃度 114 年第 4 季與歷次逐時監測值比對圖



註：其中 X 軸為延時區間、Y 軸為監測資料的最大平均濃度

圖 3.1.12.1-4　保護區懸浮固體濃度 114 年第 4 季與歷次逐時監測值比對

表3.1.12.1-1　G2區各時間區間與各季最大濃度整理表

	113 年第 4 季	114 年第 1 季	114 年第 2 季	114 年第 3 季	114 年第 4 季
24 小時	245.43	177.94	111.77	27.22	85.78
120 小時	167.31	140.29	61.81	14.00	63.79
180 小時	160.81	113.30	47.87	11.25	59.20
300 小時	154.75	97.68	41.43	8.40	50.80

表3.1.12.1-2　保護區各時間區間與各季最大濃度整理表

	113 年第 4 季	114 年第 1 季	114 年第 2 季	114 年第 3 季	114 年第 4 季
24 小時	578.46	321.56	257.93	68.44	115.14
120 小時	337.23	212.64	137.16	38.59	94.24
180 小時	339.71	171.50	111.52	36.88	85.17
300 小時	283.75	150.18	107.23	33.68	68.19

3.1.12.2 海域空間濁度變化

本節將施工海域作為一個整體來評估與比較歷年監測結果，包括沿岸流速剖面(圖 3.1.12.2-1)、懸浮固體濃度剖面(圖 3.1.12.2-2)、沿岸方向懸浮固體通量在時間、空間(圖 3.1.12.2-3)上的變化情況。圖 3.1.12.2-1 為歷年監測之沿岸流速剖面。

109 年第二季之前，工業港建物尚未完全建起、無明顯影響觀測區域近岸流速。自 109 年第四季起受工業港工程建物影響，於漲潮期間在近岸處約 X 座標 600 公尺附近，平均後整體流速降低。











110 年第二季與前次觀測相近，在 X 座標 600 公尺內的水流變化並不大。110 年第四季近岸流速變化小，並於漲潮時在 X 座標 900 公尺外，流速明顯變強。











111 年第二季觀測相較於歷年觀測整體明顯平均流速較低，於 X 座標 200 至 600 公尺觀測退潮受到結構物的影響流速明顯下降。111 第四季，在 X 座標 X 座標 1200 公尺外因觀測的水深較深，無論漲退潮，皆於水深較深的區域流速較快。

112 年第二季觀測漲潮時段，受工業港建物影響，於 X 座標 1200 公尺內的流速變化並不明顯平均流速僅 0.15m/s，退潮時，平均流速為 0.43m/s，最大流速可達 0.93m/s。112 年第四季，涵蓋工業港範圍測線之於漲潮時段整體平均流速為 -0.21m/s，退潮時為 0.30m/s。

113 年第二季觀測因工業港工程逐漸完成，漲潮時流場於 1300 公尺內平均流速較慢，整體平均東西向流速為 0.16 m/s。113 年第四季全側線之平均東西流速為 0.11m/s，涵蓋工業港範圍測線於漲潮時段平均流速為 0.02m/s。

114 年第二季，漲潮時流場於 1300 公尺內平均流速較慢，全側線之平均東西流速為 0.03m/s，受工業港圍堤影響，工業港內漲退潮流速變化不明顯，平均東西流速為 0.06m/s。114 年第四季觀測工業港已開始運作，漲潮時流場於 1300 公尺內平均流速較慢，整體平均東西向流速為 -0.14 m/s，退潮時流速為 0.18m/s，受工業港圍堤影響，漲退潮時流速變化並不明顯，工業港內平均東西向流速為 0.02m/s。

	漲潮	退潮
108 年第四季		
109 年第二季		
109 年第四季		
110 年第二季		
110 年第四季		

	漲潮	退潮
111 年第二季		
111 年第四季		
112 年第二季		
112 年第四季		
113 年第二季		




圖 3.1.12.2-1　歷年監測之沿岸流速剖面比較

圖 3.1.12.2-2 為歷年監測之懸浮固體濃度剖面圖。108 年第四季為施工初期，退潮時，在近岸 X 座標 400 公尺內其濃度較高。

109 年第二季觀測於漲潮時在 200~1000m 有懸浮固體濃度較前觀測有較高些，退潮時則在 600~1000m 測量到較高懸浮固體濃度。109 年第四季再漲退潮期間，皆無明顯濃度較高的情形發生。











110 年第二季期間，懸浮固體濃度監測僅在退潮期間懸浮固體濃度較漲潮期間高。110 年第四季懸浮濃度集中在 1200~1500 公尺之間，退潮時因 P01P02 附近有出現懸浮固體濃度集中的現象，故於-400 至 0 公尺則顯示明顯濃度集中的情形出現。











111 年第二季，於漲潮期間在離岸 200 至 1200 公尺之間，懸浮固體濃度較退潮時僅集中在 400 至 600 公尺附近的濃度來的高且分布較廣。111 年第四季，漲潮期間 0 至 600 公尺有明顯濃度集中的現象，另外於底層以及延伸之水深較深的地區濃度較大，退潮時近岸的底層濃度明顯較大且於 0 至 1000 公尺中表層的濃度較高且分布較廣。

112 年第二季，漲潮期間懸浮固體濃度及分佈與 111 年第二季相似，退潮時僅在 1400~1600 公尺間有較高的濃度現象發生。112 年第四季，漲潮期間懸浮固體濃度平均為 51.0mg/Ｌ，退潮期間懸浮固體濃度平均為 43.2mg/Ｌ。

113 年第二季觀測因工業港工程逐漸完成，懸浮固體濃度在 400~1200 公尺懸浮固體濃度平均為 19.7mg/Ｌ，退潮時懸浮固體濃度平均為 47.6 mg/l。113 年第四季觀測日期前後懸浮固體濃度來源受天氣因素影響，淺水區波浪擾動底床再懸浮影響程度大，全側線懸浮固體濃度平均為 109.1mg/Ｌ。

114 年第二季工業港已試營運，漲潮期間懸浮固體濃度無明顯特定較高的區域，整體懸浮固體濃度平均為 25.3mg/Ｌ。114 年第四季觀測工業港已試營運，圖 3.1.12.2-13 說明，本季漲潮期間懸浮固體濃度無明顯特定較高的區域整體懸浮固體濃度平均為 16.9mg/Ｌ，漲潮時懸浮固體濃度平均為 15.6 mg/Ｌ，退潮時懸浮固體濃度平均為 18.0mg/Ｌ。

	漲潮	退潮
108 年第四季		
109 年第二季		
109 年第四季		
110 年第二季		
110 年第四季		

	漲潮	退潮
111 年第二季		
111 年第四季		
112 年第二季		
112 年第四季		
113 年第二季		




圖 3.1.12.2-2　歷年監測之懸浮固體濃度剖面比較

由圖 3.1.12.2-3 歷年懸浮固體通量於時間及空間的變化結果可見：

(1) 歷年監測之沿岸方向懸浮固體通量隨時間的變化特性一致，均由潮汐主導。本季 114 年第四季觀測隨時間變化之平均通量為 0.3 mg/m^2/s。

(2) 本季 114 年第四季觀測隨空間變化之全測線平均通量為 0.8 mg/m^2/s，僅涵蓋工業港之測線為 0.3 mg/m^2/s，於涵蓋棧橋測線為 3.1 mg/m^2/s。施工範圍外水深較深處(1200 米外)之懸浮固體通量為-0.7 mg/m^2/s。




圖 3.1.12.2-3　歷年監測之沿岸方向懸浮固體通量在時間與空間變化

3.1.13 辦理海域地形水深測量

3.1.13.1 海域地形水深測量

施測區域附近海岸走向大致由西南西向慢慢轉為南南西向，略呈向外凸的弧形，但曲折度不大，施測海岸地形分區歸屬於台灣西北部之中壢台地，海岸線平直，大部分屬砂岸，局部地區並可發現粒徑 10~30 公分卵礫石，施測範圍海岸於砂岸間有局部珊瑚礁及藻礁斷續出現，尤以觀音海水浴場南側最為典型，該區段於退潮時刻，可露出長約有百公尺長，寬約 20 公尺的黃褐色礁層，經海水侵蝕作用，已有海蝕溝形成。

施測範圍海岸多海岸沙丘與河口地形，自白玉經大潭至觀音之間沿著岸線發展一段長約兩公里，寬約數十至一百公尺，高約 10m 之沙丘，顯示此區域具備泥沙沉積之環境 (河口地形)，以及相當活躍之風吹砂現象 (海岸沙丘)，海岸沙丘之規模近年來正逐漸後退、規模也略有縮小；於各河口附近並有凹入的河口或潟湖地形，而由新屋溪口，小飯壢溪口以及觀音溪口等河口沙嘴走向均是向西南延伸，可以判斷整個沿岸漂沙優勢方向是由東北向西南向 (張金機，1997)。

依據水利署於桃園縣海岸觀測資料 (108 年) 顯現：桃園海岸具明顯之夏淤冬刷現象，觀音以北部分侵淤互現大致平衡；除下埔附近侵蝕外，以南部分大致淤積，以觀音海水浴場及永安漁港北側較為顯著，永安以南則因受防波堤阻擋呈侵蝕現象，白玉附近海灘呈現侵蝕露出部分礫石外，其餘大部分海岸尚稱相當穩定，原有之海岸砂丘有後退之趨勢，防風林帶也逐漸消失。

經濟部水利署第二河川局「桃園海岸變遷監測調查計畫」在進行海岸線變動計算時，依沿岸間隔每 500 公尺攫取一斷面之位置點，並依此彙整 1985 年、2004 年、2009 年、2010 年、2012 年、2016 年等歷年測量資料套匯結果。依據經濟部水利署第二河川局「桃園海岸變遷監測調查計畫」期末報告 (2016) 指出，施測海岸在 1985~2016 年海岸線變遷，老街溪至大潭電廠取水口以北段，除雙溪口溪南側及取水口等局部地區之海岸線有後退情形外，其餘大致以往外海成長為主，在大潭電廠取水口以南至永安漁港北側之間海岸有明顯海岸線後退現象，並且在 2016 年 5 月測得向陸側 139.53 公尺的變動距，其中部分海岸線已退至堤趾處，故以新屋溪至永安漁港北側間地區海岸線後退情形較劇烈。

現依據 113 年 12 月、114 年 6 月及 114 年 10 月海域地形監測資料進行海域水深變化分析。

(1) 斷面水深比較

為比較海域地形斷面的變化，於施測海域內切取 9 條斷面進行斷面分析，各斷面兩端控制點詳**表 2.12.2-1**，114 年 10 月颱風季節後分析斷面主要水深斷面里程及坡降分析表如**表 2.12.2-2~表 2.12.2-3** 所示。斷面上之里程控制仍由陸域控制點起算，**圖 3.1.13.1-1~圖 3.1.13.1-3** 為 9 個斷面水深地形變化比較圖。

斷面圖顯示斷面 S01 至斷面 S03 之坡度變化極為相似，約為 0.93%~0.98%之間，斷面 S04 之坡度最陡為 1.13%，斷面 S04 往南坡度漸緩，斷面 S09 之坡度最緩為 0.78%。

由斷面水深地形變化比較可知，斷面 S01 (大堀溪口南側) 全斷面於 114/06~114/10 期間平均淤積高度約為+0.27 公尺，於 113/12~114/10 期間平均淤積高度約為+0.02 公尺。

斷面 S02 (白玉海濱) 全斷面於 114/06~114/10 期間平均淤積高度約為+0.13 公尺，於 113/12~114/10 期間平均淤積高度約為+0.07 公尺。

斷面 S03 (觀音溪口南側) 全斷面於 114/06~114/10 期間平均侵蝕深度約為-0.07 公尺，於 113/12~114/10 期間平均淤積高度約為+0.09 公尺。

斷面 S04 (塘尾海濱) 全斷面於 114/06~114/10 期間平均侵蝕深度約為-0.12 公尺，於 113/12~114/10 期間平均侵蝕深度約為-0.09 公尺。

斷面 S05 (大潭電廠進出水口間) 全斷面於 114/06~114/10 期間平均侵蝕深度約為-0.45 公尺，於 113/12~114/10 期間平均侵蝕深度約為-0.35 公尺。

斷面 S06 (大潭海岸保護工程段) 全斷面於 114/06~114/10 期間平均侵蝕深度約為-0.22 公尺，於 113/12~114/10 期間平均侵蝕深度約為-0.14 公尺。

斷面 S07 (新屋溪口南方) 全斷面於 114/06~114/10 期間平均侵蝕深度約為-0.21 公尺，於 113/12~114/10 期間平均侵蝕深度約為-0.06 公尺。

斷面 S08 (永安漁港北側) 全斷面於 114/06~114/10 期間平均侵蝕深度約為-0.18 公尺，於 113/12~114/10 期間平均侵蝕深度約為-0.05 公尺。

斷面 S09 (笨港海濱) 全斷面於 114/06~114/10 期間平均侵蝕深度約為-0.14 公尺，於 113/12~114/10 期間平均侵蝕深度約為-0.00 公尺。

114 年 6 月至 114 年 10 月斷面侵淤分析如**表 3.1.13.1-1** 所示，斷面 S01、斷面 S02 及斷面 S03 呈現淤積，平均淤積高度分別約為+0.02 公尺、+0.07 公尺及+0.09 公尺，斷面 S05 呈現侵蝕，平均侵蝕深度約為-0.35 公尺，其餘各斷面平均侵蝕深度均在 0.14 公尺內。

113 年 12 月至 114 年 10 月斷面侵淤分析如**表 3.1.13.1-2** 所示，斷面 S01 及斷面 S02 呈現淤積，平均淤積高度分別約為+0.27 公尺及+0.13 公尺，斷面 S05 呈現侵蝕，平均侵蝕深度約為-0.45 公尺，其餘各斷面平均侵蝕深度均在 0.22 公尺內。

(2) 等深線比較

現將 113 年 12 月、114 年 6 月及 114 年 10 月三次施測結果，以每 5 公尺間之等深線繪製等深線比較如**圖 3.1.13.1-4 所示**。結果顯示施測海域之等深線走向趨勢不變，斷面 S04 北側-25m 等深線及-30m 等深線往陸地退縮，斷面 S04 南側-5m 等深線及-10m 等深線往外海推進。

114 年 6 月至 114 年 10 月等深線侵淤比較如**表 3.1.13.1-3** 所示，113 年 12 月至 114 年 10 月等深線侵淤比較如**表 3.1.13.1-4** 所示。

114/06~114/10 期間 0m 等深線於斷面 S03 呈現淤積、前進距離約為 61.3 公尺，其餘斷面變遷距離均在 10 公尺以內；-5m 等深線於斷面 S01 呈現淤積、前進距離約為 37.8 公尺，斷面 S06 呈現侵蝕、退縮距離約為 23.2 公尺，其餘斷面變遷距離均在 11 公尺以內；-10m 等深線於斷面 S04、斷面 S05、斷面 S08 及斷面 S09 呈現侵蝕、退縮距離分別約為 25.6 公尺、30.4 公尺、20.1 公尺及 24.4 公尺，其餘斷面變遷距離均在 13 公尺以內。

113/12~114/10 期間 0m 等深線於斷面 S01、斷面 S03 及斷面 S04 呈現侵蝕、退縮距離分別約為 47.5 公尺、21.2 公尺及 18.6 公尺，其餘斷面變遷距離均在 9 公尺以內；-5m 等深線於斷面 S03、斷面 S06、斷面 S08 及斷面 S09 呈現侵蝕、退縮距離分別約為 37.4 公尺、29.2 公尺、44.4 公尺及 36.4 公尺，其餘斷面變遷距離均在 24 公尺以內；-10m 等深線於斷面 S02、斷面 S04、斷面 S05 及斷面 S07 呈現侵蝕、退縮距離分別約為 29.7 公尺、40.3 公尺、72.6 公尺及 29.5 公尺，其餘斷面變遷距離均在 22 公尺以內。

表3.1.13.1-1　　114年6月至114年10月斷面侵淤分析表

斷面	114 年 10 月 平均坡度(%)	最大淤積高度 (m)	最大侵蝕深度 (m)	平均侵淤高度 (m)
S01	0.93	+0.89	-0.95	+0.27
S02	0.98	+0.59	-0.82	+0.13
S03	0.88	+3.25	-0.79	-0.07
S04	1.13	+1.13	-1.22	-0.12
S05	1.10	+0.43	-4.11	-0.45
S06	0.96	+0.27	-1.02	-0.22
S07	0.90	+0.42	-0.79	-0.21
S08	0.86	+0.86	-1.53	-0.18
S09	0.78	+0.29	-0.51	-0.14

註：10 米網格斷面資料比較

表3.1.13.1-2　　113年12月至114年10月斷面侵淤分析表

斷面	114 年 10 月 平均坡度(%)	最大淤積高度 (m)	最大侵蝕深度 (m)	平均侵淤高度 (m)
S01	0.93	+0.51	-0.64	+0.02
S02	0.98	+0.26	-0.30	+0.07
S03	0.88	+3.04	-1.52	+0.09
S04	1.13	+1.64	-1.30	-0.09
S05	1.10	+0.31	-2.88	-0.35
S06	0.96	+0.49	-0.85	-0.14
S07	0.90	+0.70	-0.69	-0.06
S08	0.86	+1.01	-1.00	-0.05
S09	0.78	+0.35	-0.42	-0.00

註：10 米網格斷面資料比較

表3.1.13.1-3　　114年6月至114年10月等深線侵淤比較表

斷面	水深 0m	水深-5m	水深-10m	水深-20m	水深-30m
S01	-9.1	+37.8	+12.4	+25.3	-5.2
S02	+1.6	+7.1	+6.4	+18.4	+36.1
S03	+61.3	+7.4	-6.7	-6.5	-12.0
S04	-0.9	+10.5	-25.6	-9.6	-
S05	-2.3	-10.8	-30.2	-12.6	-29.0
S06	-6.7	-23.2	-1.1	-31.7	-8.9
S07	-	+7.7	+4.9	-24.7	+8.2
S08	-	-0.9	-20.1	+17.7	-31.8
S09	-	-1.5	-24.4	+4.6	+2.8
最大推進距離	+61.3	+37.8	+12.4	+25.3	+36.1
最大退縮距離	-9.1	-23.2	-30.2	-31.7	-31.8
平均變化距離	+7.3	+3.8	-9.4	-2.1	-5.0

註：10 米網格斷面資料比較，單位：公尺。

表3.1.13.1-4　　113年12月至114年10月等深線侵淤比較表

斷面	水深 0m	水深-5m	水深-10m	水深-20m	水深-30m
S01	-47.5	+22.9	-5.1	+18.4	+80.8
S02	-8.5	-13.6	-29.7	+20.8	+75.7
S03	-21.2	-37.4	-20.2	-32.4	-12.3
S04	-18.6	+23.9	-40.3	-7.7	-
S05	+4.0	-10.8	-72.6	-4.5	-47.1
S06	-1.6	-29.2	-21.9	-12.0	-7.6
S07	-	-9.7	-29.5	-15.6	-9.3
S08	-	-44.4	-21.6	-1.8	-177.6
S09	-	-36.4	-1.1	-3.8	-11.1
最大推進距離	+4.0	+23.9	-1.1	+20.8	+80.8
最大退縮距離	-47.5	-44.4	-72.6	-32.4	-177.6
平均變化距離	-15.6	-15.0	-26.9	-4.3	-13.6

註：10 米網格斷面資料比較，單位：公尺。




圖 3.1.13.1-1　斷面 S01 至斷面 S03 底床高程變化圖




圖 3.1.13.1-2　斷面 S04 至斷面 S06 底床高程變化圖




圖 3.1.13.1-3　斷面 S07 至斷面 S09 底床高程變化圖

(3) 水深侵淤比較

為進一步探討該海域水深地形侵淤變化，將水深地形資料加以處理，內插至相同網格坐標上 (每 25 公尺一個格點)，然後相減得到各網格點之水深差值，再繪製水深變化影像圖，影像圖中以藍-紫色代表侵蝕，以黃-紅色代表淤積，即可從影像圖的色階變化觀察侵淤位置及其程度。

圖 3.1.13.1-5~圖 3.1.13.1-6 為 114 年颱風季節前 (114/06) 至 114 年颱風季節後 (114/10) 地形侵淤比較，各區塊侵淤情形如下：

(a) 儲槽區至氣化區間坵塊 (G1 區塊) 於+3m~-3m 線間底床高程變化呈現輕微淤積，平均淤積高度為+0.15 公尺，最大侵蝕深度為-0.61 公尺，最大淤積高度為+0.63 公尺。

(b) 氣化區至大潭電廠出水口導流堤北側區塊 (G2 區塊) 於+3m~-4m 線間底床高程變化呈現侵淤平衡，平均淤積高度為+0.02 公尺，最大侵蝕深度為-0.71 公尺，最大淤積高度為+1.19 公尺。

(c) 大潭電廠出水口導流堤南側至電廠進水口防波堤北側區塊 (G3 區塊) 於+3m~-5m 線間底床高程變化呈現侵淤平衡，平均侵蝕深度為-0.05 公尺，最大侵蝕深度為-0.46 公尺，最大淤積高度為+1.15 公尺。

(d) 進水口防波堤南堤至新屋溪出海口間於+3m~-4m 線間底床高程變化呈現輕微侵蝕，平均侵蝕深度為-0.08 公尺，最大侵蝕深度為-1.78 公尺，最大淤積高度為+1.18 公尺。

(e) 永安漁港南側海域於+3m~-4m 線間底床高程變化呈現侵淤平衡，平均淤積高度小於+0.01 公尺，最大侵蝕深度為-1.48 公尺，最大淤積高度為+0.83 公尺。

(f) 施工圍堤區北側至觀音溪口外海水深-15m~-30m 間底床高程變化呈現輕微侵蝕，平均侵蝕深度為-0.12 公尺，最大侵蝕深度為-1.08 公尺，最大淤積高度為+0.78 公尺。

(g) 施工圍堤區西南側作業區間外海水深-15m~-22m 間底床高程變化呈現侵蝕，平均侵蝕深度為-0.20 公尺，最大侵蝕深度為-0.95 公尺，最大淤積高度為+0.50 公尺。

(h) 114 年 6 月至 114 年 10 月期間全區域土方變化呈現 114 年 6 月至 114 年 10 月期間全區域土方變化呈現輕微侵蝕，平均侵蝕深度為-0.06 公尺。

圖 3.1.13.1-7~圖 3.1.13.1-8 為 113 年颱風季節後 (113/12) 至 114 年颱風季節後 (114/10) 地形侵淤比較，結果顯示下列訊息：

(a) 儲槽區至氣化區間坵塊 (G1 區塊) 於+3m~-3m 線間底床高程變化呈現淤積，平均淤積高度為+0.24 公尺，最大侵蝕深度為-0.82 公尺，最大淤積高度為+0.67 公尺。

(b) 氣化區至大潭電廠出水口導流堤北側區塊 (G2 區塊) 於+3m~-4m 線間底床高程變化呈現侵淤平衡，平均侵蝕深度為-0.03 公尺，最大侵蝕深度為-1.21 公尺，最大淤積高度為+1.17 公尺。

(c) 大潭電廠出水口導流堤南側至電廠進水口防波堤北側區塊 (G3 區塊) 於+3m~-5m 線間底床高程變化呈現輕微侵蝕，平均侵蝕深度為-0.09 公尺，最大侵蝕深度為-0.93 公尺，最大淤積高度為+1.28 公尺。

(d) 進水口防波堤南堤至新屋溪出海口間於+3m~-4m 線間底床高程變化呈現侵蝕，平均侵蝕深度為-0.22 公尺，最大侵蝕深度為-1.97 公尺，最大淤積高度為+1.11 公尺。

(e) 永安漁港南側海域於+3m~-4m 線間底床高程變化呈現侵淤平衡，平均侵蝕深度為-0.02 公尺，最大侵蝕深度為-1.64 公尺，最大淤積高度為+1.11 公尺。

(f) 施工圍堤區北側至觀音溪口外海水深-15m~-30m 間底床高程變化呈現輕微侵蝕，平均侵蝕深度為-0.18 公尺，最大侵蝕深度為-1.05 公尺，最大淤積高度為+0.89 公尺。

(g) 施工圍堤區西南側作業區間外海水深-15m~-22m 間底床高程呈現輕微侵蝕，平均侵蝕深度為-0.11 公尺，最大侵蝕深度為-1.28 公尺，最大淤積高度為+0.62 公尺。

(h) 113 年 12 月至 114 年 10 月期間全區域土方變化呈現輕微侵蝕，平均侵蝕深度為-0.10 公尺。




圖 3.1.13.1-4　113 年 12 月至 114 年 10 月主要等深線比較圖




圖 3.1.13.1-5　114 年 6 月至 114 年 10 月地形侵淤變化圖




圖 3.1.13.1-6　114 年 6 月至 114 年 10 月侵淤比較圖




圖 3.1.13.1-7　113 年 12 月至 114 年 10 月地形侵淤變化圖




圖 3.1.13.1-8　113 年 12 月至 114 年 10 月侵淤比較圖

3.1.13.2 觀音溪河口河道斷面監測作業

觀音溪河口河道斷面監測作業執行頻率為每年 2 次，與歷年調查結果相互比較，茲分述如下。

一、河道中心線底床高程變化

114 年 12 月與歷年同季觀音溪河道中心線變遷如**圖 3.1.13.2-1** 所示，本季(114 年 12 月)與前 1 季(114 年 3 月)觀音溪河道中心線變遷如**圖 3.1.13.2-2** 所示。108 年 12 月、109 年 12 月、111 年 12 月、112 年 12 月、113 年 12 月及 114 年 12 月六次河道中心線資料顯示，108 年 12 月至 109 年 12 月期間河道往東北向偏移、出海口則往西南向偏移，109 年 12 月至 110 年 12 月期間河道往西南向偏移，110 年 12 月至 111 年 12 月期間河道往西南向偏移，111 年 12 月至 112 年 12 月期間河道往東北向偏移，112 年 12 月至 113 年 12 月期間河道往西南向偏移，113 年 12 月至 114 年 12 月期間河道往東北向偏移。

108 年 12 月觀音溪河道於離開海堤後轉往西南向即沿海堤方向略偏海岸方向流動，後轉西北向(326 度)往外海流出；109 年 12 月觀音溪河道於離開海堤後轉往北北西向流動，後轉西北向再轉北北西向(339 度)往外海流出；110 年 12 月觀音溪河道於離開海堤後轉往西向流動，後轉西北向再轉西向(278 度)往外海流出；111 年 12 月觀音溪河道於離開海堤後轉往西北向流動，後轉西向再轉往西南向流動，後轉北北西向再轉西北向(314 度)往外海流出；112 年 12 月觀音溪河道於離開海堤後轉往西北向流動，後轉北向(360 度)往外海流出；113 年 12 月觀音溪河道於離開海堤後轉往西向流動，後轉西南向再轉往西向流動，後轉西北向再轉北北西向(330 度)往外海流出；114 年 3 月觀音溪河道於離海堤開口後持續往西北向流動，後轉西南向再轉往西向流動，後轉北北西向再轉西北向(310 度)往外海流出。

歷年河道中心線位置資訊顯示，河道離開海堤後中心線位置有來回擺盪偏移之現象，將持續進行觀音溪河道變遷調查。




圖 3.1.13.2-1　114 年 12 月與歷年同季觀音溪河道中心線變遷圖




圖 3.1.13.2-2　114 年 12 月與 114 年 3 月觀音溪河道中心線變遷圖

108 年 12 月、109 年 12 月、110 年 12 月、111 年 12 月、112 年 12 月、113 年 12 月、114 年 3 月及 114 年 12 月觀音溪河道中心線高程及坡降如**表 3.1.13.2-1~表 3.1.13.2-8** 所示。

108 年 12 月河道中心線的高程變化從陸側高程+1.57m(便橋外側)到外海高程為+0.17m(里程 700 公尺)，全斷面平均坡降為 1/500；全斷面底床高程最高處位於里程 200 公尺處，最高高程為+1.93m，現場施測當日該處仍有排水漫流通過。

109 年 12 月河道中心線的高程變化從陸側高程+1.61m(便橋外側)到外海高程為+0.01m(里程 533 公尺)，全斷面平均坡降為 1/331；全斷面底床高程最高處位於里程 160~220 公尺處，高程大於+2.30m，現場施測當日該處仍有排水漫流通過。

110 年 12 月河道中心線的高程變化從陸側高程+1.45m(便橋外側)到外海高程為+0.78m(里程 393 公尺)，全斷面平均坡降為 1/585；全斷面底床高程最高處位於里程 165~230 公尺處，高程大於+1.75m；於里程 155~175 公尺處，高程由+1.50m 驟升為+1.99m，現場施測當日該處仍有排水漫流通過。

111 年 12 月河道中心線的底床高程從陸側高程+1.45m(便橋外側)到外海高程為+0.42m(里程 650 公尺)，全斷面平均坡降為 1/527；全斷面底床高程最高處位於里程 180~260 公尺間，高程大於+1.50m；於里程 90~200 公尺處，高程由+0.85m 緩升為+1.69m，現場施測當日該處仍有排水漫流通過。

112 年 12 月河道中心線的底床高程從陸側高程+1.35m(便橋外側)到外海高程為−0.96m(里程 415 公尺)，全斷面平均坡降為 1/179；全斷面底床高程最高處位於里程 15 公尺內，高程大於+1.30m；於里程 95~120 公尺處，均有局部地形隆起(局部最高高程+1.04m)，現場施測當日全程河道皆可明顯辨識河道位置。

113 年 12 月河道中心線的底床高程從陸側高程+1.39m(便橋外側)到外海高程為−1.56m(里程 630 公尺)，全斷面平均坡降為 1/213；全斷面底床高程最高處位於里程 147 公尺處，高程為+1.74m，現場施測當日該處河道仍有溪水通過，里程 510 公尺內皆可明顯辨識河道位置。

114 年 3 月河道中心線的底床高程從陸側高程+1.32m(便橋外側)到外海高程為-0.56m(里程 576 公尺)，全斷面平均坡降為 1/306；全斷面底床高程最高處位於里程 184 公尺處，高程為+1.64m，現場施測當日該處河道仍有溪水通過，里程 530 公尺內皆可明顯辨識河道位置。

114 年 12 月河道中心線的底床高程從陸側高程+1.09m(便橋外側)到外海高程為+0.67m(里程 320 公尺)，全斷面平均坡降為 1/748；全斷面底床高程最高處位於里程 158 公尺處，高程為+1.38m，現場施測當日該處河道仍有溪水通過，里程 320 公尺內皆可明顯辨識河道位置。

表3.1.13.2-1　108年12月觀音溪河道中心線高程及坡降

區段	平均高程(m)	最大高程(m)	平均坡降	區段	平均高程(m)	最大高程(m)	平均坡降
全區段0-700m	+1.32	+1.93	1/500	350-400m	+1.73	+1.77	1/2407
0-50m	+1.43	+1.61	1/158	400-450m	+1.52	+1.69	1/270
50-100m	+1.16	+1.25	1/542	450-500m	+1.36	+1.51	1/160
100-150m	+1.34	+1.55	-1/140	550-600m	+1.21	+1.32	1/527
150-200m	+1.71	+1.92	-1/109	550-600m	+0.94	+1.08	1/81
200-250m	+1.70	+1.93	1/216	600-650m	+0.72	+0.88	1/171
250-300m	+1.60	+1.78	1/366	650-700m	+0.37	+0.54	1/130
300-350m	+1.68	+1.81	-1/370				

表3.1.13.2-2　109年12月觀音溪河道中心線高程及坡降

區段	平均高程(m)	最大高程(m)	平均坡降	區段	平均高程(m)	最大高程(m)	平均坡降
全區段0-533m	+1.27	+2.38	1/331	250-300m	+1.72	+1.97	1/93
0-50m	+1.47	+1.78	1/137	300-350m	+1.26	+1.45	1/140
50-100m	+0.93	+1.27	1/411	350-400m	+0.93	+1.09	1/197
100-150m	+1.54	+2.20	-1/46	400-450m	+0.69	+0.83	1/177
150-200m	+2.32	+2.38	-1/361	450-500m	+0.37	+0.55	1/143
200-250m	+2.19	+2.38	1/125	500-533m	+0.10	+0.20	-1/2440

表3.1.13.2-3　110年12月觀音溪河道中心線高程及坡降

區段	平均高程(m)	最大高程(m)	平均坡降	區段	平均高程(m)	最大高程(m)	平均坡降
全區段0-393m	+1.34	+1.99	1/585	200-250m	+1.77	+1.85	1/1269
0-50m	+1.31	+1.45	1/164	250-300m	+1.48	+1.72	1/131
50-100m	+0.92	+1.14	1/2789	300-350m	+1.09	+1.34	1/120
100-150m	+1.37	+1.46	-1/160	350-393m	+0.83	+0.93	1/281
150-200m	+1.80	+1.99	-1/151				

表3.1.13.2-4　111年12月觀音溪河道中心線高程及坡降

區段	平均高程(m)	最大高程(m)	平均坡降	區段	平均高程(m)	最大高程(m)	平均坡降
全區段0-650m	+0.94	+1.69	1/334	300-350m	+1.18	+1.36	1/153
0-50m	+1.17	+1.52	1/81	350-400m	+0.99	+1.05	1/382
50-100m	+0.83	+0.88	1/1761	400-450m	+0.78	+0.90	1/206
100-150m	+1.01	+1.18	-1/142	450-500m	+0.65	+0.78	1/296
150-200m	+1.44	+1.69	-1/99	500-550m	+0.48	+0.53	1/370
200-250m	+1.64	+1.69	1/3894	550-600m	+0.22	+0.32	1/219
250-300m	+1.46	+1.67	1/164	600-650m	-0.17	+0.07	1/97

表3.1.13.2-5　112年12月觀音溪河道中心線高程及坡降

區段	平均高程(m)	最大高程(m)	平均坡降	區段	平均高程(m)	最大高程(m)	平均坡降
全區段0-415m	+0.60	+1.38	1/179	200-250m	+0.82	+0.95	1/200
0-50m	+1.09	+1.38	1/129	250-300m	+0.57	+0.69	1/180
50-100m	+0.91	+1.04	-1/967	300-350m	+0.24	+0.41	1/146
100-150m	+0.96	+1.04	1/319	350-400m	-0.28	+0.07	1/68
150-200m	+0.87	+0.96	-1/598	400-415m	-0.80	-0.65	1/51

表3.1.13.2-6　113年12月觀音溪河道中心線高程及坡降

區段	平均高程(m)	最大高程(m)	平均坡降	區段	平均高程(m)	最大高程(m)	平均坡降
全區段0-630m	+0.79	+1.74	1/213	300-350m	+1.27	+1.44	1/164
0-50m	+1.12	+1.41	1/91	350-400m	+1.01	+1.14	1/177
50-100m	+0.92	+1.17	-1/170	400-450m	+0.71	+0.85	1/160
100-150m	+1.56	+1.74	-1/109	450-500m	+0.29	+0.54	1/118
150-200m	+1.59	+1.65	1/422	500-550m	-0.17	+0.11	1/82
200-250m	+1.48	+1.53	1/510	550-600m	-0.76	-0.50	1/100
250-300m	+1.42	+1.47	-1/1978	600-630m	-1.24	-0.99	1/54

表3.1.13.2-7　114年3月觀音溪河道中心線高程及坡降

區段	平均高程(m)	最大高程(m)	平均坡降	區段	平均高程(m)	最大高程(m)	平均坡降
全區段0-576m	+0.81	+1.64	1/306	300-350m	+1.14	+1.24	1/342
0-50m	+0.92	+1.33	1/91	350-400m	+0.93	+1.09	1/189
50-100m	+0.73	+0.84	-1/764	400-450m	+0.71	+0.83	1/173
100-150m	+1.07	+1.39	-1/118	450-500m	+0.34	+0.53	1/147
150-200m	+1.42	+1.64	-1/427	500-550m	-0.05	+0.20	1/102
200-250m	+1.25	+1.38	1/228	550-576m	-0.40	-0.29	1/95
250-300m	+1.12	+1.28	-1/573				

表3.1.13.2-8　114年12月觀音溪河道中心線高程及坡降

區段	平均高程(m)	最大高程(m)	平均坡降	區段	平均高程(m)	最大高程(m)	平均坡降
全區段0-320m	+1.03	+1.38	1/748	150-200m	+1.27	+1.38	1/552
0-50m	+0.93	+1.09	1/184	200-250m	+1.04	+1.14	1/316
50-100m	+0.92	+1.13	-1/154	250-300m	+0.85	+0.99	1/224
100-150m	+1.24	+1.32	-1/474	300-320m	+0.72	+0.77	1/204

114 年 12 月與歷年同季觀音溪歷年河道中心線底床高程剖面如**圖 3.1.13.2-3** 所示，本季(114 年 12 月)與前 1 季(114 年 3 月)觀音溪歷年河道中心線底床高程剖面如**圖 3.1.13.2-4** 所示。114 年 12 月河道中心線底床高程最高處位於里程 158 公尺處，高程為+1.38m，現場施測當日該處河道仍有溪水通過，里程 320 公尺內皆可明顯辨識河道位置。

114 年 12 月河道中心線位置 114 年 12 月與歷年同季底床高程變化顯示，108 年 12 月至 109 年 12 月里程 210 公尺內主要呈現淤積、里程 210 公尺外主要呈現侵蝕；109 年 12 月至 110 年 12 月主要呈現侵蝕；110 年 12 月至 111 年 12 月主要呈現侵蝕；111 年 12 月至 112 年 12 月里程 220 公尺內主要呈現侵蝕、里程 220 公尺外主要呈現淤積；112 年 12 月至 113 年 12 月里程 210 公尺內主要呈現淤積、里程 210 公尺外主要呈現侵蝕；113 年 12 月至 114 年 12 月主要呈現侵蝕。

114 年 12 月河道中心線位置 114 年 12 月與前 1 季(114 年 3 月)底床高程變化顯示，里程 120 公尺(河道有海堤段)內呈現淤積，里程 120 公尺外呈現侵蝕。




圖 3.1.13.2-3　114 年 12 月與歷年同季觀音溪河道中心線底床高程剖面圖




圖 3.1.13.2-4　114 年 12 月與 114 年 3 月觀音溪河道中心線底床高程剖面圖

二、斷面底床高程分析

114 年 12 月與歷年同季離海堤 350 公尺內之斷面底床高程變化如**圖 3.1.13.2-5~圖 3.1.13.2-9** 所示，本季(114 年 12 月)與前 1 季(114 年 3 月)離海堤 350 公尺內之斷面底床高程變化如**圖 3.1.13.2-10~圖 3.1.13.2-14** 所示。河道順兩岸堤防往西北向流出(SEC01~SEC06、里程 0~125 公尺)，108 年 12 月至 114 年 12 月資料顯示，SEC01~SEC04(里程 0~75 公尺)河道寬度均約為 30 公尺，SEC05~SEC06 均為河道主槽寬度最為明顯及寬闊之河道段，於高程+3.0m 以上寬度均可達 30 公尺，於高程+2.5m 以上均可維持在 25 公尺寬度。

SEC02~SEC06(里程 25~125 公尺)河道中心線，108 年 12 月底床高程維持在+1.04m 以上，平均底床高程為+1.23m；109 年 12 月底床高程維持在+0.43m 以上，平均底床高程為+1.13m；110 年 12 月底床高程維持在+0.53m 以上，平均底床高程為+1.11m；111 年 12 月底床高程維持在+0.80m 以上，平均底床高程為+0.89m；112 年 12 月底床高程維持在+0.74m 以上，平均底床高程為+0.95m；113 年 3 月底床高程維持在+0.67m 以上，平均底床高程為+1.02m；113 年 12 月底床高程維持在+0.69m 以上，平均底床高程為+1.05m；114 年 12 月底床高程維持在+0.73m 以上，平均底床高程為+1.01m。113 年 12 月至 114 年 12 月期間呈現侵蝕，平均侵蝕深度約為 0.02 公尺；114 年 3 月至 114 年 12 月期間呈現淤積，平均淤積高度約為 0.21 公尺。

SEC07(里程 150 公尺)，112 年 12 月河道寬度約為 30 公尺，底床最低高程約為+0.9m；113 年 12 月河道寬度約為 15 公尺，底床最低高程約為+1.4m；114 年 3 月河道寬度約為 35 公尺，底床最低高程約為+1.2m；114 年 12 月河道寬度約為 40 公尺，底床最低高程約為+1.2m。

SEC08(里程 175 公尺)，112 年 12 月河道寬度約為 35 公尺、底床最低高程約為+0.9m；113 年 12 月河道寬度約為 12 公尺，底床最低高程約為+1.5m；114 年 3 月河道寬度約為 35 公尺，底床最低高程約為+1.3m；114 年 12 月河道寬度約為 55 公尺，底床最低高程約為+1.2m。

SEC09(里程 200 公尺)，112 年 12 月河道寬度約為 30 公尺，底床最低高程約為+0.9m；113 年 12 月河道寬度小於 10 公尺，底床最低高程約為+1.4m；114 年 3 月位於河道轉彎處，河道寬度約為 130 公尺，底床最低高程約為+1.0m；114 年 12 月河道寬度約為 50 公尺，底床最低高程約為+1.1m。

SEC10(里程 225 公尺)，112 年 12 月河道寬度約為 20 公尺，底床最低高程約為+0.8m；113 年 12 月河道寬度小於 10 公尺，底床最低高程約為+1.5m；114 年 3 月河道寬度約為 160 公尺，右河岸不明顯，底床最低高程約為+1.0m；114 年 12 月河道寬度約為 75 公尺，底床最低高程約為+1.0m。

SEC11(里程 250 公尺)，112 年 12 月河道寬度約為 25 公尺，底床最低高程約為+0.4m；113 年 12 月河道寬度約為 10 公尺，底床最低高程約為+1.1m；114 年 3 月河道寬度約為 15 公尺，底床最低高程約為+1.0m；114 年 12 月河道寬度約為 50 公尺，底床最低高程約為+0.8m。

SEC12(里程 275 公尺)，112 年 12 月河道寬度約為 30 公尺，底床最低高程約為+0.6m；113 年 12 月河道寬度約為 12 公尺，底床最低高程約為+1.0m；114 年 3 月河道寬度約為 20 公尺，底床最低高程約為+0.9m；114 年 12 月河道已不甚明顯，底床最低高程約為+0.7m。

SEC13(里程 300 公尺)，112 年 12 月河道寬度約為 25 公尺內，底床最低高程約為+0.4m；113 年 12 月河道寬度約為 25 公尺，底床最低高程約為+0.8m；114 年 3 月河道寬度約為 15 公尺，底床最低高程約為+0.8m；114 年 12 月河道寬度約為 15 公尺，底床最低高程約為+0.8m。

SEC14(里程 325 公尺)，112 年 12 月河道寬度約為 60 公尺，底床最低高程約為+0.2m；113 年 12 月河道寬度約為 30 公尺，底床最低高程約為+0.7m；114 年 3 月河道寬度約為 10 公尺，底床最低高程約為+0.6m；114 年 12 月已無法明確辨識河槽位置，溪水呈擴散方式向北北西方流出。

SEC15(里程 350 公尺)，112 年 12 月已無法明確辨識河槽位置，溪水呈擴散方式向北方流出；113 年 12 月仍可目視河道，河道寬度約為 20 公尺，底床最低高程約為+0.5m；114 年 3 月仍可目視河道河道寬度約為 15 公尺，底床最低高程約為+0.4m；114 年 12 月已無法明確辨識河槽位置，溪水呈擴散方式向北北西方流出。

108 年 12 月河道中心線上底床高程於里程 150~200 公尺處，高程由+1.48m 驟升為+1.93m，施測當日該處仍有排水漫流通過；109 年 12 月河道中心線底床高程於里程 160~225 公尺處，底床高程均大於+2.30m，施測當日該處仍有排水漫流通過；110 年 3 月河道中心線底床高程於里程 155~175 公尺處，高程由

+1.50m 驟升為+1.99m，施測當日該處仍有排水漫流通過；111 年 12 月河道中心線底床高程於里程 180~260 公尺處，底床高程均大於+1.50m，施測當日該處仍有排水漫流通過；112 年 12 月河道中心線底床高程於里程 15 公尺內，底床高程均大於+1.30m，現場施測當日全程河道皆可明顯辨識河道位置；113 年 12 月河道中心線底床高程最高處位於里程 147 公尺處，高程為+1.74m，現場施測當日該處河道仍有溪水通過；114 年 3 月河道中心線底床高程最高處位於里程 184 公尺處，高程為+1.64m，現場施測當日該處河道仍有溪水通過；114 年 12 月河道中心線底床高程最高處位於里程 158 公尺處，高程為+1.38m，現場施測當日該處河道仍有溪水通過。

由 108 年 12 月 9 日、109 年 12 月 9 日、110 年 12 月 3 日、111 年 12 月 5 日、112 年 12 月 5 日、113 年 12 月 9 日、114 年 3 月 7 日及 114 年 12 月 1 日資料均顯示，觀音溪出海口並無被沙灘堵住、溪水無法流出之現象發生。




圖 3.1.13.2-5　114 年 12 月與歷年同季觀音溪河口斷面底床高程變化圖 (SEC01~SEC03)




圖 3.1.13.2-6　114 年 12 月與歷年同季觀音溪河口斷面底床高程變化圖 (SEC04~SEC06)




圖 3.1.13.2-7　114 年 12 月與歷年同季觀音溪河口斷面底床高程變化圖 (SEC07~SEC09)




圖 3.1.13.2-8　114 年 12 月與歷年同季觀音溪河口斷面底床高程變化圖 (SEC10~SEC12)




圖 3.1.13.2-9　114 年 12 月與歷年同季觀音溪河口斷面底床高程變化圖 (SEC13~SEC15)




圖 3.1.13.2-10 114 年 3 月與 113 年 12 月觀音溪河口斷面底床高程變化圖 (SEC01~SEC03)




圖 3.1.13.2-11 114 年 3 月與 113 年 12 月觀音溪河口斷面底床高程變化圖 (SEC04~SEC06)




圖 3.1.13.2-12 114 年 3 月與 113 年 12 月觀音溪河口斷面底床高程變化圖 (SEC07~SEC09)




圖 3.1.13.2-13 114 年 3 月與 113 年 12 月觀音溪河口斷面底床高程變化圖 (SEC10~SEC12)




圖 3.1.13.2-14 114 年 3 月與 113 年 12 月觀音溪河口斷面底床高程變化圖 (SEC13~SEC15)

3.1.14 辦理海域地形地貌調查

本工項為高解析度影像地形地貌攝影，為方便之後討論，將以季節的方式進行討論，季節劃分標準依據陸域生態的標準定義出四個季節，春季為 3~5 月；夏季為 6～8 月；秋季為 9～11 月；冬季為 12～2 月。將去年歷次的空拍結果，彙整於**圖 3.1.14-1 至圖 3.1.14-12**，並將各區域覆沙變動特性整理於**表 3.1.14-1**，各區域詳細覆沙變動說明如下：

A、觀新藻礁生態系野生動物保護區（A1 - A6）

觀新藻礁生態系野生動物保護區僅 A1 有季節變動，其餘區域(A2、A3、A4、A5、A6)無明顯季節覆沙變動的情形。A1 區域永安漁港北堤靠近陸側位置呈現冬季(12 - 2 月)覆沙，夏季(6 - 8 月)裸露。

A2 區於第三季(10 月)有覆沙增加的情形發生。推測原因為該區鄰近南側覆沙較多的 A1 區，且位於 A2 區陸側的新屋事業性海堤已完工，孔隙海堤堤腳處造成較多波浪動能耗損，增加鄰堤腳處沉積物沉降的可能性，進而導致 A2 區覆沙量增加。本季觀察結果發現，A2 區原先覆沙增加區域有減少情形發生。建議持續觀察。

B、觀塘工業區（A7 - A9）

觀塘工業區在季節上的覆沙變動情形，A7、A8 無明顯季節變動，A7 全區全年覆沙，A8 區全年礁體裸露，僅潮池區域有變動。由 112 年秋季開始至本季，A8 區域的北側靠近東鼎公司人工結構物的外圍有小範圍區域持續有覆沙增加的情形。

由 108 年至 113 年之監測資料顯示，A9 區域具有明顯的季節性變動趨勢，整體而言呈現冬季（12–2 月）覆沙量增加、夏季（6–8 月）覆沙量減少之特性。然而，本季（114 年）冬季之觀測結果顯示，其覆沙量相較於夏季反而呈現減少的情形，與過往季節變化趨勢不一致。影響 A9 區域覆沙情形有許多因素，包括水動力、漂沙、沉積物、颱風等因素，其中 G1 區(A9)更是受到波浪及海流特性、颱風歷程、突堤內環流等多種效應影響，故目前仍無法直接說明造成 G1 區(A9)覆沙變化原因，仍難以判斷並量化其影響量，建議持續觀察。


C、白玉藻礁區（A10 - A12）

白玉藻礁區 A10 區域幾乎全區覆沙，無季節變動。A11 及 A12 區域大致為藻礁露出位置改變，較無顯著季節變動。

空拍調查從 108 年 8 月至 114 年 12 月，截至目前共計 42 次調查成果，可觀察到各分區的覆沙變化情形，故建議持續執行空拍高解析度地貌攝影，以掌握未來覆沙變化。


表3.1.14-1　　歷次觀察結果總表

區域		歷次覆沙變化特性	季節變化或特殊情形
觀新藻礁生態系野生動物保護區	A1	覆沙區域集中在永安漁港北堤北側	靠近永安漁港北堤呈現冬季覆沙，夏季裸露。
	A2	覆沙區域面積不高，歷次覆沙變化大致無異。	無
	A3	整體覆沙面積較少，且覆沙變化不大。	無
	A4	歷次覆沙皆集中在河口位置。	無
	A5	覆沙變動位置靠近陸側，海側無明顯覆沙變動情形。	無
	A6	覆沙變化大致不明顯，覆沙範圍主要皆集中於大潭電廠進水口南側。	無
觀塘工業區	A7	全區覆沙	無
	A8	覆沙多集中在靠近陸側區域的位置，覆沙變動僅隨潮池變化稍有變動。	G2 區域的北側靠近東鼎公司人工結構物的外圍有小範圍區域持續有覆沙增加的情形。建議持續觀察，以利掌握未來覆沙變化情形。
	A9	覆沙區域多集中在陸側以及陸側靠近 G1 北側結構物，礁體露出範圍多集中於海側及東鼎公司人工結構物。	由歷年資料(108~113 年)可發現季節變動，大致為冬季覆沙增加，夏季覆沙減少之情形。 但本季 114 年冬季相比 114 年夏季，有覆沙減少情形發生。
白玉藻礁區	A10	幾乎全區覆沙	無
	A11	覆沙區域多集中在陸側，礁體露出範圍靠近海側	無
	A12	南側覆沙範圍較靠近陸側，而北側附近的覆沙範圍則較靠近離岸側，且歷次覆沙變化大致不明顯。	無




註：圖中控制面積(黑線)、中潮位控制面積(紅線)、非沙面積(黃線)

圖 3.1.14-1　　區域 A1 歷次空拍資料成果




註：圖中控制面積(黑線)、中潮位控制面積(紅線)、非沙面積(黃線)

圖 3.1.14-2　區域 A2 歷次空拍資料成果




註：圖中控制面積(黑線)、中潮位控制面積(紅線)、非沙面積(黃線)

圖 3.1.14-3　區域 A3 歷次空拍資料成果




註：圖中控制面積(黑線)、中潮位控制面積(紅線)、非沙面積(黃線)

圖 3.1.14-4　區域 A4 歷次空拍資料成果



註：圖中控制面積(黑線)、中潮位控制面積(紅線)、非沙面積(黃線)

圖 3.1.14-5　區域 A5 歷次空拍資料成果



註：圖中控制面積(黑線)、中潮位控制面積(紅線)、非沙面積(黃線)

圖 3.1.14-6　區域 A6 歷次空拍資料成果




註：圖中控制面積(黑線)、中潮位控制面積(紅線)、非沙面積(黃線)

圖 3.1.14-7　區域 A7 歷次空拍資料成果




註：圖中控制面積(黑線)、中潮位控制面積(紅線)、非沙面積(黃線)

圖 3.1.14-8　區域 A8 歷次空拍資料成果




註：圖中控制面積(黑線)、中潮位控制面積(紅線)、非沙面積(黃線)

圖 3.1.14-9　區域 A9 歷次空拍資料成果




註：圖中控制面積(黑線)、中潮位控制面積(紅線)、非沙面積(黃線)

圖 3.1.14-10　區域 A10 歷次空拍資料成果



註：圖中控制面積(黑線)、中潮位控制面積(紅線)、非沙面積(黃線)

圖 3.1.14-11　區域 A11 歷次空拍資料成果



註：圖中控制面積(黑線)、中潮位控制面積(紅線)、非沙面積(黃線)

圖 3.1.14-12　區域 A12 歷次空拍資料成果

3.2 建議事項

建議持續監測，用以解明施工期間之施工行為是否對周遭環境造成影響，並提前掌握環境變化情形，以適時預防因應

參考文獻

一、物化環境

1. 台灣中油股份有限公司，「桃園市觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書」，88 年 4 月。
2. 台灣中油股份有限公司，「桃園市觀塘工業區開發計畫環境影響評估報告書藻礁生態系因應對策暨環境影響差異分析報告」，107 年 11 月。
3. 交通部運輸研究所，「臺灣地區公路容量手冊」，100 年 10 月。
4. 行政院環境保護署(現環境部)，環境噪音監測方法。
5. 行政院環境保護署(現環境部)，空氣品質監測方法。
6. 行政院環境保護署(現環境部)，空氣品質標準。
7. 行政院環境保護署(現環境部)，噪音管制標準。
8. 日本政府，振動規制法施行規則。
9. 行政院環境保護署(現環境部)，營建工程噪音管制標準。
10. Pomeroy, A. W., Lowe, R. J., Ghisalberti, M., Storlazzi, C., Symonds, G., & Roelvink, D. (2017). Sediment transport in the presence of large reef bottom roughness. Journal of Geophysical Research: Oceans, 122(2), 1347-1368.
11. Jia, L., Ren, J., Nie, D., Chen, B., & Lv, X. (2014). Wave-current bottom shear stresses and sediment re-suspension in the mouth bar of the Modaomen Estuary during the dry season. Acta Oceanologica Sinica, 33(7), 107-115.

二、基礎生產力

1. Parsons T, Maita Y, Lalli C. (1984) A Manual of Chemical and Biological Methods for Seawater Analysis. Pergamon Press, Oxford.
2. Lawrenz E, Smith EM. Richardson TL (2013) Spectral irradiance, phytoplankton community composition and primary productivity in a salt marsh estuary, North Inlet, South Carolina, USA. Estuaries and Coasts 36: 347–364 (採水器收集文獻)
3. Meyercordt J, Gerbersdorf S, Meyer-Reil LA (1999) Significance of pelagic and benthic primary production in two shallow coastal lagoons of different degrees of eutrophication in the southern Baltic Sea. Aquatic Microbogical Ecology 20: 273–284

4. Pan CW, Chuang YL, Chou LS, Chen MH, Lin HJ. (2016) Factors governing phytoplankton biomass and production in tropical estuaries of western Taiwan, Continental Shelf Research 118: 88-99 (註解 1: 文獻為水體氧氣濃度以溶氧計(Model52, 5909 probe, YSI, USA).監測單位時間內水體溶氧變化,註解 2: 由於溶氧計測定數值與本方法化學方式測定數值相似，因此本方法再極大樣品量及出海作業時間短、日照短因素，因此採用化學固定海水氧氣濃度)。
5. Ryther JH (1956) The measurement of primary production. Limnology and Oceanography 1: 72-84
6. 行政院農業委員會漁業署台灣海域基礎生產力之研究(2007 年計畫主持人鄭學淵教授)

三、漁業資源

1. 農業部漁業署,中華民國台閩地區漁業統計年報,92-113 年。
2. 桃園區漁會魚市場魚種供銷量及價格一覽表，114 年 09 月-114 年 11 月。
3. 中壢區漁會魚市場魚種供銷量及價格一覽表，114 年 09 月-114 年 11 月。
4. 桃園地區樣本戶漁獲資料調查本,114 年 09 月-114 年 11 月。
5. Almatar, S. M., Lone, K. P., Abu-Rezq, T. S., & Yousef, A. A. (2004). Spawning frequency, fecundity, egg weight and spawning type of silver pomfret, *Pampus argenteus* (Euphrasen)(Stromateidae), in Kuwait waters. Journal of Applied Ichthyology, 20(3), 176-188.
6. Chaves, A. P., Wosnick, N., Hauser-Davis, R. A., Junior, F. B., and Oliveira, D. P. (2025). P09-37 Mercury in *Sphyrna lewini*: Evaluating Consumption Risks Across Different Population Groups. *Toxicology Letters*, 411, S128.
7. Chen, M., Qiu, S., & Yang, S. (2001). The reproductive biology of the spadenose shark, Scoliodon laticaudus, from southern Fujian coastal waters. Acta Oceanologica Sinica/Haiyang Xuebao, 23(3), 92-98.
8. Garzón-Peña, L. V., Barrera-García, A., Delgado-Huertas, A., and Polo-Silva, C. (2025). Trophic ecology of four shark species in the Gulf of Salamanca, Colombian Caribbean, using multi-tissue stable isotopes analysis. *Journal of Fish Biology*, 107(4), 1398-1410.
9. Griffiths, S., Fry, G. C., & van der Velde, T. D. (2005). Age, growth and reproductive dynamics of the Talang queenfish (*Scomberoides commersonnianus*) in northern Australia. CSIRO.
10. Horstmyer, L., Ballard, K., Daly-Engel, T., Stein, K., Hoffmayer, E., Hammerschlag, N., ... and Sulikowski, J. (2025). First insights into the fine-scale vertical movements of a Carolina hammerhead, *Sphyrna gilberti*, and a hybrid between Carolina and scalloped hammerhead. *Frontiers in Marine Science*, 12, 1688202.
11. Kwak, S. N., Huh, S. H., & Kim, H. W. (2008). Seasonal variation in

species composition and abundance of fish assemblage in the coastal water off Namhae Island. Korean Journal of Ichthyology, 20(4), 303-312.
12. Lan K.W., C.I. Zhang*, H.J. Kang, L.J. Wu, and L.J. Lian (2017). Impact of fishing exploitation and climate change on the grey mullet (*Mugil cephalus* L.) stock in the Taiwan Strait. Marine and Coastal Fisheries, 9, 271-281.
13. Liao,C.H., H.J. Lu, K.M. Liu, S.J. Joung, C.H. Wang, N.J. Su (2017) Fry-Releasing and its Benefit Assessment. Final Report of Research Project Fisheries Agency, Council of Agriculture, Kaohsiung, Taiwan , 185 pp.
14. Lin, Y. J., Hsu, H. H., Shiao, J. C., Chung, M. T., and Rabaoui, L. J. (2025). Specific locally, general globally: a synthesis on the isotopic niche in hammerhead sharks (Class Chondrichthyes, Genus *Sphyrna*) Y.-J. Lin et al. *Reviews in Fish Biology and Fisheries*, 35(3), 1609-1633.
15. Lladó, D., Aguíñiga-García, S., Carreón-Palau, L., Galván-Magaña, F., González-Armas, R., and Tripp-Valdez, A. (2025). Food partitioning, trophic niche, and fatty acid composition and trophic retention in co-existing threatened sharks with different feeding strategies. *Food Webs*, e00427.
16. Lubitz, N., Doupain, K., Houlihan, S., and Mitchell, J. D. (2025). A seasonal aggregation of juvenile scalloped hammerheads *Sphyrna lewini* along beaches of the G old C oast, A ustralia. *Journal of Fish Biology*.
17. Martins, T., Lutz, Í., Da Silva, R., Monteiro De Lima, G., Santana, P., Santa Brígida, N., ... and Evangelista Gomes, G. (2025). Forensic genetics for monitoring the illegal trade of hammerhead sharks (*Sphyrna* spp.) using a multiplex PCR protocol. *Frontiers in Marine Science*, 12, 1638479.
18. Musick, J. A., Harbin, M. M. & Compagno, L. J. V. (2004). Historical zoogeography of the Selachii. In Biology of Sharks and their Relatives (Carrier, J. C., Musick, J. A. & Heithaus, M. R., eds), pp. 33–78. Boca Raton, FL: CRC Press.
19. Salinas-de-León, P., Vaudo, J., Suarez-Moncada, J., and Shivji, M. (2025). Long-distance movements of a scalloped hammerhead shark connect the Galapagos Islands with coastal areas and international waters of the Tropical Eastern Pacific. *Environmental Biology of Fishes*, 1-7.
20. Su, N. J., Lu, Y. S., Wang, C. H., Liao, C. H., Chiang, W. C., & Tseng, C. T. (2020). Age determination for juvenile fourfinger threadfin (*Eleutheronema rhadinum*) by using otolith microstructure and length data obtained from commercial fisheries off northwestern Taiwan. Fisheries Research, 227, 105560.
21. Wang, S. B., & Chen, C. T. (1995). Reproductive biology of Japanese butterfish *Psenopsis anomala* (Stromateidae) from coastal waters of northeastern Taiwan. Fisheries research, 23(1-2), 127-141.

四、海域空間濁度變化監測

1. Chien, H., W.-S. Chiang, S.-J. Kao, J.T. Liu, K.-K. Liu, and P.L.-F. Liu. 2011. Sediment dynamics observed in the

Jhoushuei River and adjacent coastal zone in Taiwan Strait. Oceanography 24 (4):122–131.
2. Deines, Kent L. Backscatter estimation using broadband acoustic Doppler current profilers. In: Current measurement, 1999. Proceedings of the IEEE sixth working conference on. IEEE, 1999. p. 249-253.
3. Poerbandono and Mayerle, R., 2004. Assessment of approaches for Converting Acoustic echo Intensity into Suspended Sediment Concentration. 3rd FIG Regional Conference Jakarta, Indonesia, October 3-7.
4. Thorne, Peter D.; Hanes, Daniel M. A review of acoustic measurement of small-scale sediment processes. Continental Shelf Research, 2002, 22.4: 603-632.
5. Van Rijn, L.C., 1984. Sediment transport, part III: bed forms and alluvial roughness. J. Hydraul. Eng. ASCE 110 (12), 1733–1754.
6. LI Xiao-long, CHEN Yong-hua, JIANG Jing-bo, NI Zuo-tao, LIU Qing-kui,XU Yong-ping, TU Deng-zhi, LI Si-ren 2015 Reliability analysis of suspended sediment concentration estimated using an ADCP and a turbidity meter
7. 劉金源，2001。水中聲學-水聲系統之基本操作原理，國立編譯館，共 619 頁。